



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1115	Intern Journal nr BA 4900	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv USB	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Brorhaugen skjerp (Skåkåsen grube nr. 2151)

Forfatter

J. Hysingjord

Dato

16.02 1970

Bedrift

NGU

Kommune Røros	Fylke Sør-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad 17203	1: 250 000 kartblad
------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

Fagområde Befaring	Dokument type	Forekomster Brorhaugen skjerp Skåkåsen grube
Råstofftype Malm/metall	Emneord Cr	

Sammendrag

Brorhaugen skjerp ligger ca. 8,5 km SØ for Røros på kartblad Røros (1720 III; 1:50.000).

Sydøstligst på Brorhaugen er det et par større blotninger av serpentin. Serpentina er på den sydlige blotningen sterkt brekksjert og gjennomsett av smale "asbestganger med stiv asbest". Asbestgangene er bare noen cm brede.

Selve skjerpeligger oppå et flatt fjellparti. Størrelsen er ca. 3 x 4 m og dybden er 1/2 - 1 m. Bergarten virker mindre brekksjert ved selve skjerpel, men den er helt serpentinisert.

I selve skjerpel sees ingen malm. Like ved bruddet ligger det utskedet en malmhaug på 40 - 50 kg. I stoffene sees smale kromittårer opptil ca. 2 cm tykke.

Det må antas at forekomsten er uten økonomisk interesse.

Brorhaugen skjerp.
(Skåkåsen grube, nr. 215).

Befaringen ble foretatt 10. juni 1969 av statsgeolog Jens Hysingjord.

Brorhaugen skjerp ligger ca. 8,5 km SØ for Røros på kartblad Røros (1720 III; 1:50.000).

Sydpøstligst på Brorhaugen er det et par større blotninger av serpentinit. Serpentinene er på den sydligste blotningen sterkt brekksjært og gjennomført av smale "asbestganger med stiv asbest". Asbestgangene er bare noen cm brede.

Selve skjerpeligger oppå et flatt fjellparti. Størrelsen er ca. 3 x 4 m og dybden er $\frac{1}{2}$ - 1 m. Bergarten virker mindre brekksjært ved selve skjerpel, men den er helt serpentinisert.

I selve skjerpel sees ingen malm. Like ved bruddet ligger det utskedet en malmhaug på 40 - 50 kg. I stoffene sees smale kromittårer opptil ca. 2 cm tykke.

Det må antas at forekomsten er uten økonomisk interesse.

På høyde 860, ca. 700 m NØ for Brorhaugen er det en liten serpentin-
kuppe. Bergarten er sterkt serpentinisert. Den er tildels brekksjært og
noe forskifret. Det er ingen tegn til primære strukturer.

Kromittanrikninger i bergarten kan ikke observeres.

Trondheim, 16. februar 1970.

Geologisk avdeling


Jens Hysingjord
statsgeolog