



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1435	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr USB	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Grunnfjord vasskisforekomst Ringvassøy - Troms				
Forfatter Johs. Færden		Dato 18.01 1968	Bedrift EOS	
Kommune Karlsøy	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 15341 15352	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster Ringvassøy kisforekomst Grunnfjord		
Råstofftype Malm/metall	Emneord Svovelkis			
Sammendrag Malmen er svovelkis med innhold av bitumen. Rustsonen kan være 5 - 6 km mektig. Den er undersøkt med en ca. 10m lang stoll og en synk i syd samt en rekke småskjerp i den nordlige del. I synken er malmens mektighet 0.4m og i stollen 0.25m. Det er typisk vasskis som det forøvrig finnes mange av særlig i Skogsfjordområdet. Forekomsten er uten verdi.				

U.K.

RINGVASSØY KISTOREKONOMSTER

EOS - Rapport

Grønnfjord vasskis forekomst

Jan. 1968

Jnr. 31/69 F.B.

Aktieselskabet Bjørkaasen Gruber (Ofoten)

Bergmesteren i Finnmarkske bergdistrikt,
Alta.

TELEGRAMADRESSE:
•BJØRKAASEN•
ARBJENSGT. 13 III
TELEFON 56 22 90

DERES REF.:

VÅR REF.:

OSLO 1.

JF/BB

12. juni 1969.

Vedlagt oversendes rapporter over følgende forekomster:

Gamnes 1967

Gamnes 1968

Grunnfjord Antimonforekomst


Grunnfjord Vasskisforekomst

Hårskoltan

Samtidig skal meddeles at EOS-PROSPECT's virksomhet opphørte
31. desember 1968.

Med hilsen

for AKTIESELSKABET BJØRKAASEN GRUBER (OFOTEN)



E. H. Landmark



John Færden

Vedl.

Grunnfjord vasskisforekomst.

Ringvasøy - Troms.

Beliggenhet.

Vasskisforekomsten ligger på Grunnfjordens vestsida, fra omtrent 300 m rett vest for gården Hamna og derfra omtrent 800 m i nordlig retning.

Rettigheter.

Vasskisforekomsten er antagelig ikke belagt.

Geologisk oversikt.

Forekomsten finnes i grønnsten med strøkretning N 40^{SE} og med 40^S fall mot NV.

Malmen.

Malmen er svovelkis med innhold av bitumen. Rustsonen kan være 5-6 m mektig. Den er undersøkt med en ca. 10 m lang stoll og en synk i syd samt en rekke småskjerp i den nordlige del.

I synken er malmens mektighet 0,4 m og i stollen 0,25 m.

Det er en typisk vasskis som det forøvrig finnes mange av særlig i Skogsfjordområdet.

Konklusjon.

Forekomsten er uten verdi.

Oslo, 18. januar 1968.

John Berden
John Berden