



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 2365	Intern Journal nr 	Internt arkiv nr 	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Nordlandske	Ekstern rapport nr 	Oversendt fra Nordlandske	Fortrolig pga 	Fortrolig fra dato:
Tittel Rapport over Drag feltspatforekomster, Tysfjord				
Forfatter Bøckmann, K.L.		Dato År 28.06 1948	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Bergvesenet	
Kommune Tysfjord	Fylke Nordland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 12312	1: 250 000 kartblad Narvik
Fagområde Forekomstbeskrivelse	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Drag Jennybruddet Litlebakken Lappleget	
Råstoffgruppe Industrimineral	Råstofftype Feltspat Kvarts Flusspat			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Rapport til H.Stange & Co A/S etter befarings. Det beskrives at det på Drag er flere forekomster av feltspat/kvart, merellett mindre over i hverandre. 3 forekomster beskrives, hvorav Jennybruddet er nesten utdrevet. Her finnes noe grov glimmer. Flusspat er heller ikke uvanlig. Litlebakken holder mer feltspat enn kvarts. Lappleget synes være den største forekomsten og ligger vestligst. Kvartsen her er meget ren, spor av flussapt finnes. Det pekes på at det trolig finnes flere forekomster i området.				

28. juni 1948.
boks 97,

H. Stange & Co. A/S,
Grensen 15 ^{VI},
O s l o.

Rapport over Drag feltspattforekomster, Tysfjord.

Etter avtale ble bruddene besøkt 9.d.mnd. under ledsakelse av driftsbestyrer Haraldsen som kendt mann.

På Drag ligger flere forekomster av feltspatt og kvarts, for det meste med linser av begge mineraler mere eller mindre om hverandre i samme bruddet. Forekomstene ligger 1-2 km. fra sjøen med dypvannskai og er forbundet med denne ved bilvei for lastebilkjøring.

Jennybruddet er det eldste og nu nærmest utdravet. Det ligger ca. 1 km fra sjøen og har en tungeformet innblanding av større kvartslinser i en vesentlig feltspattgrunnmasse. Der sitter lite av biotitt (jernholdig glimmer) i feltspatten og kan den lett utskilles. Desuten har bruddet holdt endel flusspatt i større klyser, hvorav en enkelt skal ha gitt ~~XXXXXX~~ over 60 tonn.

Bruddet skal ha gitt meget ren feltspatt, dels av grønlig utseende. Lu står der lite igjen, men det kan leveres adskillig kvarts.

Littlelaksen ligger noe vestligere, har linser av feltspatt og kvarts i en sone av ca. 50 m. lengde mot nordvest og 10-15 meters bredde. Linserne sitter i storenøstret blanding, så mineralene kan brytes noenlunde separat og lett skilles fra hverandre. Der er bare ubetydelig biotitt på forekomsten. Man har brutt seg inn på sonen ved skjæring gjennom den omgivende hvitspaltede granitt fra veien i syd og vil kunne ta hele sonen i en 6-10 m. høy dagstjæring. Sonen holder formodentlig noe mere feltspatt enn kvarts og har vel kunne gi ialt ca. 20 000 tonn over veiens nivå.

Lapalegret ligger vestligst og synes være den største forekomsten. Den feltspatt- og kvartsførende sone stikker opp av myrterrenget med en anslagsvis nord-syd lengde av ca. 200 m. og bredde av 30-50 m.. Grunnet overdekking kunne arealet ikke nøyere fastlegges. Da kollens oppstikkende høyde er 8-10 meter eller derover dreier det seg om store masser.

I kollen sitter store klumper eller linser av feltspatt og kvarts blandet om hverandre i størrelse fra noen få m³ til 100 m³ eller derover for hver linse. Kvartsen er tilsynelatende meget ren, men i feltspatten sitter foruten litt innvokset kvarts også pine av biotitt og enkelte små klyser av flusspatt, som begge deler nok så lett lar seg utskille. Man vil formodentlig få meget lma. feltspatt

Der er inndrevet en smal dagstjæring mot nord i 2 paller å 3-4 m. høide. I toppen av øvre pall sees sitte en 4-5 m. tykk feltspattkake, som synes ligge i skråhelling østover kanten av kollen så den kommer ned mot myrflaten. Da kollen i denne siden også er sterkt oppsprukket, ville man ved 2 rekker av 3-4 m. dype borhull langs kanten her få brutt hele kollen ned til myrens nivå og få ut en masse feltspatt med lite brytingsarbeide. Synes være bedre angrepspunkt for et brudd enn den påbegynte smale dagstjæring.

I det hele synes forholdene ligge vel tilrette for en betraktelig utdrift av både kvarts og feltspatt gjennom mange år på Drag, foruten at der sikkert fins flere forekomster enn de her nevnte.