



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Stein Erik

Bergvesenet rapport nr 6000	Intern Journal nr 1 / FV	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Folldal Verk AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Folldal Verk a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Malmreserveberegning i malmsone I, mellom dagen og mellomort, i kategori A og B - geologiske og tekniske malmreserver.				
Forfatter Motys, Milosh H.		Dato 1975	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Folldal Verk AS	
Kommune Dovre	Fylke Oppland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 15193	1: 250 000 kartblad Røros
Fagområde Geologi	Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Tverrfjellforekomsten		
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn, S			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Malmreserveberegning i malmsone I mellom dagen og mellomort, i kategori A og B - geologiske og tekniske malmreserver. Innhold: 1 vertikal lengdesnitt 1:2000, 4 vertikale lengdesnitt 1:500, 8 horisontale snitt 1:250 og tabeller med en klassisk veiet areal og veiet volum beregning fra periode 1971-1975.				

MALMSONE I.
TONN TOTALT
oversikts malmreserve
beregning

M. Motys

Farge-forklaring :

-  I
 IV
 V
 VI
 VII
- } malmsoner
i kategorier A, B, C₁ og C₂.

 hypotetiske-spekulative malmreserver av
malmsone VIII i kategori D.

 malm med mektighet ca fra 1m opp til 3m.
i alle malmsoner.


Målestokk 1 : 2000

Situation - situasjon pr. 1. 9. 1977.


Nr. 1-12 på vertikalsnitt refererer seg til avbildet
arbeidsplass.

Etter M.Motys

TVERRFJELLET. VERTIKALSNITT



W Y+1200 Y+1160 Y+1120 Y+1080 Y+1040 Y+1000 Y+960 Y+920 Y+880 Y+840 E




Farge-forklaringer:

- 1 T2 0,0 - 1,0 m
- 2 T3 1,0 - 2,0 m
- 3 T18 2,0 - 4,0 m
- 4 NC 4 4,0 - 6,0 m
- 5 T4 6,0 - 8,0 m
- 6 104-2 S 8,0 - 10,0 m
- 7 T20 10,0 - 12,0 m
- 8 T7 12,0 - 14,0 m
- 9 T8 14,0 - 16,0 m
- 10 16,0 - 18,0 m
- 11 18,0 - 20,0 m
- 12 T19 20,0 - 22,0 m
- 13 over 22,0 m

horizontal mæktighet av hoved
malmposisjon
av malmsone I.

Isoanomalier kart over horisontal mæktighet
av hoved malmposisjon av malmsone I. (etter H. Molys) 1/79

TVERRFJELLET		Målest. Tegn. 1:500
Forslag til tilredning av sone I		Ktr. 3.4.1
Skrapelasting		Avd./Gr. /
Folldal Verk A/S		Prosjekt nr. TG-3307-1
Folldal		



Fargeforklaringer :
Isoanomalier kart over Cu gehalt

0,09 - 0,30 %

0,30 - 0,60 %

0,60 - 0,90 %


0,90 - 1,10 %

1,10 - 1,40 %

over 1,40 %

16. 4. 1975 M. Motys

Y+1200 Y+1160 Y+1120 Y+1080 Y+1040 Y+1000 Y+960 Y+920 Y+880 Y+840



Farge forklaringer

- Cu gehalt i %.
- Zn gehalt i %.
- S gehalt i %.

Tekniske malmreserver i kategori A.

Fester og geologiske malmreserver i kategori A og B.

Malmreserveberegning til 1/1. 1973.
etter M.Motys

Løsmalm og oksidert område

TVERRFJELLET	Målest	Tegn	22/11
Forslag til tilredning	1:500	Kfr.	
av sone I.		G.kj.	
Skrapelasting.		Avd./Gr.	1/16/77
Erstatning for:			
Folldal Verk 1/5			
Folldal.			

Beregning i tonn totalt for malm legeme av malmsone I, under mellomort nivå - vest (31.12.73)

Blokk nr.	Tonn malm i blokk	Gjennomsnitt av analyser i blokker						
		Cu %	2 · 3	Zn %	2 · 5	S %	2 · 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
geologisk- tekniske malmbeserv.	1.056.402,65	0,87	922.399,3993	1,17	1.232.557,6164	38,86	41.060.000,7418	i kategori AB
tekniske malmbeserv.	864.439,88	0,86	745.449,9993	1,17	1.009.869,7374	39,16	33.847.992,7157	i kategori A
geolog. malmbeserv. og fester	192.022,77	0,92	176.949,4000	1,16	222.687,8790	37,56	7.212.008,0261	i kategori AB
utbryttet til 31.12.1973.	249.393,16	0,94	235.057,1554	1,11	276.636,8000	37,13	9.261.194,5372	
geologisk- tekniske malmbeserv.	807.069,49	0,85	687.342,2439	1,18	955.920,8164	39,40	31.798.806,2046	i kategori AB til 31.12.1973
	* 615.047,00							
Σ	615.046,72	0,83	510.392,8439	1,19	733.232,9374	39,98	24.586.798,1785	tekniske malmbeserv. i kategori A til 31.12.1973

Beregning i tonn totalt for malm legerne av malmsonen I, under mellomort nivå - vest (utbrytet)

Blokk nr.	Tonn malm i blokk	Gjennomsnitt av analyser i blokker						
		Cu %	2 · 3	Zn %	2 · 5	S %	2 · 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	81.754,02	1,11	91.011,1241	1,14	92.947,2333	34,40	2.812.664,3713	Utbrytet i malmsonen I, under mellomort nivå - vest til 31.12.1973
2	19.340,26	1,04	20.113,8704	1,01	19.533,6626	36,42	704.372,2692	
6	20.303,44	0,95	19.288,2680	1,25	25.379,3000	35,88	728.487,4272	
10	55.159,34	0,87	47.988,6258	1,10	60.675,2740	40,11	2.212.441,1274	
11	37.065,37	0,88	32.617,5256	1,01	37.436,0237	38,92	1.442.584,2004	
15	28.920,87	0,63	18.220,1481	1,09	31.523,7483	40,73	1.177.947,0351	
7	3.781,70	0,96	3.630,4320	1,30	4.916,2100	35,94	135.914,2980	
16	468,01	0,74	346,3274	1,16	542,8916	40,81	19.099,4881	
17	939,55	0,64	601,3120	1,27	1.193,2285	40,53	38.079,9615	
12	877,80	0,77	675,9060	1,40	1.228,9200	39,73	34.874,9940	
11	782,80	0,72	563,6160	1,61	1.260,3080	39,46	30.889,2880	
Σ	249.393,16	0,94	235.057,1554	1,11	276.636,8000	37,13	9.261.194,5372	utbrytet

TEKNISKE MALMRESERVER I
KATEGORI AB OG A I BRYT-
NINGSBLOKKER AV SONE I.

Mellom mellomort nivå-vest
og skrapeorter over nivå II. v.

Beregnet inn-til 1. 1. 1973.
M. Motys

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM KOORDINATER: $Y=+108,80$, $Y'=+1193,30$, $Z=+1065,20$, $Z'=+1095,30$

regnet
1. 1. 1976
M. MOTYS 71

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM KOORDINATER: $Y=+1097,50$, $Y'=+1193,30$, $Z=+1095,30$, $Z'=+1122,70$

M. MOTYS ?

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: 2. borort over mellomort nivå-vest og 1. borort over mellomort nivå i malmsone I. (borort nr. 26.) Tekniske malmreserver i kateg. A

MELLOM KOORDINATER: Y=+1097,50, Y'=+1175,80, Z=+1122,70, Z'=+1146,35

symboler	NIVÅ ELLER HORIZONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP.VEKT	SP.V. (Z)	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN							
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu%	aA · $\frac{b}{2}$ · h	Zn%	aA · $\frac{b}{2}$ · i	S%	aA · $\frac{b}{2}$ · j	Fe%	aA · $\frac{b}{2}$ · k
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c · d	e	f	e · f	(X) - (cd+ef)	$\frac{g}{2}$	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	aB · $\frac{b}{2}$ · h	i	aB · $\frac{b}{2}$ · i	j	aB · $\frac{b}{2}$ · j	k	aB · $\frac{b}{2}$ · k
A	X strasse linje (Z+1146,35)	545,00	14,45	8.236,36																		
B	2. borort over m. (Z+1131,90)	594,97			17,0	7,0	119,00				8.117,36	3,35	3,38	27.436,68	0,71		0,42		16,90			
B	2. borort over m. (Z+1131,90)	594,97	9,20	6.265,34	5,0	10,5	52,50				6.212,84	3,40	3,64	22.614,74	1,05		0,63		17,70			
A	Y strasse linje (Z+1122,70)	767,06										3,82			1,14		0,88		28,38			
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
* 50.050 t																						
≤	borort 26 →	23,65	14.501,70	22,0	7,8	171,50					14.330,20	-	3,49	50.051,42	0,98		0,64		20,21			

regnet
1.1.1976
M. MOTYS 71.

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK 1

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: I.-vest i malmsone I. (børter 22. og 17.) og mellom øvre skrapeort
over nivå II.-vest i malmsone I. Tekniske malmreserver i kategori A.

MELLOM KOORDINATER: Y=+1023,60, Y'=+1112,00, Z=+1003,30, Z'=+1030,80

symboler	NIVÅ ELLER HORISONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER					MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP. V. (Z)	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN							
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	t	Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c · d	e	f	e · f	(X) - (cd + ef)	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2
A	nivå I.-vest (børter 22 og 17), Z+1030,80	1212,8628	13,75	14175,29							14175,29	4,0	0,94	26316,4280	1,20	33595,4400	35,16	984346,3920	29,68	830927,2160
B	1/2 nivå I.-vest Z+1017,05	848,9970										3,9	1,11	31075,7820	1,14	31915,6680	34,42	963624,2040	30,35	849684,6700
B	1/2 nivå I.-vest Z+1017,05	848,9970	13,75	9172,13	35,0	11,9	416,5	192,1	3,0	576,3	669,33	3,9	1,11	14297,6991	1,14	14684,1234	34,42	443357,4802	30,35	390932,5835
A	øvre skrapeort Z+1003,30	485,1312			60,0	24,8	1488,0					3,8	1,50	19321,2150	0,99	12752,0019	32,71	421331,2951	31,90	4108975,390
A																				
B																				
B																				
A																				
A																				
B																				
B																				
A																				
A																				
B																				
B																				
A																				
A																				
B																				
B																				
A																				
A																				
Σ	blot 1.-vest total sum til 1/1 - 1973	—	27,50	23347,42	95,0	20,05	1904,50	192,1	3,0	576,30	20866,62	3,92	1,11	91011,1241	1,14	929472333	34,40	28126643713	30,36	2482442,385

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK 2

FOLLDAL VERK A/S, TVERREFJELLET GRAVE

MELLOM NIVÅ: I-vest i malmsone I. (borort nr. 22.) og mellom I. borort over nivå I-vest i malmsone I. (borort nr. 23.) Tekniske malmreserver i kategori A.

MELLOM KOORDINATER: Y=+1084,00, Y'=+1135,00, Z=+1030,75, Z'=+1054,55

symboler	NIVÅ ELLER HORISONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP. VERT	SP. V. (Z)	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN							
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu %	h · t/2	Zn %	i · t/2	S %	j · t/2	Fe %	k · t/2
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c · d	e	f	e · f	(X) - (cd + ef)	g	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2
A	nivå I-vest (b.22) Z=+1030,75	345,5051	11,90	5021,49	25,0	12,25	306,25	14,3	3,0	102,90	4612,34	3,90	3,85	17757,51	0,88	7813,3044	1,21	10743,2936	35,11	311733,0881		
B	1/2 nivå over Z=+1042,65	498,4426										3,90			1,05	9322,6928	1,00	8878,7550	36,48	323896,9824		
B	1/2 nivå over Z=+1042,65	498,4426										3,90			1,05	13885,6253	1,00	132244050	36,48	4824262944		
A	I. borort over I. (b.23) Z=+1054,55	651,3801	11,90	6841,45				14,3	3,0	102,90	6738,55	3,95	3,925	26448,81	1,14	15075,8217	0,89	11769,7205	37,21	492080,1101		
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
→ blokk 2-vest total sum til 1/1. -1973		23,80	11862,94	25,0 12,25 306,25	28,6	3,0	285,80	11350,89	—	3895	44206,32	1,04	46097,442	1,01	44616,1741	36,42	1610136,750					

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK ③

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: mellomort nivå^o-vest (borort nr. 24) og mellom l. borort over nivå^o I.
vest (borort nr. 23.) *Tekniske malmreserver i kategori A.*

MELLOM KOORDINATER: Y=+1085,40, Y'=+1168,80, Z=, Z'=+1076,60

symboler	NIVÅ ELLER HORISONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP. VERT	SP. V. (Z)	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN							
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c · d	e	f	e · f	(X) - (cd+ef)	g	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2
A	l. borort over l. (a.23) Z+1054,60	651,3801	11,00	8017,04	54,0	12,25	661,50	130	4,40	57,20	7298,34	4,08	4,04	29485,29	1,14	16806,6210	0,89	13120,9585	37,21	548574,0065		
B	1/2 nivå over Z+1065,60	806,2630										4,00	4,04		1,22	17986,0330	0,76	11204,4140	36,02	531030,2530		
B	1/2 nivå over Z+1065,60	806,2630										4,00			1,22	23471,8484	0,76	14621,8072	36,02	692996,7044		
A	mellombort nivå (b.24) Z+1076,60	961,1458	11,00	9720,75				120	4,40	52,80	9667,95	3,96	3,98	38478,44	1,27	24433,8094	0,67	12890,2774	35,22	677605,3284		
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
Σ	blokk 3-vest total sum til 1/8-1973	→	22,00	17737,79	54,0	12,25	661,50	25,0	4,40	110,00	16966,29	→	4,01	67963,73	1,22	82698,3118	0,76	51837,4571	36,05	2450206,2923		

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK (15)

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: nedre skrapeort over nivå II. - vest og mellom I. berørt under nivå I. - vest i malm-
sone I., under berørt nr. 7. *Tekniske malmreserver i kategori A.*

MELLOM KOORDINATER: Y=+905,20, Y'=+954,30, Z=+988,70, Z'=+1017,50

symboler	NIVÅ ELLER HORISONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP.VEKT	SP.V.	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN								
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2	
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c·d	e	f	e·f	(X)-(cd+ef)	g	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2	
A	nedre skrapeort over nivå II. - vest	251,4200	28,80	16985,38	49,20	260	127,92	kraterne		14,80	189,60	2806,08	14051,38	4,14	4,21	59156,31	9,47	13901,7352	1,11	32831,7576	39,99	1182830,6184	
B	i berørt under nivå I. - vest	928,1101										4,28					9,80	23662,5280	1,07	31648,6312	41,47	1226606,2950	
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK 17

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: I. - vest i malmsone I. (borort nr. 7.) og mellom I. borort over nivå I. - vest i malmsone I. (borort nr. 8.) Tekniske malmreserver i kategori A.

MELLOM KOORDINATER: Y=+90580, Y'=+954,50, Z=+1029,60, Z'=+1054,30

symboler	NIVÅ ELLER HORISONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP. V. (Z)	TONN MALM BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN								
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c·d	e	f	e·f	(X)-(cd+ef)	g	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2
A	nivå I. - vest (7.) Z+1029,60	1080,5353	12,35	12665,69	48,8	12,25	597,80	11,75	3,0	35,25	12032,64	4,10	4,10	49333,82	0,69	17020,1674	1,26	31080,3066	40,15	40376,4365		
B	1/2 nivå - over Z+1041,95	970,5890										4,10	4,10		0,64	15786,8224	1,27	31326,9757	40,51	994256,5241		
B	1/2 nivå - over Z+1041,95	970,5890	12,35	11307,86				11,75	3,0	35,25	11272,61	4,10	4,125	46499,52	0,64	14879,8464	1,27	29527,1952	40,51	941847,7776		
A	I. borort over I. (8.) Z+1054,30	8606426										4,15			0,58	13484,8608	1,29	29992,1904	40,97	952542,6672		
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																</						

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK (18)

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: I borort over nivå I. - vest (borort nr. 8) og mellom mellomort nivå - vest i malm-
sone I. (borort nr. 9) Tekniske malmreserver i kategori A.

MELLOM KOORDINATER: $Y=+906,75$, $Y'=+955,60$, $Z=+1054,30$, $Z'=+1076,20$

symboler	NIVÅ ELLER HORIZONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP.VENT (Z)	TONN MALM / BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN									
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³			Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2		
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c·d	e	f	e·f	(X) - (cd+ef)			g	$\frac{gA+gB}{2}$	t	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k
A	I. horisont over I. (h.B) Z+1054,30	860,6426	10,95	8507,57	67,5	12,25	826,88	6,0	3,0	18,0	7662,69	4,15	31761,85	0,58	9210,9365	1,29	20436,3933	40,97	65064,14973				
B	1/2 nivå — over Z+	693,2514										4,14		4,145	0,61	9687,2643	1,29	20486,3433	40,60	64476,55550			
B	1/2 nivå — over Z+	693,2514										4,14			0,61	8407,7693	1,29	17730,2377	40,60	55959,50780			
A	Mellomort nivå (h.Q) Z+1076,20	525,8602	10,95	6674,64							6674,64	4,12	4,13	27566,26	0,65	8959,0345	1,29	17780,2377	40,00	55132,52000			
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
												</											

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK 24

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: I. berørt over nivå I - vest i malmsonen I. (berørt nr. 3) og mellom mellomnivå - vest i malmsonen I. (berørt nr. 4) Tekn. malmreser. av kat. A

MELLOM KOORDINATER: Y = +816,90, Y' = +894,90, Z = +1052,55, Z' = +1075,80

symboler	NIVÅ ELLER HORIZONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP. V. (Z)	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN									
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2	
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c·d	e	f	e·f	(X) - (cd+ef)	g	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2	
A	1. berørt over Z (ber. 3) Z + 1054,30	477,2775	10,75	6297,55	59,5	12,25	728,88	12,3	3,0	36,90	5531,77	4,30	4,25	23510,02	0,65	7640,7565	1,56	18337,8156	44,30	520746,9430			
B	1/2 nivå - over Z + 1065,05	694,3588										4,20	4,25		0,49	5759,9549	1,51	17750,0651	41,75	490771,6675			
B	1/2 nivå - over Z + 1065,05	694,3588										4,20			0,49	8738,2239	1,51	26927,9961	41,75	744582,3425			
A	Mellomnivå (ber. 4) Z + 1075,80	911,4401	10,75	8631,17				12,3	3,0	36,90	8594,27	4,10	4,15	35666,22	0,41	7311,5757	1,49	26571,3339	40,41	720635,9751			
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
														* 59.176,00									
Σ	blokk 24 - øst total sum til 1.1. - 1973	→	21,50	14928,72	59,5	12,25	728,88	24,6	3,0	73,80	14126,04	—	4,19	59.176,24	0,50	29450,5104	1,51	89.587,2107	41,85	2476.686,9281			

**MALMSONE I.
GEOLOGISKE MALMRESERVER**

i kategorier AB og C₁

M.Motys 31.12.1972.

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK

malmsone I.

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ : øvre og midterste skrapeorter og nivå I-vest, malmsone I,

Kategori AB

Geologiske malmreserver

MELLOM KOORDINATER : Y=+952,80 , Y'=+1112,00 , Z=+998,50 , Z'=+1030,60

symboler	NIVÅ ELLER HORISONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP.VEKT	SP.V.	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN							
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c · d	e	f	e · f	(X) - (cd + ef)	g	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2
A	niå I-vest (V)	1.949,97	32,10	53.274,77								3,88			0,94	90.608,7996	1,11	106.995,4974	36,32	3.500.969,7688		
B	midterste og øvre skrapeorter over II.	1.369,33			143,0	20,12	2.876,50	322,1	3,0	966,30	49.431,97	3,92	3,90	192.784,68	1,12	107.959,4208	1,17	112.779,0378	33,26	3.687.970,9284		
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
malmsone I. øvre og midterste skrapeorter - nivå I. Geolog. malmres.		til 31.12.1972	32,10	53.274,77	143,0	20,12	2.876,50	322,1	3,0	966,30	49.431,97	→	3,90	192.784,68	1,03	198.568,2204	1,14	219.774,5352	37,29	7.188.940,7172		

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK *malmsoner I.* FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: *nedre skrapeort over nivå II-vest og nivå I-vest, malmsoner I.* *Kategori AB* *Geologiske malmreserver* MELLOM KOORDINATER: $Y = +816,60$, $Y' = +964,00$, $Z = +988,50$, $Z' = +1030,20$

symboler	NIVÅ ELLER HORIZONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ m² a	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER m b	MALM M³ MELLOM NIVÅER (X) m³ $\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M³ MINUS BRUDT MALM (Y) m³ (X)-(cd+ef)	SP.VEKT g/cm³ g	SP. V. (Z) g/cm³ $\frac{gA+gB}{2}$	TONN MALM I BLOKK t (Y) · (Z)	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN								
					ORT. LENG. m c	ORT. PROF. m² d	ORT. m³ m³ c·d	STG. LENG. m e	STG. PROF. m² f	STG. m³ m³ e·f					Cu % h	h · t/2 h · t/2	Zn % i	i · t/2 i · t/2	S % j	j · t/2 j · t/2	Fe % k	k · t/2 k · t/2	
A	nivå I - vest (Ø)	1.891,98	11,80	20.533,36																			
B	I. horort under n. I.	1.588,25			107,9	13,32	1.437,23	9,8	3,0	29,40	19.066,73	4,26 4,29	4,275	81.510,27	0,74 0,89	30.158,7999 36.272,0702	1,33 1,08	54.204,3296 44.015,5458	41,18 41,96	1.678.296,4593 1.710.085,4646			
B	I. horort under n. I.	1.588,25	29,90	36.348,53	49,2	2,60	127,92	14,8	189,6	4.530,88	31.060,45	4,29	4,16	129.211,47	0,89	57.499,1042	1,08	69.774,1938	41,96	2.710.856,6406			
A	nedre skrapeort over nivå II - vest	843,09			41,4	15,20	629,28	8,8	196,0			4,03			1,27	82.049,2835	0,94	60.729,3909	38,91	2.513.809,1489			
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
A																							
B																							
B																							
A																							
malmsone I. nivå I. - nedre skrap. Geolog. malmres.		til 31.12.1972	41,70	56.881,89	90,6	8,36	757,20	23,6	191,99	4.530,88	50.127,18	→	4,204	210.721,74	0,98	205.979,2578	1,09	228.723,4601	40,87	8.613.047,7134			

BEREGNING AV TONN TOTALT FOR MALM LEGEME I BLOKK *malmsone I.*

FOLLDAL VERK A/S , TVERRFJELLET GRUVE

MELLOM NIVÅ: mellomort nivå-vest og nivå I-vest i malmsone I. *Kategori A B*
Geologiske malmreserver

MELLOM KOORDINATER: Y=+816,90 , Y'=+1076,35 , Z=+1030,05 , Z'=+1076,35

symboler	NIVÅ ELLER HORISONT	AREAL AV MALM PÅ NIVÅ	VETIKAL HOYDE MELLOM NIVÅER	MALM 'M ³ MELLOM NIVÅER (X)	BRUDT MALM I ORTER OG STIGORTER						MALM M ³ MINUS BRUDT MALM (Y)	SP.V. (Z)	TONN MALM I BLOKK	GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER I BLOKKEN								
		m ²	m	m ³	ORT. LENG.	ORT. PROF.	ORT. m ³	STG. LENG.	STG. PROF.	STG. m ³	m ³	g/cm ³	g/cm ³	t	Cu%	h · t/2	Zn%	i · t/2	S%	j · t/2	Fe%	k · t/2
		a	b	$\frac{aA+aB}{2} \cdot b$	c	d	c·d	e	f	e·f	(X)-(cd+ef)	g	$\frac{gA+gB}{2}$	(Y) · (Z)	h	h · t/2	i	i · t/2	j	j · t/2	k	k · t/2
A	mellomort nivå	4.004,35	21,70	81.025,74							3,91			300.870,86	0,81	121.852,6883	1,18	177.513,8074	38,08	5.728,581,1744		
B	I. borort over n. I.	3.463,46			369,0	12,25	4.520,25	176,0	3,0	528,00	75.977,49	4,02	3,96		0,76	114.330,9268	1,20	160.522,5160	38,39	5.775,216,1577	31,61	
B	I. borort over n. I.	3.463,46	24,60	89.856,54							4,02			352.085,37	0,76	133.792,4406	1,20	211.251,2220	38,39	6.758,278,6772	31,61	
A	nivå I. - vest	3.841,95			288,0	12,25	3.528,00	221,0	3,0	663,00	85.665,54	4,19	4,11		0,84	147.875,8554	1,22	214.772,0757	39,74	6.995,936,3019	32,52	
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
B																						
B																						
A																						
A																						
Σ	malmsone I. mellomort - nivå I. Geologiske malmer.	$\xrightarrow{H1}$ 31.12.1978	46,30	170.882,28	657,0	12,25	8.048,25	397,0	3,0	1.191,00	161.643,03	→	4,04	652.956,23	0,79	517.851,9211	1,20	784.059,6211	38,68	25.258.012,3112		

2. borart over
mellomort nira
vest, ml/msone I.

Y+1260

Y+1220

Y+1180

Y+1140

Y+1100


Y+1060

X+160

X+120

X+80

X+40



Geologiske fargeforklaringer:

- FeS_2 massiv malm
- FeS_2 malm - delvis oppløst
- FeS_2 malm - sterk oppløst og stort sett opprullet i $FeO(OH) + n \cdot H_2O$
- Kloritt-biotitt-seritt, delvis amfibolitt slireskifer eller sliregneissglimmerskifer som inneholder innfalte striper og stort sett grovt spredte korn av små flaker av FeS_2 og mere sjelden av Fe_3O_4 og FeS og $EuFeS_2$ og $FeTiO_3$

Geolog. kartlagt ved M. Moztys 10.12.75

TVERREJELLET

Andre berørte er nivå mellomort.

SONE I.

Såle ca. 1132,0 m.o.h

Folldal Verk A/S

Folldal

Målestokk	Tegn.	
1:250	Kfr.	
Avd./Gr.	G.kj.	
Ersatning for:		
Ersatt av:		

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S , TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: 2. berørt over mellomort nivå - vest
i malmsonen I

MELLOM KOORDINATER: Y=+1115,80 , Y'=+1175,80

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRØ- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM	MALM AREAL		GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ						
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$							
					B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$							
		m	m	m	m ²		Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%
		a	b	c	d		e	d·e	f	d·f	g	d·g	h
A	a(y+1115,80)	11,50					0,32		0,16		10,86		
B	b(y+1129,80)	17,40					1,27		0,61		18,98		
A	b(y+1129,80)	17,40					1,27		0,61		18,98		
B	c(y+1137,40)	15,90					1,27		0,88		19,28		
A	c(y+1137,40)	15,90					1,27		0,88		19,28		
B	d(y+1149,50)	11,25					1,13		0,55		17,10		
A	d(y+1149,50)	11,25					1,13		0,55		17,10		
B	e(y+1161,80)	12,20					0,86		0,61		17,77		
A	e(y+1161,80)	12,20					0,86		0,61		17,77		
B	f(y+1175,80)	10,65					0,68		0,36		14,55		
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
A													
B													
Σ	a-f	→	60,00	13,29	797,27	1,00			0,57		17,10		

f₁

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>34,00 m mot vest fra m.p. 2065 (tatt fra nordlig malmgrense)</i> <i>Piggprøver Profil-F 2 borert over mellomort Bb. 453-C</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	<i>fra nord mot syd</i> 0 - 0.80	0,80	0.55		1.20		31.-			
2	0.80 - 1.80	1,00	0.58		1.50		38.-			
3	1.80 - 2.80	1,00	0.55		0.15		5.-			
4	2.80 - 3.30	0,50	0.15		0.20		2.50			

f

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for Bh. 453-5-2. B. ut over Mellom ord. N. Sone I-Vest

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	0,00 - 1,00	1,00	0,10		0,08		3,00			
2	1,00 - 2,00	1,00	0,20		0,07		4,50			
3	2,00 - 3,00	1,00	0,18		0,06		3,00			
4	3,00 - 4,00	1,00	0,06		0,06		2,50			
5	4,00 - 5,05	1,05	0,15		0,06		3,50			
6	5,05 - 5,70	0,65	2,10		0,07		26,50			
7	5,70 - 6,60	0,90	1,30		0,05		36,00			
8	6,60 - 7,50	0,90	2,00		0,06		24,00			
9	7,50 - 8,40	0,90	0,10		0,05		4,00			
10	8,40 - 9,40	1,00	0,07		0,05		10,50			
11	9,40 - 10,40	1,00	0,08		0,06		10,50			
12	10,40 - 11,40	1,00	0,30		0,07		9,50			
13	11,40 - 12,40	1,00	0,09		0,08		2,50			
Σ 1-5	0,00 - 5,05	5,05	0,14		0,07		3,30			
Σ 6-8	5,05 - 7,50	2,45	1,77		0,06		29,07			
Σ 9-12	7,50 - 11,40	3,90	0,14		0,06		8,74			
Σ 1-8	0,00 - 7,50	7,50	0,67		0,07		11,72			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Piggpr. Profil E2 borort over H. ort ved Bh 452 G (tatt fra nordlig malmgrense)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	fra nord mod syd 0 - 1.00	1,00	0.39		1.20		25.-			
2	1.00 - 1.50	0,50	0.25		1.15		16.50			
Σ 1-2.	0.00 - 1.50	1,50	0,34		1,18		22,17			

e

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for Bh 452-G. 2. B.ort over M.ort. M.Sone I vest

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	0 - 1,00	1,00	0,60		1,55		22,50			
2	1,00 - 2,00	1,00	0,60		1,50		30,00			
3	2,00 - 2,95	0,95	0,35		1,00		14,50			
4	2,95 - 3,60	0,65	0,06		0,20		2,00			
5	3,60 - 4,60	1,00	0,06		0,20		2,00			
6	4,60 - 5,50	0,90	0,06		0,15		3,00			
7	5,50 - 6,20	0,70	0,50		0,10		3,50			
8	6,20 - 6,60	0,40	2,25		0,10		18,00			
9	6,60 - 7,20	0,60	0,12		0,25		3,00			
10	7,20 - 7,70	0,50	0,14		0,20		2,50			
11	7,70 - 8,70	1,00	2,20		0,20		30,00			
12	8,70 - 9,70	1,00	2,50		0,30		35,00			
13	9,70 - 10,70	1,00	2,20		0,30		33,50			
14	10,70 - 11,70	1,00	0,75		0,10		12,50			
15	11,70 - 12,70	1,00	0,25		0,07		7,00			
Σ 1-3	0,00 - 2,95	2,95	0,52		1,36		22,47			
Σ 4-10	2,95 - 7,70	4,75	0,33		0,17		3,94			
Σ 11-13	7,70 - 10,70	3,00	2,30		0,27		32,83			
Σ 14-15	10,70 - 12,70	2,00	0,50		0,09		9,75			
Σ 1-15	0,00 - 12,70	12,70	0,93		0,53		17,15			

d

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Bh 451.G. 2 B.ort. over M.ort. M. Sone I Vest*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	0-0.70	0,70	0,13		0,06		1,50			
2	0,70-1,50	0,80	0,07		0,08		2,00			
3	1,50-2,30	0,80	0,14		0,75		2,50			
4	2,30-3,05	0,75	0,07		1,20		10,00			
5	3,05-4,00	0,95	0,30		1,50		10,00			
6	4,00-4,80	0,80	0,65		1,60		24,50			
7	4,80-5,65	0,85	0,50		0,15		11,00			
8	5,65-6,60	0,95	0,14		0,12		3,00			
9	6,60-7,60	1,00	0,65		0,12		4,50			
10	7,60-8,40	0,80	0,16		0,15		3,50			
11	8,40-9,40	1,00	2,40		0,30		30,00			
12	9,40-10,40	1,00	2,00		0,50		32,50			
13	10,40-11,40	1,00	2,20		0,60		35,50			
14	11,40-12,35	0,95	2,20		1,00		24,00			
15	12,35-13,30	0,95	0,95		0,50		10,00			
16	13,30-14,30	1,00	0,98		0,25		13,50			
Σ 1-4	0,00-3,05	3,05	0,10		0,53		3,98			
Σ 5-7	3,05-5,65	2,60	0,47		1,09		14,79			
Σ 8-10	5,65-8,40	2,75	0,33		0,13		3,69			
Σ 11-14	8,40-12,35	3,95	2,20		0,59		30,58			
Σ 15-16	12,35-14,30	1,95	0,97		0,37		11,79			
Σ 5-14	3,05-12,35	9,30	1,16		0,59		18,21			
Σ 5-16	3,05-14,30	11,25	1,13		0,55		17,10			
Σ 1-16	0,00-14,30	14,30	0,91		0,55		14,30			

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. **4506** På 2 Borert over Mellomort nivå
Malmstone I

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1	1,30-1,70	0,40	0,07		0,05		1,50			
2	1,70-2,20	0,50	0,10		1,55		15,00			
3	2,20-3,20	1,00	0,77		2,00		26,50			
4	3,20-4,20	1,00	0,98		1,60		24,00			
5	4,20-5,20	1,00	1,05		1,70		23,00			
6	5,20-6,20	1,00	0,20		1,65		24,50			
7	6,20-7,00	0,80	0,25		1,60		26,50			
8	7,00-7,60	0,60	0,25		1,58		23,00			
9	7,60-8,60	1,00	0,95		0,07		8,00			
10	8,60-9,50	0,90	0,15		0,07		4,00			
11	9,50-9,90	0,40	1,05		0,08		10,50			
12	9,90-10,70	0,80	0,15		0,06		2,00			
13	10,70-11,10	0,40	1,75		0,08		10,00			
14	11,10-12,10	1,00	2,15		0,12		19,00			
15	12,10-13,10	1,00	2,00		1,27		1,50			
16	13,10-14,10	1,00	2,45		0,60		30,20			
17	14,10-15,10	1,00	2,40		0,25		30,50			
18	15,10-16,05	0,95	2,25		0,45		32,00			
19	16,05-16,80	0,75	1,85		1,90		22,00			
20	16,80-17,30	0,50	2,40		0,80		13,00			
21	17,30-18,10	0,80	1,00		0,05		22,00			
22	18,10-18,90	0,80	0,10		0,05		1,00			
23	18,90-19,70	0,80	0,10		0,05		2,00			
Σ 1-2	1,30-2,20	0,90	0,09		0,88		9,00			
Σ 3-8	2,20-7,60	5,40	0,62		1,70		24,63			
Σ 9-13	7,60-11,10	3,50	0,66		0,07		6,11			
Σ 14-21	11,10-18,10	7,00	2,08		0,65		21,74			
Σ 22-23	18,10-19,70	1,60	0,10		0,05		1,50			
Σ 3-21	2,20-18,10	15,90	1,27		0,88		19,28			

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. **449 G 2** boret over Mont Sone I

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1	0 - 1.00	1.00	0.42		1.85		27.50			
2	1.00 - 1.80	0.80	0.40		1.60		27.-			
3	1.80 - 2.60	0.80	1.30		1.70		28.5			
4	2.60 - 3.35	0.75	1.80		0.50		14.-			
5	3.35 - 4.15	0.80	0.20		0.20		7.-			
6	4.15 - 4.85	0.70	0.60		0.25		5.5			
7	4.85 - 5.60	0.75	1.60		0.15		17.-			
8	5.60 - 6.45	0.85	0.10		0.15		1.-			
9	6.45 - 7.40	0.95	3.-		0.25		23.5			
10	7.40 - 8.40	1.00	2.-		1.50		31.-			
11	8.40 - 9.40	1.00	2.60		1.-		30.5			
12	9.40 - 10.40	1.00	1.95		0.25		27.-			
13	10.40 - 11.40	1.00	2.25		0.15		33.-			
14	11.40 - 12.40	1.00	2.30		0.10		35.-			
15	12.40 - 13.40	1.00	2.-		0.50		28.5			
16	13.40 - 14.40	1.00	0.25		0.15		4.-			
17	14.40 - 15.30	0.90	1.50		0.10		1.-			
Σ 1-3	0.00 - 2.60	2.60	0.68		1.73		27.65			
Σ 4-8	2.60 - 6.45	3.85	0.84		0.25		8.71			
Σ 9-15	6.45 - 13.40	6.95	2.29		0.54		29.76			
Σ 16-17	13.40 - 15.40	2.00	0.88		0.13		2.50			
Σ 1-15	0.00 - 13.40	13.40	1.56		0.69		23.30			
Σ 1-17	0.00 - 15.40	15.40	1.47		0.62		20.60			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser

Piggr. profil-B. 2 Bor-ort over M. ort ved Rh-449 (tatt fra nordlig malmgrense)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	0 - 1.00	1,00	0.45		1.70		25.5			
2	1.00 - 2.00	1,00	0.15		0.30		4.-			
3	2.00 - 3.00	1,00	0.55		0.15		14.5			
4	3.00 - 4.00	1,00	0.75		0.15		7.-			
Σ	0,00 - 4,00	4,00	0,48		0,58		12,75			

21

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for Bk 454.G. 2. B. ut over Mellomort. M. Sone I- Vest

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1	0,00-0,70	0,70	0.29		0.03		39.-			
2	0,70-1,30	0,60	0.47		0.04		30.-			
3	1,30-1,90	0,60	0.70		0.04		9.-			
4	1,90-2,50	0,60	0.75		0.06		15.5			
5	2,50-3,10	0,60	0.15		0.04		16.5			
6	3,10-4,10	1,00	0.17		0.05		3.-			
7	4,10-5,10	1,00	0.13		0.05		1.75			
8	5,10-6,10	1,00	0.13		0.03		0.60			
9	6,10-7,10	1,00	0.24		0.02		0.50			
10	7,10-8,10	1,00	0.20		0.05		0.50			
11	8,10-9,10	1,00	0.25		0.04		0.75			
12	9,10-10,10	1,00	0.20		0.03		0.75			
Σ 1-2	0,00-1,30	1,30	0,37		0,03		34,85			
Σ 3-5	1,90-3,10	1,20	0,45		0,05		16,00			
Σ 6-12	3,10-10,10	7,00	0,19		0,04		1,12			
Σ 1-12	0,00-10,10	10,10	0,28		0,04		7,70			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Pigeon Profile. A. Mort ved Bh. 454 G

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a_1	$a_1 \cdot m$	Zn % a_2	$a_2 \cdot m$	S % a_3	$a_3 \cdot m$	Fe % a_4	$a_4 \cdot m$
	fra nord met syd									
1	0 - 1.00	1.00	0.48		1.35		22.-			
2	1.00 - 1.90	0.90	0.60		0.20		34.-			
Σ 1-2	0.00 - 1.90	1.90	0.54		0.81		27.68			

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Piggprøver på 2. borert over mellomort nivå - vest
malmsone I. - vest, stoff ligger 9,30m mot vest fra m.p. 2025

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordl. side</i> 0,00-1,00	1,00	0,30		0,40		34,80			
2.	1,00-2,00	1,00	0,10		0,40		34,60			
3.	2,00-2,45	0,45	0,20		0,30		15,00			
4.	2,45-3,65	1,20	0,10		0,60		1,00			
Σ 1-2.	0,00-2,00	2,00	0,20	0,4000	0,40	0,8000	34,70	6,94000		
Σ 1-3.	0,00-2,45	2,45	0,20	0,4900	0,38	0,9400	31,08	76,1500		
Σ 1-4.	0,00-3,65	3,65	0,17	0,6100	0,45	1,6550	21,19	77,3500		

1. berort över mel-
lonert nivå-test
malmson I.



Y+1180

Y+1140

Y+1100

X+160

X+120

X+80

X+40

Geologiske farge-forklaringer:


-  Meltekryсталinsk epidott-karbonatisk $[\text{CaFe}(\text{Al}_2)_{1-2} - \text{CaMg}(\text{Fe}_2)]$ amfibolitt
-  Kloritt-biotittisk, lett karbonatisk amfibolitt-skræstifer
-  FeS_2 finkornet-massiv malm
-  FeS_2 finkornet-massiv malm med innfelte striper av finkornet Fe_3O_4 malmen er stort sett rikere på CaFeS_2
-  Oppløst og lett rustet FeS_2 finkornet malm med lokale belegg av $2\text{CuO} \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ og $\text{CuO} \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ og CuS .
-  Kloritt, epidott, amfibolitt, ledere biotittisk og lett karbonatisk skræstifer og skreglummerskifer med enkelte små ksenoklaste og hyalidoblaster av FeS_2 eller Fe_3O_4 .
-  Stort sett svak impregnasjon av FeS_2 , FeS og mere skjelden av CaFeS_2 og Fe_3O_4 .
-  α = metakvartsitt, β = lateral-sekretisk kvarts

τ_{90° Strøk og fall

$\rightarrow$ Faldning - akse

∇_{75° Forkastninger - sprekker

Kartlagt 10. s 1974 M. Molys



IVERREJELLET		Målestokk	Tegn. 1/250	Kfr.
Borort over mellemortnivå.		1:250	G.kj.	
SONE I.				
Såle ca. 1103.7 m.o.h.				
Folldal Verk A/s		Erstatning for:		
Folldal		Erstattet av:		

Y+1180

Y+1140

Y+1100

Y+1060

Y+1020

X ÷ 160

X ÷ 120

X ÷ 80

X ÷ 40

Geologiske fargeforklaringer:

- massiv FeS_2 malm.
- massiv båndet sulfidmalm med striper og mellomlag av Fe_3O_4 delvis anrikt med CuFeS_2 .
- sterk oppløst FeS_2 malm.
- fylonitt-grønnglimmerskifer delvis anrikt med FeS , FeS_2 og CuFeS_2 .
- amfibolitt-sliregniesglimmerskifer delvis svak anrikt med FeS_2 og FeS , ved malmgrense oppløst.

Geologisk kartlagt og tegnet av M.Motys 2.7.75.

IVERFJELLET

Borort over mellomortnivå.
 SONE I.
 Sålte ca. 1103,7 m.o.h.

Folldal Verk A/s
 Folldal

Målestokk	Tegn. 1:250	Kfr.	
		G.kj.	
Erstatning for:			
Erstattet av:			

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S , TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: 1. borert over mellomort nivå - vest i malmsone I.
til tekniske malmreserver i kategori A

MELLOM KOORDINATER:

Y = +1094,50 , Y' = +1193,30

symbol	PROFIL AV PRØ- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM m	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER m	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM m	MALM AREAL		GJENNOMSNIITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ							
					A	$\frac{c + Aa}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
					B	$\frac{c + Ba}{2} \cdot \frac{b}{2}$								
		a	b	c	d		Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe%	%m
							e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h
A	profil a Y+1094,50	9,10					0,98		1,08		32,56			
B	profil b Y+1097,70	8,90					0,80		1,19		37,27			
A	profil b Y+1097,70	8,90					0,80		1,19		37,27			
B	profil c Y+1101,30	9,00					0,76		1,30		35,01			
A	profil c Y+1101,30	9,00					0,76		1,30		35,01			
B	profil d Y+1111,40	9,20					1,43		1,43		33,73			
A	profil d Y+1111,40	9,20					1,43		1,43		33,73			
B	profil e Y+1127,30	11,10					0,75		1,32		38,31			
A	profil e Y+1127,30	11,10					0,75		1,32		38,31			
B	profil f Y+1143,10	10,80					0,91		1,75		38,60			
A	profil f Y+1143,10	10,80					0,91		1,75		38,60			
B	profil g Y+1156,50	10,35					1,33		0,61		29,83			
A	profil g Y+1156,50	10,35					1,33		0,61		29,83			
B	profil h Y+1162,80	13,80					1,47		0,26		29,03			
A	profil h Y+1162,80	13,80					1,47		0,26		29,03			
B	profil i Y+1177,30	9,30					1,95		0,52		39,17			
A	profil i Y+1177,30	9,30					1,95		0,52		39,17			
B	profil j Y+1186,90	2,70					1,42		0,17		35,40			
A	profil j Y+1186,90	2,70					1,42		0,17		35,40			
B	profil k Y+1193,30	0,10					0,45		0,10		25,00			
Σ	Malmareal 1. borert	→	98,80	9,51	939,14		1,20		1,04		35,14			

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 337 G, 1. borert over mellomort nivå - vest i malmsone J.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	0,35	0,3500	0,15	0,1500	11,00	11,0000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,30	0,3000	0,20	0,2000	6,00	6,0000		
3.	2,00 - 3,30	1,30	0,20	0,2600	0,15	0,1950	10,25	13,3250		
4.	3,30 - 4,10	0,80	1,45	1,1600	0,05	0,0400	41,50	33,2000		
5.	4,10 - 4,50	0,40	0,45	0,1800	0,20	0,0800	4,00	1,6000		
6.	4,50 - 4,85	0,35	1,90	0,6650	0,14	0,0490	43,25	15,1375		
7.	4,85 - 5,45	0,60	0,50	0,3000	0,17	0,1020	8,50	5,1000		
8.	5,45 - 6,50	1,05	1,40	1,4700	0,24	0,2520	44,25	46,4625		
9.	6,50 - 7,50	1,00	2,00	2,0000	0,22	0,2200	42,50	42,5000		
10.	7,50 - 8,00	0,50	1,80	0,9000	0,12	0,0600	44,75	22,3750		
11.	8,00 - 9,00	1,00	0,10	0,1000	0,15	0,1500	8,00	8,0000		
12.	9,00 - 9,80	0,80	0,15	0,1200	0,20	0,1600	6,00	4,8000		
13.	9,80 - 10,80	1,00	0,20	0,2000	0,35	0,3500	6,50	6,5000		
14.	10,80 - 11,80	1,00	0,05	0,0500	0,30	0,3000	1,00	1,0000		
15.	11,80 - 12,80	1,00	1,00	1,0000	0,25	0,2500	4,50	4,5000		
16.	12,80 - 13,80	1,00	0,55	0,5500	0,10	0,1000	2,25	2,2500		
17.	13,80 - 14,80	1,00	0,12	0,1200	0,18	0,1800	5,50	5,5000		
18.	14,80 - 15,60	0,80	0,20	0,1600	0,10	0,0800	2,25	1,8000		
Σ 1-3.	0,00 - 3,30	3,30	0,28	0,9100	0,17	0,5450	9,19	30,3250		
Σ 4-10.	3,30 - 8,00	4,70	1,42	6,6750	0,17	0,8030	35,40	166,3750		
Σ 11-12.	8,00 - 9,80	1,80	0,12	0,2200	0,17	0,3100	7,11	12,8000		
Σ 13-18.	9,80 - 15,60	5,80	0,36	2,0800	0,22	1,2600	3,72	21,5500		
Σ 1-18.	0,00 - 15,60	8,00	0,95	7,5850	0,17	1,3480	24,59	196,7000		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på 1. borort over mellomort nivå - vest, malmsone I.
18,20 m mot vest fra m.p. 1930.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordlig side 0,00 - 1,00	1,00	2,40	2,4000	0,13	0,1300	39,00	39,0000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,90	1,9000	0,30	0,3000	32,00	32,0000		
3.	2,00 - 3,00	1,00	1,05	1,0500	1,70	1,7000	31,25	31,2500		
4.	3,00 - 3,80	0,80	0,75	0,6000	1,75	1,4000	30,50	24,4000		
</										

(h) profil f

riggprøver på l. korort over mellomort nivå - vest i malmsone
I. - vest, fra stoff som ligger 4600 m mot vest fra m.p. 1912.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordlig side 0,00 - 0,60	0,60	4,25	2,5500	0,30	0,1800	36,50	21,9000		
2.	0,60 - 1,60	1,00	0,40	0,4000	0,10	0,1000	2,50	2,5000		
3.	1,60 - 2,60	1,00	0,03	0,0300	0,05	0,0500	0,50	0,5000		
4.	2,60 - 3,60	1,00	0,06	0,0600	0,12	0,1200	0,50	0,5000		
Σ fra nordlig side 1-4. 0,00 - 3,60		3,60	0,84	3,0400	0,13	0,4500	7,06	25,4000		
Σ fra nordlig side 1-2. 0,00 - 1,60		1,60	1,84	2,9500	0,18	0,2800	15,25	24,4000		

profil 9

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>piggprøver på l. korort over mellomort nivå - vest, i malmsone I. fra stoff som ligger 38,30m mot vest fra m.p. 1912. (alt fra nord side)</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordlig side</i> 0,00-0,50	0,50	0,70	0,3500	0,45	0,2250	15,75	7,8750		
2.	0,50-1,20	0,70	1,20	0,8400	1,00	0,7000	28,00	19,6000		
3.	1,20-2,20	1,00	0,82	0,8200	1,35	1,3500	34,00	34,0000		
4.	2,20-3,20	1,00	0,35	0,3500	1,60	1,6000	32,00	32,0000		
5.	3,20-3,80	0,60	0,06	0,0360	0,15	0,0900	2,00	1,2000		
Σ 1-4.	0,00-3,20	3,20	0,74	2,3600	1,21	3,8750	29,21	93,4750		
Σ 2-4.	0,50-3,20	2,70	0,74	2,0100	1,35	3,6500	31,70	85,6000		
Σ 1-5.	0,00-3,80	3,80	0,63	2,3960	1,04	3,9650	24,91	94,6750		

Ⓣ profil d

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver på l. borort over mellomort nivå vest i malmsone I., fra stoff som ligger 24,80 m mot vest fra m.p. 1912 (tatt fra nordlig side).

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	0,00 - 0,80	0,80	1,30	1,0400	1,75	1,4000	34,00	27,2000		
2.	0,80 - 1,60	0,80	0,50	0,4000	1,40	1,1200	34,00	27,2000		
3.	1,60 - 2,40	0,80	0,30	0,2400	1,10	0,8800	36,00	28,8000		
4.	2,40 - 3,20	0,80	0,38	0,3040	1,25	1,0000	36,25	29,0000		
5.	3,20 - 3,90	0,70	0,32	0,2240	1,25	0,8750	27,00	18,9000		
Σ 1-5	0,00 - 3,90	3,90	0,57	2,2080	1,35	5,2750	33,62	131,1000		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver på 1. borort over mellomort nivå - vest i malmsone I.*
fra stoff som ligger 3,20 m mot vest fra m.p. 1911.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordlig side</i> 0,00 - 1,00	1,00	1,08	1,0800	0,50	0,5000	45,25	45,2500		
2.	1,00 - 2,00	1,00	2,05	2,0500	1,10	1,1000	27,35	27,3500		
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,63	0,6300	1,60	1,6000	37,30	37,3000		
4.	3,00 - 4,00	1,00	0,26	0,2600	1,30	1,3000	31,10	31,1000		
Σ	<i>fra nordlig side</i> 1-4. 0,00 - 4,00	4,00	1,01	4,0200	1,13	4,5000	35,25	141,0000		

④ profil b

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver* på 1. korort over mellomort nivå - vest i malmen
ne I., stoff som ligger 1640m mot vest fra mp. 1911

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordlig side</i> 0,00 - 1,00	1,00	2,25	2,2500	1,20	1,2000	28,00	28,0000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,67	0,6700	3,90	3,9000	35,50	35,5000		
3.	2,00 - 2,70	0,70	0,30	0,2100	1,50	1,0500	32,25	22,5750		
4.	2,70 - 3,40	0,70	0,30	0,2100	1,40	0,9800	27,00	18,9000		
5.	3,40 - 4,30	0,90	0,07	0,0630	0,40	0,3600	7,00	6,3000		
Σ fra nordlig side										
1-4.	0,00 - 3,40	3,40	0,98	3,3400	2,10	7,1300	30,88	104,9750		
Σ fra nordlig side										
1-5.	0,00 - 4,30	4,30	0,79	3,4030	1,74	7,4900	25,88	111,2750		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>piggprøver på 1. borert over mellomort nivå - vest i malm- sone I, treirslag mot nord, mellom 5m nordover og 2m sydover fra 1911</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordl. gre. 0,00 - 1,00</i>	1,00	0,76	0,7600	1,70	1,7000	37,00	37,0000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,40	1,4000	1,70	1,7000	42,00	42,0000		
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,85	0,8500	0,20	0,2000	46,00	46,0000		
4.	3,00 - 4,00	1,00	1,30	1,3000	0,75	0,7500	32,00	32,0000		
5.	4,00 - 5,00	1,00	0,35	0,3500	1,50	1,5000	33,00	33,0000		
6.	5,00 - 6,00	1,00	0,15	0,1500	1,30	1,3000	33,60	33,6000		

(a)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
piggprøver på 1. borert over mellomort nivå - vest, høyre-øst- lig side av ternslag mot nord, mellom 5,00 m og 3,00 m sydover fra (1911)										
1.	fra nordlig grense 0,00 - 1,00	1,00	1,75	1,7500	0,90	0,9000	36,50	36,5000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,80	1,8000	1,25	1,2500	39,50	39,5000		
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,82	0,8200	0,30	0,3000	42,50	42,5000		
4.	3,00 - 4,00	1,00	1,45	1,4500	0,60	0,6000	30,50	30,5000		
5.	4,00 - 5,00	1,00	1,00	1,0000	1,50	1,5000	32,00	32,0000		
6.	5,00 - 6,00	1,00	0,50	0,5000	1,50	1,5000	30,00	30,0000		
7.	6,00 - 7,00	1,00	0,20	0,2000	1,60	1,6000	31,00	31,0000		
8.	7,00 - 8,00	1,00	0,30	0,3000	0,95	0,9500	18,50	18,5000		

Mellomort nivå
vest

Areal av malm på nivå : *Mellomort nivå-vest i malmsone I, borort nr. 24.*
tekniske malmreserver i kategori A. (Y+1079,60 til Y+1168,80)

NR.	BORORT	GJ.SNITT. MEKTIGHET	LENGDE AV MALMSONE	AREAL AV MALMSONE	KOBBER GEHAL.	—	SINK GEHAL.	—	SVOVEL GEHAL.	—
a	b	m c	m d	m ² e	% f	m% e·f	% g	m% e·g	% h	m% e·h
1.	24.	11,10	89,90	998,0458	1,27	1264,1867	0,70	695,8353	35,29	35221,0153
∑	del av pilar 4.	6,15	6,00	36,9000	1,15	42,4350	1,35	49,8150	37,04	1366,7760
sum av borort (24), mellom koordinater Y+1085,70 til Y+1168,80										
Σ	24.	11,46	83,90	961,1458	1,27	1221,7517	0,67	646,0203	35,22	33854,2393

Areal av malm på nivå : *Mellomort nivå - vest, i malmsone I., borort nr. 19.*
tekniske malmreserver i kategori A. (Y+1014,00 til Y+1079,60)

NR.	BORORT	GJ.SNITT. MEKTIGHET	LENGDE AV MALMSONE	AREAL AV MALMSONE	KOBBER GEHAL.		SINK GEHAL.		SVOVEL GEHAL.	
a	b	m c	m d	m ² e	% f	m % e·f	% g	m % e·g	% h	m % e·h
1.	19.	8,44	65,90	556,4127	1,02	570,0715	1,26	699,5255	35,18	19574,2916
÷	del av pilar 3.	7,80	6,10	47,5800	1,46	69,4668	1,42	67,5636	35,90	1708,1220
÷	del av pilar 4.	6,00	5,70	34,2000	1,06	36,2520	1,39	47,5380	35,75	1222,6500
sum av borort (19.), mellom koordinater Y+1025,80 og Y+1073,90										
Σ	19.	8,77	54,10	474,6327	0,98	464,3527	1,23	584,4239	35,07	16643,5196

Areal av malm på nivå : *Mellomort nivå-vest, i malmsone I, borort nr. 14.*
tekniske malmreserver i kategori A. (Y+958,80 til Y+1014,00)

NR.	BORORT	GJ.SNITT. MEKTIGHET	LENGDE AV MALMSONE	AREAL AV MALMSONE	KOBBER GEHAL.	—	SINK GEHAL.	—	SVOVEL GEHAL.	—
a	b	m c	m d	m ² e	% f	m % e·f	% g	m % e·g	% h	m % e·h
1.	14.	15,04	57,80	869,5826	9,76	657,1755	1,25	1089,2907	39,39	34256,7152
∴	del av pilar 2.	20,80	9,60	199,6800	9,56	111,8208	1,18	235,6224	38,16	7619,7888
sum av borort (14.), mellom koordinater Y+968,10 og Y+1014,00										
Σ	14.	13,90	48,20	669,9026	9,81	545,3547	1,27	853,6683	39,76	26636,9264

Areal av malm på nivå : Mellomort nivå-vest, i malmsonen I, borort nr 9. tekniske malmreserver i kategori A. ($V+892.70$ t) ($V+958.80$)

[illegible]

Areal av malm på nivå :

sum av borort (4), mellom koordinater $Y+816,90$ og $Y+894,90$

Y+1140

Y+1100

Y+1060

Y+1020

Y+980

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0 %

Cu %

(u)

(t)

(s)

(r)

(q)

(p)

(o)

(n)

(m)

(l)

(k)

0m
mektighet av
J malm

X+120


15m

10m

5m

X+20

X+40



Geologi & beredning kartlagt ved M. Mørås 23/11-74

ETG. I SONE I
Y+ 980 - Y+ 1140Folldal Verk A/s
Folldal

Målestokk	Tegn. A.S.	13/1-71
1:250	Kfr.	
	G.K.	
Avd./Gr. 30/11	Erstatning for:	
	TG-3298-1	
	Erstattet av:	

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S, TVERRFJELLET GRUVE

PÅ NIVÅ: mellomort nivå - vest, i malmsone I. MELLOM KOORDINATER: Y = +816,90, Y' = 1168,80

symbol	PROFIL AV PRO- OG ORTER HULL OG HVOR PÅ NIVÅ VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM	MALM AREAL	GJENNOMSNITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ											
						A		B		Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe %	%m
						$\frac{c + Aa}{2}$	$\frac{b}{2}$	$\frac{c + Ba}{2}$	$\frac{b}{2}$								
						m	m	m	m ²								
		a	b	c	d	e	d·e	f	d·f	g	d·g	h	d·h				
A	profil ② Y+816,90	3,30	8,60	8,000	24,2950	1,07	25,9957	0,37	8,9892	42,88	1041,7696	40,26	978,1167				
B	profil ③ Y+825,00	12,70			44,5050	0,67	29,8184	1,41	62,7521	43,81	1949,7641	37,73	1679,1737				
A	profil ④ Y+825,00	12,70	11,80	14,025	78,8388	0,67	52,8220	1,41	111,1627	43,81	345,39278	37,73	2974,5879				
B	profil ⑤ Y+836,80	15,35			86,6563	0,37	32,0628	1,56	135,1838	39,95	3461,9192	33,75	2924,6501				
A	profil ⑥ Y+836,80	15,35	19,10	14,150	140,8625	0,37	52,1191	1,56	219,7455	39,95	5627,4569	33,75	4754,1094				
B	profil ⑦ Y+855,40	12,95			129,4025	0,38	49,1730	1,56	201,8679	42,86	5546,1912	36,79	4760,7180				
A	profil ⑧ Y+855,40	12,95	24,10	11,375	146,5581	0,38	55,6921	1,56	228,6306	42,86	6281,4802	36,79	5391,8725				
B	profil ⑨ Y+879,50	9,80			127,5794	0,27	34,4464	1,47	157,5417	35,10	4478,0369	31,43	4009,8205				
A	profil ⑩ Y+879,50	9,80	13,30	8,675	61,4294	0,27	14,5859	1,47	99,3012	35,10	2156,1719	31,43	1939,7260				
B	profil ⑪ Y+892,70	7,55			53,9481	0,29	15,6449	1,51	81,4616	39,76	2144,9765	33,86	1826,6827				
A	profil ⑫ Y+892,70	7,55	28,70	7,900	110,8538	0,29	32,1476	1,51	167,3892	39,76	4407,5471	33,86	3753,5697				
B	profil ⑬ Y+921,20	8,25			115,8763	0,65	75,3196	1,36	157,5918	40,71	4717,3242	35,55	4119,4025				
A	profil ⑭ Y+921,20	8,25	25,40	10,475	118,9038	0,65	77,2835	1,36	161,7092	40,71	4840,5737	35,55	4227,0301				
B	profil ⑮ Y+946,60	12,70			147,1613	0,69	101,543	1,23	181,0084	40,09	5899,6965	34,48	5074,1216				
A	profil ⑯ Y+946,60	12,70	12,40	15,600	87,7300	0,69	60,537	1,23	107,9079	40,09	3577,0957	34,48	3024,9304				
B	profil ⑰ Y+958,80	18,50			105,7100	0,57	60,257	1,17	123,6807	37,00	3911,2700	30,50	3224,1550				
A	profil ⑱ Y+958,80	18,50	16,50	18,650	153,2438	0,57	87,349	1,17	179,2952	37,00	5670,0206	30,50	4673,9359				
B	profil ⑲ Y+974,60	18,80			154,4813	0,53	81,877	1,20	185,3776	41,62	6429,5117	34,84	5382,1285				
A	profil ⑳ Y+974,60	18,80	14,50	17,975	133,3094	0,53	79,659	1,20	159,9713	41,62	5548,3372	34,84	4644,4995				
B	profil ㉑ Y+988,72	17,15			127,3281	0,99	126,058	1,37	174,4395	37,76	4807,9091	33,58	4148,3495				
A	profil ㉒ Y+988,72	17,15	9,80	14,900	70,5100	0,99	69,8049	1,37	96,5987	37,76	3624,576	33,58	2297,2158				
B	profil ㉓ Y+997,00	12,65			60,6100	0,92	55,7612	1,34	81,2174	39,50	3394,0950	32,08	1944,3688				
A	profil ㉔ Y+997,00	12,65	18,00	9,450	99,4500	0,92	91,4940	1,34	133,2630	39,50	3928,2750	32,08	3190,3560				
B	profil ㉕ Y+1044,00	6,25			70,6500	1,05	74,1825	1,12	79,1280	39,86	3816,1090	33,59	2373,1335				
A	profil ㉖ Y+1044,00	6,25	5,90	6,425	18,6956	1,05	19,6304	1,12	20,9391	39,86	745,2066	33,59	627,9852				
B	profil ㉗ Y+1020,00	6,60			19,2119	1,46	28,0494	1,42	27,2809	35,90	689,7072	30,08	577,8940				
A	profil ㉘ Y+1020,00	6,60	18,10	7,850	65,3863	1,46	95,4640	1,42	92,8485	35,90	2347,3682	30,08	1966,8199				
B	profil ㉙ Y+1037,80	9,10			87,1063	0,91	79,2667	1,10	95,8169	36,57	3185,4774	32,37	2819,6309				
A	profil ㉚ Y+1037,80	9,10	13,60	9,450	63,0700	0,91	57,3937	1,10	69,3770	36,57	2306,4699	32,37	2041,5759				
B	profil ㉛ Y+1051,10	9,80			65,4500	0,98	64,1410	1,17	76,5765	34,17	2236,4265	28,65	1875,1425				
A	profil ㉜ Y+1051,10	9,80	21,20	8,900	99,1100	0,98	97,1278	1,17	115,9587	34,17	3386,5887	28,65	2839,5015				
B	profil ㉝ Y+1072,30	8,00			89,5700	0,89	79,7173	1,47	131,6679	33,17	2971,0369	25,90	2319,8630				
A	profil ㉞ Y+1072,30	8,00	7,10	6,850	26,3588	0,89	23,4593	1,47	38,7474	33,17	974,3214	25,90	682,6929				
B	profil ㉟ Y+1079,60	5,70			22,4538	1,15	25,8219	1,35	39,3126	37,04	931,6888	33,04	741,8736				
A	profil ㊱ Y+1079,60	5,70	16,00	8,600	57,2000	1,15	65,7800	1,35	77,2200	37,04	118,6880	33,04	1889,8880				
B	profil ㊲ Y+1085,60	11,50			80,4000	0,70	56,2800	1,27	102,1080	34,48	772,1920						
A	profil ㊳ Y+1085,60	11,50	15,40	14,555	100,3118	0,70	70,2183	1,27	127,3960	34,48	458,7509						
B	profil ㊴ Y+1110,90	17,61			123,8353	1,48	183,2762	0,83	102,7833	33,36	431,1456						
A	profil ㊵ Y+1110,90	17,61	9,70	15,705	80,7889	1,48	119,5676	0,83	67,0548	33,36	2695,1177						
B	profil ㊶ Y+1129,30	13,80			71,5496	1,80	128,7893	0,56	40,0678	30,30	2167,9529						
A	profil ㊷ Y+1129,30	13,80	21,80	12,750	144,6975	1,80	260,4555	0,56	81,0306	30,30	4384,3343						
B	profil ㊸ Y+1141,90	11,70			133,2525	1,04	138,5826	0,31	41,3083	39,55	5270,1364						
A	profil ㊹ Y+1141,90	11,70	14,20	10,475	78,7213	1,04	81,8702	0,31	24,4036	39,55	313,4274						
B	profil ㊺ Y+1156,00	9,25			70,0238	1,17	81,9278	0,29	20,3069	38,71	2710,6213						
A	profil ㊻ Y+1156,00	9,25	6,60	6,375	25,7813	1,17	30,1641	0,29	7,4766	38,71	997,9941						
B	profil ㊼ Y+1167,60	3,50			16,2938	1,53	24,9295	0,16	2,6070	45,07	784,3616						
A	profil ㊽ Y+1167,60	3,50	6,20	2,450	9,2225	1,53	14,1104	0,16	1,4756	45,07	415,6581						
B	profil ㊾ Y+1168,80	1,40			5,9675	1,38	8,2352	0,10	0,5968	42,00	250,6350						
A																	
B																	
A																	
B																	
A																	
B																	
A																	
B																	
A																	
B																	
Σ	mellomort n. malmsone I.	→	357,00	11,22	4004,3514	0,81	3262,8784	1,18	4711,5750	38,08	152487,2236						

berørt nr. 4.

berørt nr. 9.

berørt nr. 14.

berørt nr. 19.

profil (Z)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver på mellomort nivå - vest, fra siste vestlig stuf som ligger 17,00 m vest fra m.p. 1773.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. gr. 0,00 - 0,70	0,70	1,40	0,9800	0,10	0,0700	42,00	29,4000		
2.	0,70 - 1,40	0,70	1,35	0,9450	0,09	0,0630	42,00	29,4000		
Σ	fra nordl. gr. 1-2. 0,00 - 1,40	1,40	1,38	1,9250	0,10	0,1330	42,00	58,8000		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver på mellomort nivå-vest i malomsone I., fra stoff av feltort som ligger 31,50m mot vest fra m.p. 1741*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordl. grense</i> 0,00 - 0,80	0,80	1,30	1,0400	0,12	0,0960	44,00	35,2000	39,80	31,8400
2.	0,80 - 1,60	0,80	1,65	1,3200	0,11	0,0880	44,50	35,6000	40,00	32,0000
3.	1,60 - 3,10	1,50	0,25	0,3750	0,13	0,1950	11,00	16,5000	9,75	14,6250
4.	3,10 - 3,60	0,50	2,35	1,1750	0,11	0,0550	35,50	17,7500	31,30	15,6500

Σ	<i>fra nordl. grense</i> 1-2. 0,00 - 1,60	1,60	1,48	2,3600	0,12	0,1840	44,25	70,8000	39,90	63,8400
---	--	------	------	--------	------	--------	-------	---------	-------	---------

Σ	<i>fra nordl. grens.</i> 1-4. 0,00 - 3,60	3,60	1,09	3,9100	0,12	0,4340	29,18	105,0500	26,14	94,1150
---	--	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	---------

profil (Y)

piggprøver på mellomort nivå - vest i malmsonen I.
fra stoff som ligger 27,30m mot vest fra m.p. 1741

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på mellomort nivå - vest i malmsonen I.
fra stoff som ligger 27,30 m mot vest fra m.p. 1741

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. gr. 0,00 - 1,00	1,00	1,75	1,7500	0,25	0,2500	42,75	42,7500		
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,20	1,2000	0,10	0,1000	46,50	46,5000		
3.	2,00 - 3,00	1,00	1,40	1,4000	0,15	0,1500	45,50	45,5000		
4.	3,00 - 3,50	0,50	2,00	1,0000	0,12	0,0600	46,00	23,0000		
Σ fra nordl. gr. 1.-4. 0,00 - 3,50										
		3,50	1,53	5,3500	0,16	0,5600	45,07	157,7500		
sum av profil (Y)										
Σ piggprøver										
		3,50	1,53	5,3500	0,16	0,5600	45,07	157,7500		

profil (X)

Gjennomsnitt av kjemisk analyse for borhull nr. 308 G, på melbort nivå - vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 0,40	0,40	2,55	1,0200	0,25	0,1000	38,50	15,4000		
2.	0,40 - 1,55	1,15	0,35	0,4025	0,25	0,2875	8,50	9,7750		
3.	1,55 - 2,85	1,30	1,00	1,3000	1,05	1,3650	36,00	46,8000		
Σ 1-3	0,00 - 2,85	2,85	0,96	2,7225	0,61	1,7525	25,25	71,9750		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver på mellomort nivå - vest, feltort i malmsonene I., fra stoff som ligger 20,60m mot vest fra m.p. 1741.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordlig side 0,00 - 1,00	1,00	1,70	1,7000	0,30	0,3000	41,75	41,7500	40,00	40,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,85	0,8500	0,15	0,1500	46,00	46,0000	42,50	42,5000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,95	0,9500	0,08	0,0800	48,00	48,0000	45,00	45,0000
4.	3,00 - 3,70	0,70	1,05	0,7350	0,10	0,0700	46,00	32,2000	43,00	30,1000
Σ	fra nordlig side 1-4. 0,00 - 3,70	3,70	1,14	4,2350	0,16	0,6000	45,39	167,9500	42,59	157,6000

profil (X)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 309 G, på mellomort nivå - vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	1,30	1,3000	0,12	0,1200	44,00	44,0000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,55	1,5500	0,10	0,1000	44,00	44,0000		
3.	2,00 - 2,70	0,70	1,50	1,0500	0,12	0,0840	43,00	30,1000		
Σ 1-3.	0,00 - 2,70	2,70	1,44	3,9000	0,11	0,5040	43,74	118,1000		

sum av profil (X)

Σ piggprøver kjerneprøver	9,25	1,17	10,8575	0,29	2,6565	38,71	358,0250			
---------------------------------	------	------	---------	------	--------	-------	----------	--	--	--

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver på mellomort nivå - vest i malmsonen I., fra stoff av feltort som ligger 13,30m mot vest fra m.p. 1741*

piggeprøver på mellemort nivå - vest i malmzone I, fra
støff av feltort som ligger 13,30m mot vest fra n.p. 1741

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00 - 1,00	1,00	0,60	0,6000	1,25	1,2500	39,00	39,0000	34,00	34,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,60	1,6000	0,70	0,7000	43,50	43,5000	38,30	38,3000
3.	2,00 - 3,00	1,00	1,50	1,5000	0,12	0,1200	46,50	46,5000	40,65	40,6500
4.	3,00 - 3,50	0,50	1,17	0,5850	0,11	0,0550	47,00	23,5000	41,40	20,7000
Σ	fra nordl. side 1-4. 0,00 - 3,50	3,50	1,22	4,2850	0,61	2,1250	43,57	152,5000	38,19	133,6500

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Σ fra nordl. side 1-4 000 - 4,10	4,10	1,16	4 7450	0,35	1 4150	41,79	171,3500	37,69	154 5400
--	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

profil (V)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 3066, på mellomort nivå - vest
malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,75	0,7500	1,05	1,0500	39,00	39,0000		
2.	1,00-2,00	1,00	0,30	0,3000	1,30	1,3000	25,00	25,0000		
3.	2,00-2,70	0,70	0,20	0,1400	0,35	0,2450	17,00	11,9000		
Σ 1-3	0,00-2,70	2,70	0,44	1,1900	0,96	2,5950	28,11	75,9000		

profil (V)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 3076, på mellomert nivå - vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	1,35	1,3500	0,11	0,1100	44,00	44,0000		
2.	1,00-2,00	1,00	1,60	1,6000	0,08	0,0800	44,00	44,0000		
3.	2,00-3,00	1,00	1,10	1,1000	0,12	0,1200	45,50	45,5000		
4.	3,00-4,00	1,00	1,30	1,3000	0,10	0,1000	42,50	42,5000		
5.	4,00-5,30	1,30	1,45	1,8850	0,11	0,1430	36,00	46,8000		
Σ 1-5.	0,00-5,30	5,30	1,37	7,2350	0,10	0,5530	42,04	222,8000		
sum av profil (V)										
Σ	piggprøver kjerneprøver	11,70	1,04	12,1100	0,31	3,6020	39,55	462,7500		

profil 4

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 304 G på mellomert nivå - vest
; malomsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	1,85	1,8500	0,10	0,1000	23,75	23,7500		
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,05	1,0500	0,05	0,0500	23,50	23,5000		
3.	2,00 - 3,00	1,00	2,35	2,3500	0,20	0,2000	32,00	32,0000		
4.	3,00 - 4,00	1,00	0,95	0,9500	0,75	0,7500	39,00	39,0000		
5.	4,00 - 5,00	1,00	0,57	0,5700	1,05	1,0500	38,75	38,7500		
6.	5,00 - 6,00	1,00	0,50	0,5000	1,15	1,1500	41,50	41,5000		
7.	6,00 - 6,70	0,70	0,78	0,5460	1,20	0,8400	38,00	26,6000		
8.	6,70 - 8,00	1,30	0,10	0,1300	0,25	0,3250	5,00	6,5000		
9.	8,00 - 9,30	1,30	0,05	0,0650	0,10	0,1300	0,50	0,6500		
10.	9,30 - 10,00	0,70	4,00	2,8000	0,65	0,4550	14,50	10,1500		
11.	10,00 - 10,90	0,90	1,75	1,5750	0,28	0,2520	24,00	21,6000		
Σ 1.-7.	0,00 - 6,70	6,70	1,17	7,8160	0,62	4,1400	33,60	225,1000		
Σ 1.-11.	0,00 - 10,90	10,90	1,14	12,3860	0,49	5,3020	24,22	264,0000		

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på mellomort nivå - vest i molnison
I, fra stuff som ligger 22,80m mot vest fra m.p. 1719

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00-1,00	1,00	2,80	2,8000	0,10	0,1000	25,50	25,5000	36,00	36,0000
2.	1,00-2,00	1,00	3,30	3,3000	0,15	0,1500	22,00	22,0000	30,00	30,0000
3.	2,00-3,00	1,00	1,90	1,9000	0,07	0,0700	34,00	34,0000	30,00	30,0000
4.	3,00-3,60	0,60	1,75	1,0500	0,09	0,0540	35,00	21,0000	31,00	18,6000
Σ	fra nordl. side 1-4 0,00-3,60	3,60	2,51	9,0500	0,10	0,3740	28,47	102,5000	31,83	114,6000

profil 21

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 305 G, på mellomort nivå - vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	1,75	1,7500	0,25	0,2500	10,00	10,0000		
2.	1,00-2,00	1,00	4,75	4,7500	0,95	0,9500	27,00	27,0000		
3.	2,00-3,00	1,00	1,35	1,3500	1,50	1,5000	31,50	31,5000		
4.	3,00-3,50	0,50	0,35	0,1750	0,95	0,4750	20,00	10,0000		
Σ 1-4.	0,00-3,50	3,50	2,29	8,0250	0,91	3,1750	22,43	78,5000		
sum av profil 21										
Σ	piggprøver jernprøver	13,80	1,80	24,8910	0,56	7,6890	30,30	418,2000		

prof. 1 (t)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 302G, på mellomort nivå - vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,10	1,10	1,20	1,3200	0,15	0,1650	18,00	19,8000		
2.	1,10 - 2,00	0,90	0,80	0,7200	1,35	1,2150	39,50	35,5500		
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,83	0,8300	1,05	1,0500	38,50	38,5000		
4.	3,00 - 4,00	1,00	0,86	0,8600	0,85	0,8500	40,00	40,0000		
5.	4,00 - 5,00	1,00	0,88	0,8800	0,65	0,6500	42,00	42,0000		
6.	5,00 - 6,00	1,00	0,90	0,9000	0,90	0,9000	40,50	40,5000		
7.	6,00 - 7,00	1,00	0,68	0,6800	0,45	0,4500	44,00	44,0000		
8.	7,00 - 7,45	0,45	0,65	0,2925	1,25	0,5625	40,50	18,2250		
9.	16,00 - 16,95	0,95	0,10	0,0950	1,10	1,0450	42,00	39,9000		
Σ i. 8.	0,00 - 7,45	7,45	0,87	6,4825	0,78	5,8425	36,99	275,5750		



piggprøver på mellomort nivå - vest i malmsone I.
i feltort fra stoff som ligger 1280 m mot vest fra p. 1719

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>piggprøver på mellomort nivå - vest i malmzone I. i feltort fra stuff som ligger 1280 m mot vest fra mp. 1719</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordl. side</i> 0,00 - 1,00	1,00	1,15	1,1500	0,40	0,4000	37,00	37,0000	35,00	35,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,65	0,6500	0,65	0,6500	45,50	45,5000	37,00	37,0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	1,15	1,1500	1,85	1,8500	42,75	42,7500	37,00	37,0000
4.	3,00 - 4,25	1,25	1,10	1,3750	1,00	1,2500	41,50	51,8750	33,00	41,2500
Σ fra nordl. side 1-4. 0,00 - 4,25		4,25	1,02	4,3250	0,98	4,1500	41,68	177,1250	35,35	150,2500

profil ①

Gjennomsnitt av kjemisk analyse for borhull nr. 303 G, på mellomort nivå - vest i malmzone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	1,20	1,2000	0,50	0,5000	18,00	18,0000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,96	0,9600	1,30	1,3000	30,00	30,0000		
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,95	0,9500	1,05	1,0500	29,50	29,5000		
4.	3,00 - 4,00	1,00	1,80	1,8000	0,25	0,2500	22,00	22,0000		
5.	4,00 - 4,50	0,50	1,43	0,7150	0,35	0,1750	9,00	4,5000		
6.	4,50 - 5,55	1,05	8,25	8,6625	1,05	1,1025	24,00	25,2000		
7.	5,55 - 5,91	0,36	3,05	1,0980	0,80	0,2880	15,50	5,5800		
Σ 1-7.	0,00 - 5,91	5,91	2,57	15,1855	0,79	4,6655	22,81	134,7800		
sum av profil ①										
Σ	kjerneprøver piggprøver	17,61	1,48	25,9930	0,83	14,6580	33,36	587,4800		

profil ⑤

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 300G, på mellomort nivå - vest i malm-
sone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	0,75	0,7500	1,70	1,7000	38,50	38,5000		
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,85	0,8500	1,75	1,7500	35,50	35,5000		
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,60	0,6000	1,65	1,6500	40,00	40,0000		
4.	3,00 - 3,95	0,95	0,73	0,6935	1,20	1,1400	34,00	32,3000		
5.	7,45 - 7,80	0,35	0,30	0,1050	0,15	0,0450	18,00	6,3000		
6.	9,40 - 9,65	0,25	1,65	0,4125	0,35	0,0875	19,50	4,8750		
Σ 1-4.	0,00 - 3,95	3,95	0,73	2,8935	1,58	6,2400	37,04	146,3000		

piggprøver på mellomort nivå - vest, feltort i malmsoner.
Fra stoff som ligger 2,50m mot øst fra m.p. 1719

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00 - 1,20	1,20	0,70	0,8400	1,40	1,6800	41,75	50,1000	29,00	34,8000
2.	1,20 - 2,40	1,20	0,60	0,7200	0,30	0,3600	47,75	57,3000	39,00	46,8000
3.	2,40 - 3,40	1,00	0,25	0,2500	0,30	0,3000	27,50	27,5000	27,00	27,0000
4.	3,40 - 4,40	1,00	0,40	0,4000	1,40	1,4000	36,00	36,0000	24,00	24,0000
Σ fra nordl. side 1.-4. 0,00 - 4,40		4,40	0,96	4,2100	0,85	3,7400	38,84	170,9000	30,14	132,6000

profil ⑤

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 3016 på mellomort midt-vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,25	0,2500	1,25	1,2500	23,00	23,0000		
2.	1,00-2,00	1,00	0,10	0,1000	1,05	1,0500	19,50	19,5000		
3.	2,00-3,15	1,15	0,53	0,6095	2,05	2,3575	32,00	36,8000		
Σ 1.-3.	0,00-3,15	3,15	0,30	0,9595	1,48	4,6575	25,17	79,3000		

profil (R)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 251 G, på mellomste nivå - vest i malmsonen I, fra nordlig stoffen av trærslag 4.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	6,30-6,50	0,20	1,15	0,2300	0,15	0,0300	25,00	5,0000	22,00	4,4000
2.	7,60-8,90	1,30	0,50	0,6500	1,75	2,2750	43,00	21,5000	32,00	6,4000
3.	20,50-21,10	0,60	0,30	0,1800	0,90	0,5400	26,00	15,6000	22,50	13,5000
4.	23,25-23,40	0,15	0,20	0,0300	2,20	0,3300	38,50	5,7750	30,00	4,5000
5.	23,75-24,05	0,30	0,10	0,0300	0,80	0,2400	29,75	8,9250	22,00	6,6000
6.	24,05-24,15	0,10	0,60	0,0600	0,15	0,0150	10,00	1,0000	14,00	1,4000
7.	24,15-25,60	1,45	0,25	0,3625	2,00	2,9000	39,00	56,5500	30,00	43,5000
Σ 5-7.	23,75-25,60	1,85	0,24	0,4525	1,71	3,1550	35,93	66,4750	27,84	51,5000

profil (r)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *Piggprøver på mellomort nivå - vest i malmsone I., i tverrslag nr. 4.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. gr. 0,00 - 1,00	1,00	0,35	0,3500	2,30	2,3000	36,00	36,0000	29,00	29,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,85	1,8500	2,20	2,2000	37,00	37,0000	30,00	30,0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,85	0,8500	0,85	0,8500	40,00	40,0000	34,00	34,0000
4.	3,00 - 4,00	1,00	1,50	1,5000	0,25	0,2500	39,25	39,2500	44,00	44,0000
5.	4,00 - 5,00	1,00	1,45	1,4500	1,15	1,1500	39,25	39,2500	38,00	38,0000
6.	5,00 - 5,70	0,70	0,80	0,5600	1,35	0,9450	28,00	19,6000	19,00	13,3000
sum av profil (r)										
Σ	fra nordl. gr. 1-6. 0,00 - 5,70	5,70	1,15	6,5600	1,35	7,6950	37,04	211,1000	33,04	188,3000

profil ⑨

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 205 G, på mellomort nivå-vest, malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	2820-2855	0,35	0,12	0,0420	1,60	0,5600	38,00	13,3000	32,50	11,3750
2.	2855-2900	0,45	0,08	0,0360	0,15	0,0675	5,00	2,2500	4,00	1,8000
3.	2900-2960	0,60	0,25	0,1500	1,65	0,9900	29,00	17,4000	24,00	14,4000
4.	2960-2980	0,20	0,05	0,0100	0,20	0,0400	1,50	0,3000	1,00	0,2000
5.	2980-3080	1,00	0,85	0,8500	0,85	0,8500	40,00	40,0000	31,00	31,0000
6.	3080-3180	1,00	3,00	3,0000	0,45	0,4500	29,50	29,5000	31,00	31,0000
7.	3180-3270	0,90	0,50	0,4500	1,80	1,6200	35,75	32,1750	23,00	20,7000
8.	3270-3335	0,65	0,75	0,4875	2,50	1,6250	44,00	28,6000	36,00	23,4000
9.	3335-3435	1,00	1,85	1,8500	1,10	1,1000	39,00	39,0000	29,50	29,5000
10.	3435-3540	1,05	0,45	0,4725	3,10	3,2550	34,00	35,7000	23,00	24,1500
11.	3540-3640	1,00	0,24	0,2400	1,45	1,4500	33,00	33,0000	25,00	25,0000
12.	3640-3680	0,40	0,26	0,1040	1,50	0,6000	35,00	14,0000	25,50	10,2000
sum av profil ⑨										
Σ 1-12.	2820-3680	8,60	0,89	7,6920	1,47	12,6075	33,17	285,2250	25,90	222,7250
sann mekt. = (8,00)										
Σ 3-12.	2900-3680	7,80	0,98	7,6140	1,54	11,9800	34,57	269,6750	26,87	209,5500

profil (p)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver fra mellomort nivå-vest i malmzone I.
fra stoff som ligger 9,90 m mot vest fra m.p. 1620.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra modl. side 0,00 - 1,10	1,10	9,30	9,3300	2,10	2,3100	40,00	44,0000	30,00	33,0000
2.	1,10 - 2,10	1,00	9,45	9,4500	1,60	1,6000	41,00	41,0000	31,00	31,0000
3.	2,10 - 3,10	1,00	9,38	9,3800	1,70	1,7000	39,00	39,0000	30,50	30,5000
4.	3,10 - 4,40	1,30	9,34	9,4420	1,20	1,5600	40,00	52,0000	31,00	40,3000
Σ	fra modl. side 1-4 0,00 - 4,40	4,40	9,36	1,6020	1,63	7,1700	40,00	176,0000	30,64	134,8000

profil (p)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 235 G, på mellomort nivå-vest, i malm-
sone I., boret mot nord.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,32	0,3200	2,30	2,3000	38,00	38,0000	31,50	31,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,50	0,5000	2,00	2,0000	40,00	40,0000	31,70	31,7000
3.	2,00-3,00	1,00	0,18	0,1800	2,00	2,0000	40,50	40,5000	31,50	31,5000
4.	3,00-4,00	1,00	0,50	0,5000	1,35	1,3500	42,00	42,0000	34,00	34,0000
5.	4,00-5,00	1,00	0,15	0,1500	1,20	1,2000	41,75	41,7500	31,60	31,6000
6.	5,00-6,10	0,90	0,18	0,1620	0,45	0,4050	42,50	38,2500	37,00	33,3000
7.	6,10-6,90	0,80	0,15	0,1200	0,15	0,1200	3,00	2,4000	4,00	3,2000
8.	6,90-7,60	0,70	0,15	0,1050	0,65	0,4550	37,00	25,9000	29,00	20,3000
Σ 1-6.	0,00-6,10	6,10	0,30	1,8120	1,52	9,2550	39,43	240,5000	31,74	193,6000
Σ 1-8.	0,00-7,60	7,60	0,27	2,0370	1,29	9,8300	36,37	268,8000	28,57	217,1000

profil (p)

Gjennomsnitt av kjemisk analyse for borhull nr. 238 G, på mellomort nivå - vest, i malm - sone I., boret mot syd.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,15	1,15	0,20	0,2300	2,00	2,3000	39,00	44,8500	30,00	34,5000
2.	1,15-1,90	0,75	0,30	0,2250	0,20	0,1500	5,00	3,7500	4,00	3,0000
3.	1,90-2,90	1,00	0,50	0,5000	0,20	0,2000	5,25	5,2500	4,00	4,0000
4.	2,90-3,60	0,70	0,75	0,5250	0,15	0,1050	3,00	2,1000	3,00	2,1000
5.	3,60-4,00	0,40	0,50	0,2000	0,40	0,1600	5,25	2,1000	10,00	4,0000
6.	4,00-4,40	0,40	0,40	0,1600	0,40	0,1600	34,00	13,6000	45,00	18,0000
7.	4,40-5,60	1,20	0,10	0,1200	0,05	0,0600	11,00	13,2000	5,00	6,0000
8.	5,60-7,10	1,50	0,15	0,2250	0,10	0,1500	3,00	4,5000	3,00	4,5000
9.	7,10-8,10	1,00	2,15	2,1500	1,70	1,7000	41,50	41,5000	40,00	40,0000
10.	8,10-9,10	1,00	1,15	1,1500	1,65	1,6500	45,00	45,0000	39,00	39,0000
11.	9,10-10,10	1,00	0,95	0,9500	1,80	1,8000	42,00	42,0000	37,00	37,0000
12.	10,10-11,10	1,00	1,90	1,9000	1,50	1,5000	43,00	43,0000	42,00	42,0000
13.	11,10-12,10	1,00	2,25	2,2500	0,90	0,9000	34,00	34,0000	31,00	31,0000
14.	12,10-13,10	1,00	0,50	0,5000	0,50	0,5000	33,00	33,0000	28,00	28,0000
15.	13,10-13,90	0,80	0,60	0,4800	1,10	0,8800	41,00	32,8000	28,50	22,8000
16.	14,85-15,90	1,05	0,05	0,0525	1,10	1,1550	31,00	33,5500	20,00	21,0000
17.	15,90-16,90	1,00	0,20	0,2000	1,40	1,4000	31,00	31,0000	20,00	20,0000

Σ 1.	0,00-1,15	1,15	0,20	0,2300	2,00	2,3000	39,00	44,8500	30,00	34,5000
Σ 1-8	0,00-7,10	7,10	0,31	2,1850	0,46	3,2850	12,58	89,3500	10,72	76,1000
Σ 2-8	1,15-7,10	5,95	0,32	1,9550	0,16	0,9850	7,48	44,5000	6,99	41,6000

sum av profil (p)

Σ 9-17	7,10-16,90	9,80	0,98	9,6325	1,17	11,4850	34,17	334,8500	28,65	280,8000
--------	------------	------	------	--------	------	---------	-------	----------	-------	----------

Σ 1-17	0,00-16,90	16,90	0,83	14,0025	0,87	14,7700	25,10	424,2000	21,12	356,9000
--------	------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

~~100%~~

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>borhull 239 G, mellomort nivå - vest i malmsone I. boret mot syd</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	0,00-1,00	1,00	0,30	0,3000	1,25	1,2500	39,00	39,0000	35,00	35,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,32	0,3200	1,35	1,3500	39,00	39,0000	35,00	35,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,35	0,3500	1,80	1,8000	41,00	41,0000	35,75	35,7500
4.	3,00-3,70	0,70	0,45	0,3150	1,60	1,1200	41,30	28,9100	36,00	25,2000
5.	3,70-4,30	0,60	0,60	0,3600	0,35	0,2100	7,00	4,2000	19,00	11,4000
6.	4,30-4,80	0,50	0,40	0,2000	1,45	0,7250	38,00	19,0000	35,75	17,8750
7.	4,80-5,50	0,70	0,08	0,0560	0,10	0,0700	2,50	1,7500	2,50	1,7500
8.	5,50-5,70	0,20	0,32	0,0640	0,08	0,0160	29,00	5,8000	28,00	5,6000
9.	5,70-6,70	1,00	0,07	0,0700	0,05	0,0500	2,75	2,7500	2,50	2,5000
10.	6,70-7,45	0,75	0,25	0,1875	0,20	0,1500	3,00	2,2500	5,00	3,7500
11.	7,45-8,55	1,10	1,25	1,3750	0,10	0,1100	44,00	48,4000	38,00	41,8000
Σ 1-4	0,00-3,70	3,70	0,35	1,2850	1,49	5,5200	39,98	147,9100	35,39	130,9500
Σ 5-10	3,70-7,45	3,75	0,25	0,9375	0,33	1,2210	9,53	35,7500	11,43	42,8750

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

piggprøver på mellomort nivå-vest, i malmsone I. vestlig del, fra stoff som ligger 1,70m mot øst fram. 1578

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. gr. 0,00-1,00	1,00	2,70	2,7000	0,50	0,5000	36,00	36,0000	35,50	35,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,40	0,4000	2,20	2,2000	44,00	44,0000	37,00	37,0000
3.	2,00-3,20	1,20	0,55	0,6600	2,20	2,6400	37,75	45,3000	32,00	38,4000
Σ 1-3	0,00-3,20	3,20	1,17	3,7600	1,67	5,3400	39,16	125,3000	34,66	110,9000

piggprøver fra venstre side av tverrslag 3. på mellomort nivå-vest

4.	3,20-4,50	1,30	1,53	1,9890	1,10	1,4300	35,50	46,1500	30,60	39,6500
5.	4,50-5,60	1,10	1,30	1,4300	1,70	1,8700	30,00	33,0000	20,00	22,0000
6.	5,60-6,60	1,00	2,45	2,4500	0,70	0,7000	32,60	32,5000	26,00	26,0000

sum av profil (12)

Σ 1-6	0,00-6,60	6,60	1,46	9,6290	1,42	9,3400	35,90	236,9500	30,08	198,5500
----------	-----------	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

profil (n)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *piaggprøver på mellomort nivå-vest, i malmsonen I. i høyre side av tverrsnitt 3., ved m.p. 1577 og 1605.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordl. side</i> 0,00-1,00	1,00	0,60	0,6000	0,90	0,9000	37,00	37,0000	31,50	31,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,55	0,5500	1,45	1,4500	26,80	26,8000	24,00	24,0000
3.	2,00-3,20	1,20	0,50	0,6000	1,05	1,2600	25,00	30,0000	31,25	37,5000
4.	3,20-4,20	1,00	0,07	0,0700	0,10	0,1000	2,00	2,0000	0,82	0,8200
5.	4,20-5,10	0,90	0,07	0,0630	0,05	0,04500	1,25	1,1250	0,75	0,6750
6.	5,10-5,75	0,65	0,40	0,2600	0,15	0,0975	25,00	16,2500	20,00	13,0000
7.	5,75-6,75	1,00	0,04	0,0400	0,05	0,0500	1,25	1,2500	0,73	0,7300
8.	6,75-7,75	1,00	0,03	0,0300	0,05	0,0500	1,25	1,2500	0,72	0,7200
9.	7,75-8,95	1,20	0,05	0,0600	0,05	0,0600	1,20	1,4400	0,72	0,8640
10.	8,95-9,95	1,00	0,03	0,0300	0,04	0,0400	11,00	11,0000	8,00	8,0000
11.	9,95-10,95	1,00	0,08	0,0800	0,40	0,4000	6,00	6,0000	5,00	5,0000
12.	10,95-11,95	1,00	0,03	0,0300	0,05	0,0500	2,50	2,5000	0,72	0,7200
13.	11,95-13,25	1,30	0,03	0,0390	0,18	0,2340	1,30	1,6900	0,91	1,1830
Σ 1-3	0,00-3,20	3,20	0,55	1,7500	1,13	3,6100	27,75	88,8000	29,06	93,0000
Σ 4-13	3,20-13,25	10,05	0,07	0,7020	0,11	1,1265	4,43	44,5050	3,16	31,7120

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 199G, på mellomort-nivå-vest, malmzone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	31,35-32,40	1,05	1,35	1,4175	0,60	0,6300	33,00	34,6500	30,50	32,0250
2.	32,40-33,40	1,00	0,70	0,7000	0,95	0,9500	43,00	43,0000	37,00	37,0000
3.	33,40-34,40	1,00	0,93	0,9300	1,35	1,3500	40,50	40,5000	34,00	34,0000
4.	34,40-35,40	1,00	0,55	0,5500	1,45	1,4500	38,00	38,0000	28,00	28,0000
5.	35,40-36,40	1,00	0,50	0,5000	1,80	1,8000	45,00	45,0000	36,00	36,0000
6.	36,40-37,20	0,80	2,00	1,6000	0,75	0,6000	41,50	33,2000	35,75	28,6000
7.	37,20-37,60	0,40	2,20	0,8800	0,60	0,2400	37,00	14,8000	35,75	14,3000
8.	37,60-38,60	1,00	0,10	0,1000	0,20	0,2000	3,00	3,0000	6,00	6,0000
9.	38,60-39,60	1,00	0,07	0,0700	0,10	0,0700	2,00	2,0000	5,00	5,0000
10.	39,60-40,60	1,00	0,05	0,0500	0,05	0,0500	4,50	4,5000	6,00	6,0000
11.	40,60-41,65	1,05	0,09	0,0945	0,05	0,0525	12,00	12,6000	15,00	15,7500
12.	41,65-42,60	0,95	0,07	0,0665	0,07	0,0665	4,00	3,8000	5,00	4,7500
13.	42,60-43,05	0,45	0,15	0,0675	0,05	0,0225	3,50	1,5750	5,00	2,2500
14.	43,05-44,10	1,05	0,05	0,0525	0,05	0,525	1,00	1,0500	12,00	12,6000
15.	44,10-45,35	1,25	0,09	0,1125	0,05	0,625	1,00	1,2500	3,00	3,7500
16.	45,35-46,35	1,00	0,58	0,5800	0,45	0,4500	32,00	32,0000	38,00	38,0000
17.	46,35-47,35	1,00	0,72	0,7200	0,95	0,9500	34,00	34,0000	36,00	36,0000
18.	47,35-48,35	1,00	0,45	0,4500	2,00	2,0000	39,00	39,0000	34,00	34,0000
19.	48,35-49,65	1,30	0,40	0,5200	1,50	1,9500	37,50	48,7500	32,00	41,6000
sum av profil (m)										
Σ 1.-7.	31,35-37,60	6,25	1,05	6,5775	1,12	7,0200	39,86	249,1500	33,59	209,9250
Σ 16.-19.	45,35-49,65	4,30	0,53	2,2700	1,24	5,3500	35,76	153,7500	34,79	149,6000
Σ 8.-15.	37,60-45,35	7,75	0,08	0,6135	0,07	0,5765	3,84	29,7750	7,24	56,1000
Σ 1.-19.	31,35-49,65	18,30	0,52	9,4610	0,71	12,9465	23,64	432,6750	22,71	415,6250

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. **240G**, på mellomort nivå - vest i malmzone I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,60	0,6000	2,35	2,3500	36,00	36,0000	23,00	23,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,55	0,5500	1,40	1,4000	41,50	41,5000	39,00	39,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,63	0,6300	1,20	1,2000	42,50	42,5000	31,50	31,5000
4.	3,00-4,00	1,00	0,75	0,7500	1,70	1,7000	39,00	39,0000	29,75	29,7500
5.	4,00-5,00	1,00	0,55	0,5500	1,20	1,2000	44,00	44,0000	34,50	34,5000
6.	5,00-6,00	1,00	1,55	1,5500	0,60	0,6000	42,25	42,2500	36,00	36,0000
7.	6,00-6,70	0,70	1,55	1,0850	0,60	0,4200	43,00	30,1000	36,00	25,2000
8.	12,00-12,50	0,50	0,05	0,0250	0,05	0,0250	25,50	12,7500	22,00	11,0000
9.	16,90-17,60	0,70	0,15	0,1050	0,55	0,3850	36,00	25,2000	32,00	22,4000
10.	18,45-19,30	0,85	0,30	0,2550	1,20	1,0200	36,00	30,6000	32,00	27,2000
11.	23,70-24,05	0,35	0,05	0,0175	0,07	0,0245	37,50	13,1250	34,00	11,9000
Σ 1-7.	0,00-6,70	6,70	0,85	5,7150	1,32	8,8700	41,10	275,3500	31,34	209,9500

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver fra staffen på mellomort nivå - vest i malmzone I, som ligger 28,60m mot vest fra m.p. 1545*

sum av profil ②

Σ	borhultsprøver	12,65	0,92	11,6725	1,34	16,9400	39,50	499,6750	32,08	405,8000
---	----------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil ①

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 241G, på mellomort nivå - vest i malmsone I. (boret mot syd)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-0,30	0,30	0,10	0,0300	0,30	0,0900	2,00	0,6000	2,50	0,7500
2.	0,30-1,00	0,70	1,25	0,8750	0,90	0,6300	42,00	29,4000	34,50	24,1500
3.	1,00-1,95	0,95	0,95	0,9025	1,00	0,9500	43,50	41,3250	36,00	34,2000
4.	1,95-3,00	1,05	0,20	0,2100	0,15	0,1575	2,50	2,6250	4,00	4,2000
5.	3,00-3,45	0,45	0,08	0,0360	0,10	0,0450	40,00	18,0000	40,00	18,0000
Σ 1-5.	0,00-1,95	1,95	0,93	1,8075	0,86	1,6700	36,58	71,3250	30,31	59,1000
Σ 1-5.	0,00-3,45	3,45	0,60	2,0535	0,54	1,8725	26,65	91,9500	23,57	81,3000

profil (k)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 242 G, på mellomort nivå - vest, i malmsone I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	1,10	1,1000	1,70	1,7000	35,00	35,0000	29,00	29,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,80	0,8000	2,60	2,6000	40,00	40,0000	31,00	31,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,50	0,5000	3,25	3,2500	43,50	43,0000	36,00	36,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,50	0,5000	1,75	1,7500	39,00	39,0000	31,00	31,0000
5.	4,00-5,00	1,00	0,65	0,6500	1,85	1,8500	41,00	41,0000	32,00	32,0000
6.	5,00-6,00	1,00	0,65	0,6500	1,60	1,6000	42,00	42,0000	32,00	32,0000
7.	6,00-7,00	1,00	1,15	1,1500	1,50	1,5000	44,50	44,0000	36,00	36,0000
8.	7,00-8,00	1,00	1,24	1,2400	1,35	1,3500	43,00	43,0000	36,50	36,5000
9.	8,00-8,85	0,85	1,35	1,1475	1,30	1,1050	42,50	36,1250	36,00	30,6000
10.	19,65-21,00	1,35	0,14	0,1890	0,90	1,2150	30,50	41,1750	25,00	33,7500
Σ 1.-9.	0,00-8,85	8,85	0,87	7,7375	1,89	16,7050	41,03	36,31250	32,21	285,1000

profil (k)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver på mellomort-nivå - vest, malmsone I.
fra stoffen som ligger 29,30 m mot vest fra m.p. 1545.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00 - 1,00	1,00	1,65	1,6500	0,20	0,2000	38,00	38,0000	37,50	37,5000
2.	1,00 - 2,00	1,00	1,75	1,7500	0,80	0,8000	39,50	39,5000	35,00	35,0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	1,50	1,5000	1,00	1,0000	39,25	39,2500	34,00	34,0000
4.	3,00 - 4,00	1,00	0,85	0,8500	0,90	0,9000	40,00	40,0000	35,25	35,2500
Σ 1-4	fra nordl. side 0,00 - 4,00	4,00	1,44	5,7500	0,73	2,9000	39,19	156,7500	35,44	141,7500

sum av profil (k)

Σ	borhullsprøver piggprøver	17,15	0,99	17,0495	1,37	23,5225	37,76	647,5500	34,58	558,7250
---	------------------------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil 

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 243 G, på mellomort nivå²-vest i malmiso-
ne 1. (boret mot syd)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,65	0,6500	0,70	0,7000	45,50	45,5000	38,00	38,0000
2.	1,00-2,35	1,35	0,42	0,5670	1,90	2,5650	44,00	59,4000	41,50	56,0250
3.	2,35-3,00	0,65	1,80	1,1700	0,20	0,1300	4,50	2,9250	11,00	7,1500
4.	3,00-3,15	0,15	1,40	0,2100	0,10	0,0150	32,00	4,8000	43,00	6,4500
5.	3,15-3,90	0,75	0,30	0,2250	0,25	0,1875	3,00	2,2500	11,00	8,2500
6.	3,90-4,30	0,40	1,85	0,7400	0,80	0,3200	32,00	12,8000	40,00	16,0000
Σ 1-2.	0,00-2,35	2,35	0,52	1,2170	1,39	3,2650	44,64	104,9000	40,01	94,0250
Σ 1-6.	0,00-4,30	4,30	0,83	3,5620	0,91	3,9175	29,69	127,6750	30,67	131,8750

profil

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 244G, på mellomort nivå - vest i malmen, serie I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,47	0,4700	1,30	1,3000	46,50	46,5000	38,50	38,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,47	0,4700	1,35	1,3500	41,50	41,5000	35,00	35,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,40	0,4000	2,00	2,0000	37,00	37,0000	32,00	32,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,30	0,3000	1,60	1,6000	28,00	28,0000	24,50	24,5000
5.	4,00-5,00	1,00	0,35	0,3500	2,10	2,1000	34,50	34,5000	30,00	30,0000
6.	5,00-6,00	1,00	0,70	0,7000	0,25	0,2500	42,50	42,5000	40,00	40,0000
7.	6,00-7,00	1,00	0,60	0,6000	0,45	0,4500	44,75	44,7500	40,00	40,0000
8.	7,00-8,00	1,00	0,30	0,3000	1,00	1,0000	39,25	39,2500	28,00	28,0000
9.	8,00-9,00	1,00	0,35	0,3500	1,50	1,5000	43,00	43,0000	35,00	35,0000
10.	9,00-10,00	1,00	0,75	0,7500	1,60	1,6000	42,25	42,2500	32,00	32,0000
11.	10,00-11,00	1,00	1,50	1,5000	1,60	1,6000	43,50	43,5000	35,00	35,0000
12.	11,00-12,00	1,00	0,75	0,7500	1,30	1,3000	43,50	43,5000	34,50	34,5000
13.	12,00-13,00	1,00	0,50	0,5000	1,20	1,2000	44,50	44,5000	35,75	35,7500
14.	13,00-14,00	1,00	1,15	1,1500	1,10	1,1000	42,00	42,0000	35,75	35,7500
15.	24,70-25,70	1,00	0,10	0,1000	0,70	0,7000	41,00	41,0000	35,75	35,7500
Σ 1.-14.	0,00-14,00	14,00	0,61	8,5900	1,31	18,3500	40,91	572,7500	34,00	476,0000

profil

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på mellomort-nivå - vest, i malmsone I.
fra stoffen som ligger 1860m mot vest fra m.p. 1529

fra station som 1991 1900m over bse fra m.p. 1527										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00-1,00	1,00	0,35	0,3500	0,80	0,8000	44,50	44,5000	35,00	35,0000
2.	1,00-2,20	1,20	0,37	0,4440	0,75	0,9000	47,00	56,4000	40,00	48,0000
3.	2,20-3,40	1,20	0,25	0,3000	0,85	1,0200	45,00	54,0000	38,00	45,6000
4.	3,40-4,80	1,40	0,18	0,2520	1,00	1,4000	41,25	57,7500	36,00	50,4000
Σ	fra nordl. side 1-4. 0,00-4,80	4,80	0,28	1,3460	0,86	4,1200	43,68	209,6500	37,29	179,0000

profil (i)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver på mellomort nivå-vest, i malmsone I., tverrslag 2. nord-vest og syd for m.p. 1529.

Nord-Vest og syd for nr. 1027.										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordlig side 0,00-1,00	1,00	0,50	0,5000	1,40	1,4000	40,50	40,5000	33,50	33,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,80	0,8000	0,35	0,3500	41,25	41,2500	37,00	37,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,78	0,7800	0,70	0,7000	37,00	37,0000	34,00	34,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,15	0,1500	1,15	1,15000	35,00	35,0000	30,00	30,0000
5.	4,00-5,00	1,00	0,10	0,1000	1,40	1,4000	38,00	38,0000	32,00	32,0000
6.	5,00-6,00	1,00	0,16	0,1600	1,25	1,2500	39,50	39,5000	30,50	30,5000
7.	6,00-7,30	1,30	0,16	0,2080	0,75	0,9750	41,50	53,9500	37,00	48,1000
8.	7,30-8,30	1,00	0,10	0,1000	1,10	1,1000	36,00	36,0000	31,75	31,7500
9.	8,30-9,30	1,00	0,07	0,0700	2,00	2,0000	25,00	25,0000	20,00	20,0000
10.	9,30-10,30	1,00	0,05	0,0500	0,20	0,2000	4,00	4,0000	6,00	6,0000
11.	10,30-11,30	1,00	0,06	0,0600	1,00	1,0000	37,00	37,0000	32,50	32,5000
12.	11,30-12,30	1,00	0,06	0,0600	1,90	1,9000	37,00	37,0000	32,00	38,0000

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 206 G, på mellomort nivå²-vest, mellomort malmsoner I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,60	0,6000	0,80	0,8000	46,50	46,5000	36,00	36,0000
2.	1,00-2,00	1,00	1,15	1,15000	2,40	2,4000	41,50	41,5000	28,00	28,0000
3.	2,00-3,00	1,00	1,85	1,8500	1,40	1,4000	40,00	40,0000	27,50	27,5000
4.	3,00-4,00	1,00	0,95	0,9500	1,20	1,2000	42,00	42,0000	29,00	29,0000
5.	4,00-5,00	1,00	1,05	1,0500	1,25	1,2500	42,25	42,2500	32,50	32,5000
6.	5,00-5,80	0,80	1,60	1,2800	1,05	0,8400	39,50	31,6000	31,00	24,8000
7.	5,80-6,20	0,40	1,50	0,6000	0,70	0,2800	41,00	16,4000	32,75	13,1000
Σ 1-7.	0,00-6,20	6,20	1,21	7,4800	1,32	8,1700	41,98	260,2500	30,79	190,9000
sum av profil (2)										
Σ	borhullsprøver piggprøver	18,50	0,57	10,5180	1,17	21,5900	37,00	684,4500	30,50	564,2500



245G, på mellomort nivå - vest
i malmsoner I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,65	0,6500	0,60	0,6000	34,50	34,5000	31,00	31,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,85	0,8500	1,25	1,2500	37,50	37,5000	31,25	31,2500
3.	2,00-3,00	1,00	1,15	1,1500	2,00	2,0000	40,00	40,0000	34,00	34,0000
4.	3,00-4,00	1,00	1,15	1,1500	1,75	1,7500	41,50	41,5000	34,00	34,0000
5.	4,00-5,00	1,00	1,30	1,3000	2,40	2,4000	42,00	42,0000	40,00	40,0000
Σ 1.-5.	0,00-5,00	5,00	1,02	5,1000	1,60	8,0000	39,10	195,5000	34,05	170,2500

profil

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 246 G, på mellomort nivå - vest i malmsone I. (boret mot syd)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	1,10	1,1000	0,45	0,4500	37,50	37,5000	33,00	33,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,30	0,3000	0,55	0,5500	41,50	41,5000	35,00	35,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,45	0,4500	1,10	1,1000	43,00	43,0000	36,00	36,0000
4.	3,00-4,10	1,10	0,88	0,9680	1,30	1,4300	48,00	52,8000	40,00	44,0000
Σ 1-4.	0,00-4,10	4,10	0,69	2,8180	0,86	3,5300	42,63	174,8000	36,10	148,0000

sum av profil (h)

Σ borhullsprøver piggprøver	12,70	0,69	2,8180	1,23	15,5600	40,09	509,2000	34,48	437,9000
--------------------------------	-------	------	--------	------	---------	-------	----------	-------	----------

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 247G, på mellomort midt-vest i mahlsone I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	0,80	0,8000	1,80	1,8000	39,00	39,0000	33,50	33,5000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,80	0,8000	1,75	1,7500	38,25	38,2500	33,00	33,0000
3.	2,00 - 3,20	1,20	1,30	1,5600	2,10	2,5200	42,50	51,0000	36,00	43,2000
Σ 1-3.	0,00 - 3,20	3,20	0,99	3,1600	1,90	6,0700	40,08	128,2500	34,28	109,7000

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00-1,00	1,00	0,20	0,2000	1,40	1,4000	35,00	35,0000	31,00	31,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,22	0,2200	0,90	0,9000	40,50	40,5000	36,00	36,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,50	0,5000	0,90	0,9000	44,00	44,0000	39,50	39,5000
4.	3,00-4,10	1,10	0,68	0,7480	0,90	0,9900	41,00	45,1000	39,00	42,9000
Σ	fra nordl. side 1-4. 0,00-4,10	4,10	0,41	1,6680	1,02	4,1900	40,10	164,4000	36,44	149,4000

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 248 G, på mellomort nivå - vest, i malmsone I.
(boret mot syd)

profil *f*

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 170 G, på mellomort nivå - vest, sone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	5,90-7,00	1,10	0,38	0,4180	1,50	1,6500	47,50	52,2500	39,00	42,9000
2.	7,00-8,05	1,05	0,22	0,2310	2,10	2,2050	48,00	50,4000	39,50	41,4750
3.	8,05-8,65	0,60	0,20	0,1200	2,00	1,2000	10,00	6,0000	14,00	8,4000
4.	8,65-9,65	1,00	0,30	0,3000	1,10	1,1000	39,00	39,0000	34,00	34,0000
5.	9,65-10,65	1,00	0,10	0,1000	1,70	1,7000	41,00	41,0000	35,00	35,0000
6.	10,65-11,65	1,00	0,45	0,4500	0,75	0,7500	42,00	42,0000	36,50	36,5000
7.	11,65-12,85	1,20	0,35	0,4200	1,80	2,1600	44,00	52,8000	36,50	43,8000
8.	12,85-13,05	0,20	0,07	0,0140	0,40	0,0800	3,50	0,7000	4,00	0,8000
9.	13,05-13,45	0,40	0,30	0,1200	1,30	0,5200	40,00	16,0000	32,00	12,8000
Σ 1-9.	5,90-13,45	7,55	0,29	2,1730	1,51	11,3650	39,76	300,1500	33,86	255,6750
Σ 1-2.	5,90-8,05	2,15	0,30	0,6490	1,79	3,8550	47,74	102,6500	39,24	84,3750
Σ 4-7.	8,65-12,85	4,20	0,30	1,2700	1,40	5,7100	41,62	174,8000	35,55	149,3000

profil ②

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 249G, på mellomort nivå - vest
i malmsone I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,35	1,35	0,10	0,1350	0,30	0,4050	11,25	15,1875	12,00	16,2000
2.	1,35 - 2,40	1,05	0,30	0,3150	1,75	1,8375	43,25	45,4125	36,00	37,8000
3.	2,40 - 3,40	1,00	0,25	0,2500	3,75	3,7500	43,00	43,0000	33,50	33,5000
4.	3,40 - 4,50	1,10	0,75	0,8250	2,30	2,5300	42,00	46,2000	36,25	39,8750
5.	4,50 - 5,60	1,10	0,07	0,0770	0,10	0,1100	1,00	1,1000	3,00	3,3000
6.	5,60 - 6,60	1,00	0,30	0,3000	1,30	1,3000	34,50	34,5000	23,00	23,0000
7.	6,60 - 7,10	0,50	0,15	0,0750	0,40	0,2000	7,50	3,7500	10,00	5,0000
8.	7,10 - 7,70	0,60	0,30	0,1800	2,10	1,2600	35,00	21,0000	27,00	16,2000
Σ 1-4.	0,00 - 4,50	4,50	0,34	1,5250	1,89	8,5225	33,29	149,8000	28,31	127,3750
Σ 1-8.	0,00 - 7,70	7,70	0,28	2,1570	1,48	11,3925	27,29	210,1500	22,71	174,8750

profil (e)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver på mellommort nivå - Vest, malmsone T. østlig stoff, som ligger 23,70m mot øst fra m.p. 1568.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. si. 0,00 - 0,50	0,50	0,07	0,0350	0,10	0,0500	1,75	0,8750	5,00	2,5000
2.	0,50 - 1,50	1,00	0,20	0,2000	0,65	0,6500	37,00	37,0000	36,00	36,0000
3.	1,50 - 2,50	1,00	0,15	0,1500	0,80	0,8000	24,00	24,0000	29,50	29,5000
4.	2,50 - 3,80	1,30	0,28	0,3640	2,20	2,8600	48,00	62,4000	44,00	57,2000
Σ 1-4.	0,00 - 3,80	3,80	0,19	0,7140	1,13	4,3100	32,47	123,4000	32,29	122,7000

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 250G, på mellomorb nivå - vest i malmsone I. (boret mot syd)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 0,70	0,70	0,22	0,1540	0,80	0,5600	48,50	33,9500	40,50	28,3500
2.	0,70 - 1,50	0,80	0,27	0,2160	1,30	1,0400	46,00	36,8000	37,00	29,6000
Σ 1-2.	0,00 - 1,50	1,50	0,25	0,3700	1,07	1,6000	47,17	70,7500	38,63	57,9500

sum av profil (e)

Σ	borhulprøver piggprøver	9,80	0,27	2,6090	1,47	14,4325	35,10	343,9500	31,43	308,0250
---	----------------------------	------	------	--------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil (d)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *diamantborhull nr. 144G, på mellomort - vest, zone I.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	29,40-30,40	1,00	0,35	0,3500	1,35	1,3500	42,50	42,5000	34,00	34,0000
2.	30,40-31,40	1,00	0,25	0,2500	1,65	1,6500	43,50	43,5000	36,00	36,0000
3.	31,40-32,40	1,00	0,10	0,1000	0,85	0,8500	44,00	44,0000	37,50	37,5000
4.	32,40-33,40	1,00	0,17	0,1700	1,70	1,7000	44,50	44,5000	38,25	38,2500
5.	33,40-34,40	1,00	0,50	0,5000	1,30	1,3000	47,00	47,0000	41,00	41,0000
6.	34,40-35,40	1,00	0,25	0,2500	1,30	1,3000	46,00	46,0000	40,00	40,0000
7.	35,40-36,40	1,00	0,35	0,3500	1,70	1,7000	46,00	46,0000	39,75	39,7500
8.	36,40-37,40	1,00	0,25	0,2500	2,50	2,5000	44,25	44,2500	37,50	37,5000
9.	37,40-38,40	1,00	0,85	0,8500	1,95	1,9500	46,00	46,0000	40,00	40,0000
10.	38,40-39,40	1,00	0,60	0,6000	2,20	2,2000	45,00	45,0000	40,00	40,0000
11.	39,40-40,40	1,00	0,40	0,4000	2,05	2,0500	46,50	46,5000	40,00	40,0000
12.	40,40-41,40	1,00	0,80	0,8000	1,05	1,0500	45,75	45,7500	40,75	40,7500
13.	41,40-41,95	0,55	0,40	0,2200	1,80	0,9900	44,00	24,2000	36,00	19,8000
14.	41,95-42,60	0,65	0,05	0,0325	0,20	0,1300	3,00	1,3000	4,00	2,6000
15.	42,60-43,15	0,55	0,30	0,1650	1,30	0,7150	41,50	22,8250	34,00	18,7000
Σ 1-15	29,40-43,15	13,75	0,38	5,2875	1,56	21,4350	42,86	589,3250	36,79	505,8500

sann met. (12,95)

(c)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>diamant borthull nr. 133 G, mellomort-vest, malmsonen I. som ligger 14,40 m mot vest fra m.p. 1393</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	0,00 - 1,00	1,00	0,65	0,6500	0,60	0,6000	41,75	41,7500	34,00	34,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,40	0,4000	1,00	1,0000	44,00	44,0000	36,50	36,5000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,30	0,3000	5,25	5,2500	39,00	39,0000	30,00	30,0000
4.	3,00 - 4,35	1,35	0,35	0,4725	0,55	0,7425	44,00	59,4000	38,50	51,9750
5.	4,35 - 5,50	1,15	0,05	0,0575	0,15	0,1725	1,00	1,1500	3,00	3,4500
6.	5,50 - 6,50	1,00	0,60	0,6000	1,40	1,4000	43,75	43,7500	39,00	39,0000
7.	6,50 - 7,50	1,00	0,34	0,3400	2,85	2,8500	45,50	45,5000	39,00	39,0000
8.	7,50 - 8,50	1,00	0,35	0,3500	1,50	1,5000	48,50	48,5000	42,10	42,1000
9.	8,50 - 9,50	1,00	0,25	0,2500	3,30	3,3000	46,25	46,2500	41,50	41,5000
10.	9,50 - 10,50	1,00	0,45	0,4500	3,00	3,0000	43,50	43,5000	38,50	38,5000
11.	10,50 - 11,50	1,00	0,65	0,6500	1,10	1,1000	42,50	42,5000	38,70	38,7000
12.	11,50 - 12,50	1,00	0,45	0,4500	0,85	0,8500	45,00	45,0000	41,25	41,2500
13.	12,50 - 13,25	0,75	0,50	0,3750	0,60	0,4500	46,00	34,5000	38,50	28,8750
14.	13,25 - 13,60	0,35	0,05	0,0175	0,25	0,0875	0,50	17,5000	2,00	0,7000
15.	13,60 - 14,65	1,05	0,15	0,1575	1,40	1,4700	44,00	46,2000	38,00	39,9000
16.	14,65 - 15,35	0,70	0,30	0,2100	0,20	0,1400	21,00	14,7000	18,00	12,6000
Σ 1-4	0,00 - 4,35	4,35	0,42	1,8225	1,75	7,5925	42,33	184,1500	35,05	158,4750
Σ 6-13	5,50 - 13,25	7,75	0,45	3,4650	1,86	14,4500	45,10	349,5000	39,86	308,9250
Σ 1-16	0,00 - 15,35	15,35	0,37	5,7300	1,56	23,9125	39,95	613,2000	33,75	518,0500

profil (b)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>diamantborhull nr. 1326, på mellomorb-vest, malmsone I. borhull's begynnelsen ligger 2,60m mot nord-vest fra m.p. 1393</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
5.	4,30 - 5,50	1,20	0,45	0,5400	0,35	0,4200	38,50	46,2000	31,00	37,2000
6.	5,50 - 6,50	1,00	0,50	0,5000	1,00	1,0000	43,50	43,5000	36,00	36,0000
7.	6,50 - 7,50	1,00	1,30	1,3000	0,60	0,6000	43,00	43,0000	38,50	38,5000
8.	7,50 - 8,50	1,00	1,22	1,2200	0,90	0,9000	41,00	41,0000	36,50	36,5000
9.	8,50 - 9,50	1,00	0,85	0,8500	0,65	0,6500	42,50	42,5000	38,25	38,2500
10.	9,50 - 10,50	1,00	0,97	0,9700	0,70	0,7000	41,00	41,0000	35,50	35,5000
11.	10,50 - 11,50	1,00	1,05	1,0500	1,30	1,3000	42,50	42,5000	37,00	37,0000
12.	11,50 - 12,50	1,00	0,30	0,3000	2,35	2,3500	45,50	45,5000	38,50	38,5000
13.	12,50 - 13,50	1,00	0,28	0,2800	2,80	2,8000	47,00	47,0000	39,50	39,5000
14.	13,50 - 14,50	1,00	0,15	0,1500	3,00	3,0000	48,00	48,0000	41,00	41,0000
15.	14,50 - 15,50	1,00	0,55	0,5500	1,10	1,1000	48,00	48,0000	42,40	42,4000
16.	15,50 - 17,00	1,50	0,50	0,7500	2,05	3,0750	45,50	68,2500	39,25	58,8750
Σ 5-16	4,30 - 17,00	12,70	0,67	8,4600	1,41	17,8950	43,81	556,4500	37,73	479,2250

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *diamant borthull nr. 13/6, på mellomørt - vest malmsoner I, som ligger 3,00m mot nordøst fra m.p. 1392.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	6,65-7,70	1,05	0,25	0,2625	0,20	0,2100	41,00	43,0500	38,00	39,9000
2.	7,70-9,00	1,30	0,75	0,9750	0,60	0,7800	46,50	60,4500	43,00	55,9000
3.	9,00-9,95	0,95	2,40	2,2800	0,25	0,2375	40,00	38,0000	39,00	37,0500
Σ 1-3.	6,65-9,95	3,30	1,07	3,5175	0,37	1,2275	42,88	141,5000	40,26	132,8500

1. Report over
niva I. - vest

Areal av malm på nivå : *I. borort over nivå I. - vest i malmsone I., borort 23.*
tekniske malmreserver i kategori A. (Y+108,80 til Y+113,50)

NR.	BORORT	GJ.SNITT. MEKTIGHET	LENGDE AV MALMSONE	AREAL AV MALMSONE	KOBBER GEHAL.	—	SINK GEHAL.	—	SVOVEL GEHAL.	—
a	b	m c	m d	m ² e	% f	m % e·f	% g	m % e·g	% h	m % e·h
1.	23.	13,04	53,20	693,8601	1,11	770,0215	0,92	636,8476	37,00	25673,1048
÷	pilar A.	11,80	3,60	42,4800	0,66	28,0368	1,39	59,0472	33,79	1435,3992
mellom koordinater Y+108,40 og Y+113,50										
≤	23.	13,13	49,60	651,3801	1,14	741,9847	0,89	577,8004	37,21	24237,708

Areal av malm på nivå : *I. borort over nivå I. - vest ; malmsoner I., borort 18.*
tekniske malmreserver i kategori A. (Y+1009,80 til Y+1081,80)

NR.	BORORT	GJ.SNITT. MEKTIGHET	LENGDE AV MALMSONE	AREAL AV MALMSONE	KOBBER GEHAL.	—	SINK GEHAL.	—	SVOVEL GEHAL.	—
a	b	m c	m d	m ² e	% f	m % e·f	% g	m % e·g	% h	m % e·h
1.	18.	7,25	59,80	433,7102	0,92	397,7014	1,39	601,6008	36,64	1589,9624
÷	pilar 4.	11,80	9,10	107,3800	0,75	80,5350	1,34	143,8892	34,87	3744,3406
÷	pilar 3.	1,95	12,00	23,4000	1,31	30,6540	1,39	32,5260	36,92	863,9280
÷	del av 13.	2,10	3,75	7,8750	1,33	10,4738	1,26	9,9225	36,27	285,6263
mellom koordinater Y+1025,30 og Y+1073,00										
≤	18	8,44	34,95	295,0552	0,94	276,0386	1,41	415,2631	37,27	10998,0678

Areal av malm på nivå : *I. borort over nivå I. - vest i malmsone I., borort nr. 13.*
tekniske malmreserver i kategori A. (Y+951,80 +1 Y+1009,80)


NR.	BORORT	GJ.SNITT. MEKTIGHET	LENGDE AV MALMSONE	AREAL AV MALMSONE	KOBBER GEHAL.	—	SINK GEHAL.	—	SVOVEL GEHAL.	—
a	b	m c	m d	m ² e	% f	m % e.f	% g	m % e.g	% h	m % e.h
1.	13.	13,66	59,10	807,4726	0,79	638,3554	1,26	1014,3845	39,66	32024,4591
+	del av 13.	2,10	3,75	7,8750	1,33	10,4738	1,26	9,9225	36,27	285,6263
÷	pilar 2.	19,95	12,60	251,3700	0,77	193,5549	1,40	361,9180	39,73	9986,9301
÷	del av 8.	19,80	2,40	47,5200	0,72	34,2144	1,61	76,5072	39,46	1875,1392
mellom koordinater Y+ 966,70 og Y+ 1013,50										
Σ	13.	10,79	47,85	516,4576	0,82	421,0599	1,15	595,8618	39,59	20448,0161


Areal av malm på nivå : *I. borort over nivå I. - vest i malmsone I., borort nr. 3.*
tekniske malmreserver i kategori A. (Y+824,30 til Y+894,50)

NR.	BORORT	GJ. SNITT. MEKTIGHET	LENGDE AV MALMSONE	AREAL AV MALMSONE	KOBBER GEHAL.		SINK GEHAL.		SVOVEL GEHAL.	
a	b	m c	m d	m ² e	% f	m % e.f	% g	m % e.g	% h	m % e.h
1.	3.	6,90	75,10	518,1275	0,63	327,1206	1,51	782,8749	43,78	22664,2507
÷	del av pijar	10,75	3,80	40,8500	0,43	17,5655	0,93	37,9905	37,68	1539,2280
mellom koordinater : Y+ 824,30 og Y+ 894,50										
≤	3.	6,69	71,30	477,2775	0,65	309,5551	1,56	744,8844	44,30	21145,0227

Areal av malm på nivå : I. berørt over nivå I. - vest i malmsonen I.
geologisk - tekniske malmreserver i kategori A.

[illegible]





Geologi & borkund kartlagt 2/18-73 ved M. Mørk

**BORORT SONE I,
OVER ETG. I**

Folldal Verk A/S
Folldal

Målestokk Tegn 1:250 Kfr. G.Kj. 17/8-71

Avd./Gr. Erstatning for: TG-3303-1

Erstattet av:

BEREGNING AV AREAL AV MALM PÅ NIVÅ

FOLLDAL VERK A/S, TVEHREJLET GRUVE

PÅ NIVÅ: I. berørt over nivå I.-vest i malmsone I. (nord) for tekniske malmsreserver, kategori A MELLOM KOORDINATER: Y=+824,30 , Y'=+1135,00

symbol	PROFIL AV PRO- HULL OG ORTER PÅ NIVÅ HVOR VAR TAT PRØVER	HORIZONTAL MEKTIGHET AV MALM	LENGDE ME- LLOM PRO- FILER	ARITMET. MEKTIGH. AV MALM	MALM AREAL	GJENNOMSITT AV KJEMISKE ANALYSER PÅ NIVÅ											
						A		B		Cu%	%m	Zn%	%m	S%	%m	Fe %	%m
						Aa + Ba		B									
						$\frac{c + Aa}{2}$	$\frac{b}{2}$	$\frac{c + Ba}{2}$	$\frac{b}{2}$								
		m	m	m	m²					e	d.e	f	d.f	g	d.g	h	d.h
		a	b	c	d												
A	profil 1 Y+824,30	1,10			11,1919					0,82	9,1774	1,73	19,3620	42,08	470,9552	37,58	420,5916
B	profil 1 Y+836,60	3,75	12,70	2,425	19,6056					1,25	24,5070	0,84	16,4687	41,76	818,7299	37,67	738,5480
A	profil 2 Y+836,60	3,75			18,6875					1,25	23,3594	0,84	15,6975	41,76	780,3900	37,67	703,9581
B	profil 2 Y+846,60	3,70	10,00	3,725	18,5625					0,77	14,2931	1,64	30,4425	43,50	807,4688	38,12	703,6025
A	profil 3 Y+846,60	3,70			17,0100					0,77	13,0977	1,64	27,8964	43,50	739,9350	38,12	648,4212
B	profil 3 Y+854,40	5,70	8,10	4,700	21,0600					0,75	15,7950	1,78	37,4868	44,78	943,0668	38,46	809,9676
A	profil 4 Y+854,40	5,70			31,9950					0,75	23,9963	1,78	56,9511	44,78	1432,7361	38,46	1230,5277
B	profil 4 Y+863,20	6,60	10,80	6,150	34,4250					0,67	23,0648	1,81	62,3093	45,44	1564,2720	36,72	1264,0860
A	profil 5 Y+863,20	6,60			60,0225					0,67	40,2151	1,81	108,6407	45,44	2727,4224	36,72	2204,0262
B	profil 5 Y+880,00	12,00	15,10	9,300	80,4075					0,52	41,8119	1,69	135,8887	46,45	3734,9284	37,23	2993,5712
A	profil 6 Y+880,00	12,00			106,4900					0,52	55,3748	1,69	179,9681	46,45	4946,4605	37,23	3964,6227
B	profil 6 Y+898,30	10,30	18,40	11,150	98,6700					0,43	42,4281	0,93	91,7631	37,68	3717,8856	32,24	3181,1208
A	profil 7 Y+898,30	10,30			56,3088					0,43	24,2128	0,93	52,3672	37,68	2121,7156	32,24	1815,3957
B	profil 7 Y+907,80	11,20	10,70	10,750	58,7163					0,43	25,2480	1,13	66,3494	41,45	2433,7906	33,23	1951,1426
A	profil 8 Y+907,80	11,20			61,6200					0,43	26,4766	1,13	69,6306	41,45	2554,1490	33,23	2047,6326
B	profil 8 Y+920,30	13,80	10,40	12,500	68,3800					0,44	30,0872	1,24	84,7912	40,92	2798,1096	33,96	2322,1848
A	profil 9 Y+920,30	13,80			110,5200					0,44	48,6288	1,24	137,0448	40,92	4522,4784	33,96	3753,2592
B	profil 9 Y+933,00	20,00	14,40	16,900	158,7600					0,59	93,6884	1,13	179,3988	41,83	6640,9308	35,40	5620,1040
A	profil 10 Y+933,00	20,00			192,5175					0,59	113,5853	1,13	217,5448	41,83	8053,0070	35,40	6815,1195
B	profil 10 Y+961,80	19,80	19,30	19,900	191,5325					0,72	137,978	1,61	308,3995	39,46	7558,6617	30,14	5756,7400
A	profil 11 Y+961,80	19,80			182,8500					0,72	131,6320	1,61	294,3885	39,46	715,2610	30,14	5511,0990
B	profil 11 Y+970,20	20,10	18,40	19,950	184,2300					0,81	149,2263	1,19	219,2337	40,00	369,2000	33,30	6134,8590
A	profil 12 Y+970,20	20,10			126,2669					0,81	102,2762	1,19	150,2576	40,00	350,6760	33,30	4204,6878
B	profil 12 Y+983,30	15,65	13,30	17,875	111,4706					0,86	95,8647	1,15	128,1912	40,64	530,1652	32,52	3625,0239
A	profil 13 Y+983,30	15,65			79,2813					0,86	62,1819	1,15	91,1735	40,64	321,9920	32,52	2578,2279
B	profil 13 Y+994,60	6,80	11,80	11,225	53,1738					0,58	30,8408	1,01	53,7055	37,94	217,4140	33,19	1764,8384
A	profil 14 Y+994,60	6,80			44,0700					0,58	25,5606	1,01	44,5107	37,94	157,0158	33,19	1462,6833
B	profil 14 Y+1009,80	4,20	15,60	4,500	26,1300					1,33	34,7529	1,26	32,9238	36,27	47,7351	28,91	755,4183
A	profil 15 Y+1009,80	4,20			18,4500					1,33	24,5385	1,26	23,2470	36,27	69,1815	28,91	533,3895
B	profil 15 Y+1027,30	1,60	18,00	1,900	15,7500					1,29	20,3175	1,56	24,5700	37,69	893,6175	28,00	441,0000
A	profil 16 Y+1027,30	1,60			12,6850					1,29	16,3637	1,56	19,7886	37,69	478,0977	28,00	355,1800
B	profil 16 Y+1039,10	3,80	11,80	2,700	19,1750					1,13	21,6678	1,44	27,6120	37,97	428,0748	33,47	641,7873
A	profil 17 Y+1039,10	3,80			27,3875					1,13	30,9479	1,44	39,4380	37,97	1039,9034	33,47	916,6596
B	profil 17 Y+1053,00	4,25	14,00	4,025	28,9625					1,30	37,6513	1,34	38,8098	39,40	1141,1225	32,89	952,5766
A	profil 18 Y+1053,00	4,25			17,5500					1,30	22,8150	1,34	23,5170	39,40	691,4700	32,89	577,2195
B	profil 18 Y+1059,40	8,85	6,50	6,550	25,0250					0,71	17,7678	1,53	38,2883	38,34	959,4585	28,69	717,9673
A	profil 19 Y+1059,40	8,85			46,1938					0,71	32,7976	1,53	70,6765	38,34	1771,0703	28,69	1325,3101
B	profil 19 Y+1069,00	12,35	9,50	10,600	54,5063					0,85	46,3304	1,29	70,3131	35,99	161,6817	30,69	1672,7983
A	profil 20 Y+1069,00	12,35			82,1438					0,85	69,8222	1,29	105,9655	35,99	2456,3554	30,69	2520,9932
B	profil 20 Y+1081,80	13,50	13,00	12,925	85,8813					0,66	56,6817	1,39	119,3750	33,77	2901,9291	25,72	2208,8670
A	profil 21 Y+1081,80	13,50			101,8306					0,66	67,2082	1,39	141,5445	33,77	340,8560	25,72	261,90830
B	profil 21 Y+1096,20	13,45	15,10	13,475	101,6419					1,41	143,3151	1,09	110,7897	33,75	330,4141	29,46	2994,3704
A	profil 22 Y+1096,20	13,45			99,9994					1,41	140,9992	1,09	108,9993	33,75	374,9798	29,46	2945,9823
B	profil 22 Y+1110,20	19,80	13,30	16,625	121,1131					0,71	85,9903	1,12	135,6467	37,19	404,1962	29,44	3565,5897
A	profil 23 Y+1110,20	19,80			99,5500					0,71	70,6805	1,12	111,4960	37,19	302,2645	29,44	2930,7520
B	profil 23 Y+1121,20	13,00	11,00	16,400	80,8500					1,57	126,9345	0,17	13,7445	43,18	3'91,1030	39,97	3231,5745
A	profil 24 Y+1121,20	13,00			54,0750					1,57	84,8978	0,17	9,1928	43,18	2'34,9835	39,97	2161,3778
B	profil 24 Y+1131,50	3,00	10,30	8,000	28,3250					1,47	41,6378	0,16	4,5320	41,75	1'22,5688	36,00	1019,7000
A	profil 25 Y+1131,50	3,00			4,2438					1,47	6,2384	0,16	0,6790	41,75	1'77,1787	36,00	152,7768
B	profil 25 Y+1135,00	0,70	3,50	1,850	2,2313					0,95	2,1197	0,10	0,2231	15,50	3,5852	10,00	22,3130
A																	
B																	
A																	
B													</				

berørt 3.

berørt 8.

berørt 13.

berørt 18.

berørt 23.

AREAL

profil ①

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piaggprøver på I. horont over nivå I.-vest, malmsone I.
fra stoff som ligger m mot vest fra m.p. 1458

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	0,00-1,50	1,50	1,50	2,2500	0,15	0,2250	46,50	69,7500	39,00	58,5000
2.	1,50-3,00	1,50	1,43	2,1450	0,17	0,2550	35,00	52,5000	33,00	49,5000
Σ	0,00-3,00	3,00	1,47	4,3950	0,16	0,4800	41,75	122,2500	36,00	108,0000

Sum av profil ①

Σ profil ①	3,00	1,47	4,3950	0,16	0,4800	41,75	122,2500	36,00	108,0000
------------	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

profil **Z**

piggprøver på 1. borart over etg. I - vest, i malmsone J.
i profil (stutt) som ligger 2,50m mot dst fra m.p. 1458.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. gren. 0,00-1,00	1,00	0,70	0,7000	0,10	0,1000	44,00	44,0000	39,50	39,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,85	0,8500	0,13	0,1300	45,00	45,0000	40,00	40,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,50	0,5000	0,13	0,1300	44,25	44,2500	39,50	39,5000
4.	3,00-4,00	1,00	0,85	0,8500	0,14	0,1400	46,00	46,0000	41,00	41,0000
5.	4,00-5,00	1,00	1,15	1,1500	0,20	0,2000	44,50	44,5000	39,50	39,5000
6.	5,00-6,00	1,00	1,05	1,0500	0,13	0,1300	48,00	48,0000	43,00	43,0000
7.	6,00-7,00	1,00	0,80	0,8000	0,08	0,0800	47,75	47,7500	42,75	42,7500
8.	7,00-8,00	1,00	0,90	0,9000	0,08	0,0800	48,25	48,2500	43,50	43,5000
9.	8,00-9,20	1,20	1,75	2,1000	0,16	0,1920	45,25	54,3000	42,75	51,3000
10.	9,20-10,20	1,00	2,45	2,4500	0,20	0,2000	37,50	37,5000	39,50	39,5000
11.	10,20-11,20	1,00	1,95	1,9500	0,14	0,1400	42,00	42,0000	41,00	41,0000
12.	11,20-12,20	1,00	3,10	3,1000	0,28	0,2800	34,00	34,0000	38,00	38,0000
13.	12,20-13,40	1,20	2,00	2,4000	0,18	0,2160	33,00	39,6000	37,00	44,4000
Σ fra nordl. gr. 1-13, 0,00-13,40										
	13,40		1,40	18,8000	0,15	2,0180	42,92	575,1500	40,52	542,9500

profil (Z)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piaggprøver, I. borart over etg. I.-vest, malmsone I., fra
skuffen som ligger 34,20m mot vest fra m.p. 1436.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00-1,00	1,00	1,95	1,9500	0,20	0,2000	44,50	44,5000	40,00	40,0000
2.	1,00-2,00	1,00	2,70	2,7000	0,30	0,3000	42,00	42,0000	39,00	39,0000
3.	2,00-3,00	1,00	1,95	1,9500	0,15	0,1500	41,00	41,0000	39,00	39,0000
4	3,00-3,70	0,70	2,10	1,4700	0,20	0,1400	42,50	42,5000	40,00	28,0000
Σ	fra nordl. side 1-4. 0,00-3,70	3,70	2,18	8,0700	0,21	0,7900	45,95	170,0000	39,46	146,0000

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. **207G**, på l. borert over nivå I.-vest i malmsone I. (mot syd)

$\leq$	profil ② sann mektigh.	18,20 13,00	1,57	28,6300	0,17	3,0280	43,18	785,8500	39,97	727,4500
--------	---------------------------	----------------	------	---------	------	--------	-------	----------	-------	----------

profil 

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 208 G, på 1. korant over nivå I-vest, i malms. I (mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,60	0,6000	0,90	0,9000	34,50	34,5000	24,00	24,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,60	0,6000	1,80	1,8000	35,00	35,0000	24,00	24,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,80	0,8000	1,40	1,4000	44,00	44,0000	33,00	33,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,40	0,4000	2,30	2,3000	45,00	45,0000	35,00	35,0000
5.	4,00-5,00	1,00	0,40	0,4000	3,00	3,0000	41,00	41,0000	30,00	30,0000
6.	5,00-6,00	1,00	0,55	0,5500	1,60	1,6000	35,50	35,5000	27,00	27,0000
7.	6,00-7,00	1,00	0,50	0,5000	1,60	1,6000	34,50	34,5000	27,00	27,0000
8.	7,00-8,00	1,00	0,48	0,4800	1,00	1,0000	35,50	35,5000	24,00	24,0000
9.	8,00-9,00	1,00	0,55	0,5500	1,30	1,3000	37,50	37,5000	26,00	26,0000
10.	9,00-10,00	1,00	1,20	1,2000	0,50	0,5000	31,50	31,5000	27,00	27,0000
11.	10,00-10,50	0,50	0,70	0,3500	0,15	0,0750	36,50	18,2500	30,00	15,0000
Σ 1.-11.	0,00-10,50	10,50	0,61	6,4300	1,38	14,4750	37,36	392,2500	27,81	292,0000

Y

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 209G, på I. borort over midt I.-vest i malmsone I. (mot syd)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,60	0,6000	0,30	0,3000	39,00	39,0000	31,50	31,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,70	0,7000	0,90	0,9000	37,00	37,0000	28,00	28,0000
3.	2,00-3,00	1,00	1,25	1,2500	0,30	0,3000	36,50	36,5000	35,00	35,0000
4.	3,00-4,00	1,00	1,45	1,4500	0,15	0,1500	35,00	35,0000	34,00	34,0000
5.	4,00-4,60	0,60	1,15	0,6900	0,10	0,0600	40,50	24,3000	39,00	23,4000
6.	4,60-5,30	0,70	0,25	0,1750	0,80	0,5600	32,00	22,4000	31,50	22,0500
Σ 1-6	0,00-5,30	5,30	0,92	4,8650	0,43	2,2700	36,64	194,2000	32,82	173,9500

Sum av profil Y

Σ profil Y sann mektigh.	19,80	0,71	13,9650	1,12	24,0950	37,19	736,4500	29,44	582,9500
-----------------------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil (X)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 210G, på 1. borort over nivå I.-vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	4,05	4,0500	0,30	0,3000	29,00	29,0000	31,00	31,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,89	0,8900	1,20	1,2000	40,50	40,5000	32,00	32,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,40	0,4000	1,70	1,7000	39,50	39,5000	31,00	31,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,20	0,2000	2,00	2,0000	38,00	38,0000	27,00	27,0000
5.	4,00-5,00	1,00	0,50	0,5000	1,60	1,6000	35,00	35,0000	24,00	24,0000
6.	5,00-5,95	0,95	0,48	0,4560	1,50	1,4250	36,00	34,2000	24,00	22,8000
7.	5,95-6,50	0,55	0,07	0,0385	0,20	0,1100	2,50	1,3750	5,00	2,7500
8.	6,50-6,75	0,25	0,70	0,1750	1,10	0,2750	33,70	8,4250	24,00	6,0000
Σ 1.-8.	0,00-6,75	6,75	0,99	6,7095	1,28	8,6100	33,48	226,0000	26,16	176,5500
Σ 1.-6.	0,00-5,95	5,95	1,09	6,4960	1,38	8,2250	36,34	216,2000	28,20	167,8000
9.	17,50-17,80	0,30	0,50	0,1500	1,00	0,3000	34,50	10,3500	28,50	8,5500
10.	21,40-22,40	1,00	0,08	0,0800	1,05	1,0500	31,00	31,0000	28,00	28,0000

profil (X)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: piggprøver på 1. berørt over d.g. I.-vest, malmsone I., fra stoffen som ligger 15,60m mot vest fra m.p. 1435.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00 - 0,15	1,15	0,90	1,0350	2,10	2,4150	42,00	48,3000	33,00	37,9500
2.	1,15 - 2,35	1,20	1,75	2,1000	0,95	1,1400	42,75	51,3000	36,00	43,2000
3.	2,35 - 3,35	1,00	2,45	2,4500	0,20	0,2000	28,50	28,5000	39,00	29,0000
4.	3,35 - 4,15	0,80	0,80	0,6400	0,10	0,0800	25,00	20,0000	45,00	36,0000
Σ fra nordl. side 1-4. 0,00 - 4,15										
		4,15	1,50	6,2250	0,92	3,8350	35,69	148,1000	37,63	156,1500

Sum av profil (X)

Σ profil (X) sann mektig.	13,45	1,41	18,9910	1,09	14,6150	33,75	454,0000	29,46	396,2500
------------------------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 211G, på 1. borert over nivå I. - vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,10	1,10	0,55	0,6050	1,60	1,7600	41,75	45,9250	30,00	33,0000
2.	1,10-2,35	1,25	4,00	5,0000	0,30	0,3750	23,80	29,7500	22,00	27,5000
3.	2,35-3,05	0,70	0,20	0,1400	0,15	0,1050	6,00	4,2000	4,00	2,8000
4.	3,05-3,35	0,30	1,75	0,5250	1,05	0,3150	32,75	9,8250	30,00	9,0000
Σ 1-4	0,00-2,35	2,35	2,39	5,6050	0,91	2,1350	32,20	75,6750	25,74	60,5000
Σ 1-4	0,00-3,35	3,35	1,87	6,2700	0,76	2,5550	26,78	89,7000	21,58	72,3000
5.	3,35-4,25	0,90	0,35	0,3150	0,20	0,1800	12,00	10,8000	14,00	12,6000
6.	4,25-5,30	1,05	0,20	0,2100	0,25	0,2625	10,00	10,5000	12,00	12,6000
7.	5,30-5,85	0,55	0,20	0,1100	1,10	0,6050	23,00	12,6500	20,00	11,0000
8.	5,85-6,70	0,85	0,25	0,2125	0,15	0,1275	9,00	7,6500	12,00	10,2000
Σ 1-8	0,00-6,70	6,70	1,06	7,1175	0,56	3,7300	19,60	131,3000	17,72	118,7000

piggprøver på I. borort overetg. I. - vest, malmsone I.
vestlig stoff som ligger 11,00 m mot vest fra m.p. 1418.

[illegible]

profil (V)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på 1. borert over nivå I - vest, i malmsone I.
(profil J - vest) ved m.p. 1466 og m.p. 1435.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra venstre side 0,00-1,20	1,20	0,50	0,6000	1,70	2,0400	40,50	48,6000	32,00	38,4000
2.	1,20-2,20	1,00	0,54	0,5400	1,20	1,2000	36,50	36,5000	24,00	24,0000
3.	2,20-3,20	1,00	0,40	0,4000	1,90	1,9000	38,00	38,0000	28,00	28,0000
4.	3,20-4,20	1,00	0,35	0,3500	1,10	1,1000	36,50	36,5000	25,00	25,0000
5.	4,20-5,20	1,00	1,85	1,8500	1,05	1,0500	31,00	31,0000	21,00	21,0000
6.	5,20-6,20	1,00	1,80	1,8000	1,15	1,1500	37,00	37,0000	28,00	28,0000
7.	6,20-7,20	1,00	0,30	0,3000	1,25	1,2500	28,00	28,0000	20,00	20,0000
Σ 1-7.	0,00-7,20	7,20	0,81	5,8400	1,35	9,6900	35,50	255,6000	25,61	184,4000

profil (V)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 212G på nivå av I. borort over nivå I.-vest i malmsone I. (mot syd)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	0,20	0,2000	1,20	1,2000	33,50	33,5000	25,00	25,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,30	0,3000	1,10	1,1000	33,00	33,0000	21,00	21,0000
3.	2,00 - 2,50	0,50	0,85	0,4250	0,80	0,4000	23,50	11,7500	21,00	10,5000
4.	2,50 - 3,50	1,00	0,07	0,0700	0,20	0,2000	4,50	4,5000	9,00	9,0000
5.	3,50 - 4,55	1,05	0,15	0,1575	0,15	0,1575	6,00	6,3000	16,00	16,8000

Σ 1-5	0,00 - 2,50	2,50	0,37	0,9250	1,08	2,7000	31,30	78,2500	22,60	56,5000
----------	-------------	------	------	--------	------	--------	-------	---------	-------	---------

Sum av profil (V)

Σ profil (V) samm. mektig.	13,50	0,66	8,9030	1,39	18,8100	33,79	456,1500	25,72	347,2000
----------------------------------	-------	------	--------	------	---------	-------	----------	-------	----------

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 216 G, på l. borert over nivå I - vest i malmsonen I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	1,20	1,2000	1,40	1,4000	37,00	37,0000	31,00	31,0000
2.	1,00-2,40	1,40	0,25	0,3500	1,00	1,4000	30,00	42,0000	28,00	39,2000
3.	2,40-2,80	0,40	0,05	0,0200	0,15	0,0600	2,75	1,1000	7,00	2,8000
4.	2,80-4,45	1,65	0,75	1,2375	1,30	2,1450	36,50	60,2250	34,00	56,1000
5.	4,45-4,95	0,50	0,10	0,0500	0,15	0,0750	3,00	1,5000	6,00	3,0000
6.	4,95-5,50	0,55	0,20	0,1100	0,10	0,0550	23,50	12,9250	21,00	11,5500
7.	5,50-6,50	1,00	0,10	0,1000	0,10	0,1000	2,50	2,5000	5,00	5,0000
8.	6,50-7,50	1,00	0,05	0,0500	0,15	0,1500	1,00	1,0000	5,00	5,0000
9.	7,50-8,30	0,80	0,10	0,0800	0,25	0,2000	3,00	2,4000	5,25	4,2000
10.	8,30-9,30	1,00	0,30	0,3000	1,45	1,4500	37,00	37,0000	30,00	30,0000
11.	9,30-10,20	0,90	0,55	0,4950	1,70	1,5300	36,75	33,0750	32,00	28,8000
12.	10,20-11,00	0,80	0,15	0,1200	0,20	0,1600	2,50	2,0000	5,00	4,0000
13.	11,00-12,00	1,00	0,85	0,8500	1,05	1,0500	37,00	37,0000	32,00	32,0000
14.	12,00-13,00	1,00	0,40	0,4000	1,40	1,4000	34,00	34,0000	28,00	28,0000
15.	13,00-14,00	1,00	0,05	0,0500	0,10	0,1000	1,00	1,0000	4,00	4,0000
16.	14,00-15,00	1,00	0,05	0,0500	0,05	0,0500	1,25	1,2500	4,00	4,0000
17.	15,00-15,95	0,95	0,10	0,0950	0,07	0,0665	4,00	3,8000	10,00	9,5000
18.	15,95-16,90	0,95	0,30	0,2850	2,20	2,0900	38,00	36,1000	32,00	30,4000
19.	16,90-17,90	1,00	0,20	0,2000	2,00	2,0000	40,00	40,0000	33,00	33,0000
20.	17,90-18,90	1,00	0,20	0,2000	1,25	1,2500	38,00	38,0000	32,00	32,0000
21.	18,90-19,90	1,00	0,25	0,2500	1,70	1,7000	40,00	40,0000	34,00	34,0000
22.	19,90-21,00	1,10	0,15	0,1650	0,50	0,5500	18,00	19,8000	14,00	15,4000
23.	21,00-22,25	1,25	0,05	0,0625	0,10	0,1250	4,00	5,0000	7,00	8,7500
Σ 1-23	0,00-22,25	22,25	0,65	1,5500	1,17	2,8000	32,92	79,0000	29,25	70,2000
Σ 1-4	0,00-4,45	4,45	0,63	2,8075	1,12	5,0050	31,53	140,3250	29,01	129,1000
Σ 5-17	4,45-15,95	11,50	0,24	2,7500	0,56	6,3865	14,73	169,4500	14,70	169,0500
Σ 18-21	15,95-19,90	3,95	0,24	0,9350	1,78	7,0400	39,01	154,1000	32,76	129,4000
Σ 1-21	0,00-19,90	19,90	0,33	6,4925	0,93	18,4315	23,31	463,8750	21,48	427,5500

profil (u)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver, på l. borert over nivå l.-vest i malmsone I.*
1,50m mot øst fra m.p. 1418.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordl. side</i> 0,00-1,00	1,00	1,15	1,1500	1,20	1,2000	42,00	42,0000	38,00	38,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,55	0,5500	1,70	1,7000	35,00	35,0000	26,00	26,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,60	0,6000	2,40	2,4000	38,50	38,5000	29,00	29,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,50	0,5000	1,70	1,7000	41,50	41,5000	29,00	29,0000

Σ	<i>fra nordl. side</i> 1-4,00-4,00	4,00	0,70	2,8000	1,75	7,0000	39,25	157,0000	30,50	122,0000
---	---------------------------------------	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

Sum av profil (u)

Σ	profil (u) sann mektighet	12,35	0,85	10,5125	1,29	15,9600	35,99	444,4250	30,69	379,0000
---	------------------------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil (u)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 2176, på 1. borett over nivå I.-vest i malmsone I., boret mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,95	0,9500	1,10	1,1000	42,50	42,5000	35,50	35,5000
2.	1,00-2,00	1,00	2,25	2,2500	0,75	0,7500	39,00	39,0000	38,00	38,0000
3.	2,00-3,00	1,00	1,30	1,3000	0,80	0,8000	35,00	35,0000	31,00	31,0000
4.	3,00-3,90	0,90	0,45	0,4050	1,45	1,3050	34,00	30,6000	26,00	23,4000
5.	3,90-4,90	1,00	0,15	0,1500	0,70	0,7000	17,50	17,5000	14,00	14,0000
6.	4,90-5,55	0,65	0,08	0,0520	0,75	0,4875	11,00	7,1500	8,00	5,2000
7.	5,55-6,60	1,05	0,20	0,2100	0,75	0,7875	26,00	27,3000	22,00	23,1000
8.	6,60-7,50	0,90	0,15	0,1350	0,95	0,8550	24,25	21,8250	21,00	18,9000
Σ 1-4.	0,00-3,90	3,90	1,26	4,9050	1,01	3,9550	37,72	147,1000	32,79	127,9000
Σ 1-8.	0,00-7,50	7,50	0,73	5,4520	0,90	6,7850	29,45	220,8750	25,21	189,1000
Σ 7-8.	5,55-7,50	1,95	0,18	0,3450	0,84	1,6425	25,19	49,1250	21,54	42,0000

profil (t)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 213G, på 1. kerort over nivå I. - vest
malmsone I. (mot nord).

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,30	0,3000	1,25	1,2500	41,50	41,5000	30,00	30,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,20	0,2000	2,00	2,0000	40,00	40,0000	27,00	27,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,75	0,7500	1,50	1,5000	38,00	38,0000	29,00	29,0000
4.	3,00-3,70	0,70	0,70	0,4900	1,25	0,8750	40,00	28,0000	31,00	21,7000
5.	3,70-4,70	1,00	0,08	0,0800	0,15	0,1500	2,00	2,0000	4,00	4,0000
6.	4,70-5,70	1,00	0,05	0,0500	0,05	0,0500	1,50	1,5000	4,00	4,0000
7.	5,70-6,20	0,50	0,06	0,0300	0,00	0,0000	1,50	0,7500	3,75	1,8750
8.	6,20-6,60	0,40	0,08	0,0320	0,00	0,0000	7,00	2,8000	4,00	1,6000
9.	6,60-7,60	1,00	0,45	0,4500	1,45	1,4500	32,00	32,0000	29,00	29,0000
10.	7,60-8,60	1,00	0,35	0,3500	2,35	2,3500	32,50	32,5000	21,00	21,0000
11.	8,60-9,60	1,00	0,20	0,2000	1,35	1,3500	37,50	37,5000	29,00	29,0000
Σ 1.-4.	0,00-3,70	3,70	0,47	1,7400	1,52	5,6250	39,86	147,5000	29,11	107,7000
Σ 5.-8.	3,70-6,60	2,90	0,07	0,1920	0,07	0,2000	2,43	7,0500	3,96	11,4750
Σ 9.-11.	6,60-9,60	3,00	0,33	1,0000	1,72	5,1500	34,00	102,0000	26,33	79,0000
Σ 1.-11.	0,00-9,60	9,60	0,31	2,9320	1,14	10,9750	26,72	256,5500	20,64	198,1750

22,5m mot vest fra mp. 1404

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
	0,00-1,00	1,00	0,48	0,4800	2,20	2,2000	38,00	38,0000	27,00	27,0000
	1,00-2,00	1,00	0,32	0,3200	1,50	1,5000	40,00	40,0000	28,50	28,5000
	2,00-3,00	1,00	0,85	0,8500	1,80	1,8000	37,70	37,7000	29,00	29,0000
	3,00-4,40	1,40	1,80	2,5200	1,20	1,6800	41,75	58,4500	35,00	49,0000
1-4	0,00-4,40	4,40	0,95	4,1700	1,63	7,1800	39,58	174,1500	30,34	133,5000

profil (t)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 2/4 G, på 1. borert over nivå I. - vest i malmsone I.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-0,75	0,75	0,55	0,4125	0,95	0,7125	23,50	17,6250	17,00	12,7500
2.	0,75-1,55	0,80	0,08	0,0640	0,25	0,2000	4,00	3,2000	5,25	4,2000
3.	1,55-2,50	0,95	0,05	0,0475	0,10	0,0950	2,50	2,3750	5,25	4,9875
Σ 2-3.	0,75-2,50	1,75	0,06	0,1115	0,17	0,2950	3,19	5,5750	5,25	9,1875
Σ 1-3.	0,00-2,50	2,50	0,21	0,5240	0,40	1,0075	9,28	23,2000	8,78	21,9375
Sum av profil (t)										
Σ profil (t) samm mekt.	8,85	0,71	6,3225	1,53	13,5175	38,34	339,2750	28,69	253,9500	

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 215G på l. borort over nivå I. — vest i malmsone I. (boret mot nord)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-0,85	0,85	1,35	1,1475	1,10	0,9350	35,00	29,7500	30,00	25,5000
2.	0,85-1,85	1,00	0,10	0,1000	0,15	0,1500	2,00	2,0000	5,00	5,0000
3.	1,85-2,85	1,00	0,09	0,0900	0,15	0,1500	1,75	1,7500	9,00	9,0000
4.	2,85-3,85	1,00	0,05	0,0500	0,10	0,1000	1,00	1,0000	5,00	5,0000
5.	3,85-5,30	1,45	0,05	0,0725	0,05	0,0725	2,00	2,9000	5,00	7,2500
6.	5,30-6,70	1,40	0,07	0,0980	0,08	0,1120	2,20	3,0800	4,75	6,6500
7.	6,70-7,30	0,60	0,06	0,0360	0,05	0,0300	2,00	1,2000	4,50	2,7000
8.	7,30-8,30	1,00	0,50	0,5000	0,20	0,2000	42,00	42,0000	34,00	34,0000
9.	8,30-9,40	1,10	0,20	0,2200	1,80	1,9800	35,50	39,0500	30,00	33,0000
Σ 2-7.	0,85-7,30	6,45	0,07	0,4465	0,10	0,6145	1,85	11,9300	5,52	35,6000
Σ 8-9.	7,30-9,40	2,10	0,34	0,7200	1,04	2,1800	38,60	81,0500	31,90	67,0000
Σ 1-9.	0,00-9,40	9,40	0,25	2,3140	0,40	3,7295	13,06	122,7300	13,63	128,1000

profil ⑤

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: Piggpr første borart over Etg. I Sone I
vestlige del 50130m mot vest fra m.p. 1372

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
	0.00-1.40	1.40	1.20	1.6800	1.30	1.8200	43.00	60.2000	34.50	48.3000
	1.40-2.40	1.00	0.70	0.7000	1.80	1.8000	39.00	39.0000	30.00	30.0000
	2.40-3.40	1.00	2.00	2.0000	1.15	1.1500	38.50	38.5000	36.00	36.0000
Σ 1-3	0.00-3.40	3.40	1.29	4.3800	1.40	4.7700	40.50	137.7000	33.62	114.3000

Sum av profil ⑤

Σ profil ⑤ sam mektig.	4.25	1.30	5.5275	1.34	5.7050	39.40	167.4500	32.89	139.8000
---------------------------	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 2186, på l. borert over nivå l. - vest i malmsone l., boret mot

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-0,20	0,20	1,90	0,3800	1,45	0,2900	42,00	8,4000	36,00	7,2000
2.	4,55-5,60	1,05	0,25	0,2625	1,55	1,6275	32,00	33,6000	26,00	27,3000
3.	5,60-6,60	1,00	0,35	0,3500	2,10	2,1000	40,00	40,0000	35,00	35,0000
4.	6,60-7,70	1,10	0,20	0,2200	1,25	1,3750	40,00	44,0000	34,50	37,9500
5.	9,65-9,90	0,25	0,17	0,0425	0,85	0,2125	25,00	6,2500	20,00	5,0000
Σ 1.	0,00-0,20	0,20	1,90	0,3800	1,45	0,2900	42,00	8,4000	36,00	7,2000
Σ 2-4.	4,55-7,70	3,15	0,26	0,8325	1,62	5,1025	37,33	117,6000	31,83	109,2500

profil (r)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver på I. barort over etg. I.-vest, matrisone I. fra stoffen som ligger 36,00m mot vest fra m.p. 1379.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nord. gren. 0,00-1,00	1,00	2,20	2,2000	1,30	1,3000	41,70	41,7000	37,00	37,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,30	0,3000	2,10	2,1000	40,00	40,0000	37,00	37,0000
3.	2,00-3,20	1,20	1,00	1,2000	1,05	1,2600	37,50	45,0000	30,00	36,0000
4.	3,20-3,60	0,40	0,52	0,2080	1,30	0,5200	23,00	9,2000	25,00	10,0000
Σ fra nord. gre. 1-4. 0,00-3,60		3,60	1,09	3,9080	1,44	5,1800	37,75	135,9000	33,33	120,0000

Σ fra novl. gr. 1-3.0,00-3,20	3,20	1,16	37000	1,46	46600	39,59	126,7000	34,38	110,0000
----------------------------------	------	------	-------	------	-------	-------	----------	-------	----------

Sum av profil (r)

Σ profil $\odot$ sann mektig.	3,80	1,13	4,2880	1,44	54700	37,97	144,3000	33,47	127,2000
---	------	------	--------	------	-------	-------	----------	-------	----------

profil (P)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver på I. borort over nivå I. - vest, malmsone I. fra venstre side av treerislag mot nord, 7,5 - 11,0 m nord for m.p. 1488*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra m.p. 1488 11,00 - 10,00	1,00	0,35	0,3500	2,10	2,1000	36,00	36,0000	33,00	33,0000
2.	10,00 - 9,00	1,00	0,33	0,3300	1,80	1,8000	41,00	41,0000	34,00	34,0000
3.	9,00 - 8,00	1,00	0,60	0,6000	2,10	2,1000	36,00	36,0000	35,25	35,2500
4.	8,00 - 7,50	0,50	0,50	0,2500	1,55	0,7750	31,50	15,7500	34,50	17,2500

profil (p)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på l. borort over nivå I.-vest, malmsone I.
fra høyre side av tverrsnitt mot nord, 8,0-11,0 m nord fra m.p. 1488.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra m.p. 1488 11,00-10,00	1,00	0,35	0,3500	1,45	1,4500	35,50	35,5000	33,00	33,0000
2.	10,00-9,00	1,00	0,90	0,9000	2,40	2,4000	41,00	41,0000	35,00	35,0000
3.	9,00-8,00	1,00	0,60	0,6000	0,50	0,5000	32,00	32,0000	39,00	39,0000
Σ fra m.p. 1488 1-3. 8,00-11,00		3,00	0,62	1,8500	1,45	4,3500	36,17	108,5000	35,67	107,0000

profil (P)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver fra 1. borert over etg. I. - vest, malmsone I. fra stoffen som ligger 24,50m mot vest fra m.p. 1379.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nert. gr. 0,00 - 0,60	0,60	1,95	1,1700	1,00	0,6000	38,00	22,8000	28,00	16,8000
2.	0,60 - 1,60	1,00	0,90	0,9000	1,90	1,9000	37,50	37,5000	28,00	28,0000
Σ fra nert. gr. 1-2. 0,00 - 1,60		1,60	1,29	2,0700	1,56	2,5000	37,69	60,3000	28,00	44,8000

Sum av profil (P)

Σ profil (P) samm. mektig.	1,60	1,29	2,0700	1,56	2,5000	37,69	60,3000	28,00	44,8000
-------------------------------	------	------	--------	------	--------	-------	---------	-------	---------

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 2196, på 1. borort over nivå 1. - vest i malmsone 1., boret mot nord

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	6,70-7,70	1,00	0,80	0,8000	0,90	0,9000	28,50	28,5000	30,00	30,0000
2.	7,70-8,70	1,00	0,45	0,4500	1,25	1,2500	34,00	34,0000	34,00	34,0000
3.	8,70-9,70	1,00	0,45	0,4500	1,40	1,4000	30,00	30,0000	30,00	30,0000
4.	9,70-10,40	0,70	0,17	0,1190	1,40	0,9800	23,50	16,4500	18,00	12,6000
Σ 1-4	6,70-10,40	3,70	0,49	1,8190	1,22	4,5300	29,45	108,9500	28,81	106,6000

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

diamantborhull nr. 220G, på l. borert over nivå I. - vest
i malmsone I., boret mot nord

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	5,60-6,05	0,25	0,25	0,0625	1,15	0,2875	34,00	8,5000	34,00	8,5000
2.	11,05-11,80	0,75	0,85	0,6375	1,20	0,9000	28,50	21,3750	40,00	30,0000
3.	11,80-12,40	0,60	0,35	0,2100	1,80	1,0800	41,00	24,6000	39,50	23,7000
Σ 2-3.	11,05-12,40	1,35	0,63	0,8475	1,47	1,9800	34,06	45,9750	39,78	53,7000

profil ①

piggprøver fra J. borort over etg. J.-vest, some J.-vest, fra stoffen som ligger 13,60 m mot vest fra m.p. 1378.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nord.gr. 0,00-1,20	1,20	1,65	1,9800	1,35	1,6200	39,00	46,8000	30,50	36,6000
2.	1,20-2,20	1,00	0,95	0,9500	1,15	1,1500	33,00	33,0000	27,00	27,0000
Σ	fra nord.gr. 1-2. 0,00-2,20	2,20	1,33	2,9300	1,26	2,7700	36,27	79,8000	28,91	63,6000

Sum av profil ①

Σ profil ① sann mektig.	220	1,33	2,9300	1,26	2,7700	36,27	79,8000	28,91	63,6000
----------------------------	-----	------	--------	------	--------	-------	---------	-------	---------

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *diamantborhull 22/G, på 1. borert over nivå 1. - Vest i malmsonen 1., boret mot nord*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	6,25-7,25	1,00	0,82	0,8200	0,70	0,7000	30,00	30,0000	27,00	27,0000
2.	7,25-8,30	1,05	0,15	0,1575	1,20	1,2600	37,00	38,8500	33,00	34,6500
3.	10,10-10,80	0,70	0,25	0,1750	1,00	0,7000	31,00	21,7000	27,00	18,9000
<u>Σ</u> 1-2.	<u>6,25-8,30</u>	<u>2,05</u>	<u>0,48</u>	<u>0,9775</u>	<u>0,96</u>	<u>1,9600</u>	<u>33,59</u>	<u>68,8500</u>	<u>30,07</u>	<u>61,6500</u>

profil (12)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver fra I. borort over etg. I. - vest, sone I. - vest, fra stoffen som ligger 48,40 m mot vest fra m.p. 1334.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra norl. gr. 0,00 - 1,40	1,40	1,25	1,7500	1,10	1,5400	41,00	57,4000	32,50	45,5000
2.	1,40 - 2,40	1,00	0,80	0,8000	1,60	1,6000	49,00	49,0000	39,00	39,0000
Σ	fra norl. gr. 1-2. 0,00 - 2,40	2,40	1,06	2,5500	1,31	3,1400	40,58	97,4000	31,46	75,5000

Wtpp 11

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 2226, på l. borart over nivå l. - vest i malmsone l., boret mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,20	0,2000	1,25	1,2500	39,00	39,0000	37,00	37,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,20	0,2000	0,85	0,8500	39,25	39,2500	37,00	37,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,30	0,3000	0,55	0,5500	38,00	38,0000	37,00	37,0000
4.	3,00-3,40	0,40	0,25	0,1000	0,10	0,0400	16,00	6,4000	15,00	6,0000
Σ 1-4.	0,00-3,40	3,40	0,23	0,8000	0,79	2,6900	36,07	122,6500	34,41	117,0000

profil (m)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 223G, på 1. borert over nivå I - vest i malmsone I., boret mot nord

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 0,70	0,70	0,90	0,6300	0,95	0,6650	46,00	32,2000	39,00	27,3000
2.	0,70 - 1,35	0,65	1,30	0,8450	0,65	0,4225	42,50	27,6250	36,00	23,4000
3.	2,50 - 2,80	0,30	1,30	0,3900	0,65	0,1950	42,50	12,7500	36,00	10,8000
4.	8,00 - 8,30	0,30	0,10	0,0300	0,10	0,0300	27,00	8,1000	25,00	7,5000
5.	9,80 - 10,90	1,10	0,20	0,2200	0,75	0,8250	39,60	43,4500	35,00	38,5000
6.	10,90 - 11,65	0,75	0,10	0,0750	0,10	0,0750	5,00	3,7500	4,00	3,0000
7.	11,65 - 12,55	0,90	0,95	0,8550	1,00	0,9000	44,50	40,0500	38,50	34,6500
Σ 1.-2.	0,00 - 1,35	1,35	1,09	1,4750	0,81	1,0875	44,31	59,8250	37,56	50,7000
Σ 5.-7.	9,80 - 12,55	2,75	0,42	1,1500	0,65	1,8000	31,73	87,2500	27,69	76,1500

profil (m)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver fra I. berert over elg. I. - vest, some I - vest, fra stoffen som ligger 35,60m mot vest fra m.p. 1334.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra merl. gr. 0,00 - 1,00	1,00	0,45	0,4500	1,40	1,4000	43,25	43,2500	31,00	31,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,95	0,9500	1,95	1,9500	43,00	43,0000	32,00	32,0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,60	0,6000	2,15	2,1500	39,00	39,0000	26,00	26,0000
4.	3,00 - 3,80	0,80	0,40	0,3200	2,00	1,6000	41,50	33,2000	31,00	24,8000
Σ	fra merl. gr. 1-4. 0,00 - 3,80	3,80	0,61	2,3300	1,87	7,1000	41,70	158,4500	29,95	113,8000

Sum av profil (m)

Σ profil (m) sann mektig.	15,65	0,86	13,5300	1,15	17,9875	40,64	636,0250	32,52	509,0000
------------------------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil (m)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 2246 på 1. borert over nivå J. - vest i malmsone J., boret mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	1,30	1,3000	0,95	0,9500	44,00	44,0000	36,00	36,0000
2.	1,00-2,00	1,00	1,35	1,3500	1,20	1,2000	40,50	40,5000	34,00	34,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,90	0,9000	1,45	1,4500	39,00	39,0000	32,00	32,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,60	0,6000	1,05	1,0500	41,50	41,5000	33,00	33,0000
5.	4,00-5,00	1,00	0,60	0,6000	0,60	0,6000	31,00	31,0000	26,00	26,0000
6.	5,00-6,00	1,00	0,30	0,3000	0,50	0,5000	27,50	27,5000	21,00	21,0000
7.	6,00-7,00	1,00	0,65	0,6500	0,70	0,7000	44,50	44,5000	35,00	35,0000
8.	7,00-8,00	1,00	0,65	0,6500	1,10	1,1000	43,50	43,5000	35,00	35,0000
9.	8,00-9,00	1,00	2,10	2,1000	0,75	0,7500	44,00	44,0000	38,00	38,0000
10.	9,00-10,00	1,00	1,15	1,1500	1,15	1,1500	44,75	44,7500	39,00	39,0000
11.	10,00-10,50	0,50	0,25	0,1250	0,70	0,3500	35,00	17,5000	31,00	15,5000
Σ 1-11	0,00-10,50	10,50	0,93	9,7250	0,93	9,8000	39,79	417,7500	32,81	344,5000

profil ②

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på l. borort over nivå I.-vest, malmsone I.
fra venstre side av tverrslag mot nord, nord fra m.p. 1345.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. gr. 0,00 - 1,00	1,00	2,50	2,5000	0,60	0,6000	31,00	31,0000	31,00	31,0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,95	0,9500	2,35	2,3500	43,00	43,0000	37,25	37,2500
3.	2,00 - 3,00	1,00	1,40	1,4000	1,50	1,5000	43,00	43,0000	38,75	38,7500
Σ	fra nordl. gr. 1-3. 0,00 - 3,00	3,00	1,62	4,8500	1,48	4,4500	39,00	117,0000	35,67	107,0000

profil ①

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

piggprøver fra I. korort over elg. I. - vest, some I., øst som ligger 2250m mot vest fra m.p. 1334.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra norl. side 0,00-1,00	1,00	1,25	1,2500	1,90	1,9000	44,00	44,0000	31,00	31,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,30	0,3000	1,70	1,7000	40,00	40,0000	28,50	28,5000
3.	2,00-3,00	1,00	1,06	1,0600	2,50	2,5000	40,50	40,5000	28,00	28,0000
4.	3,00-4,00	1,00	1,35	1,3500	1,90	1,9000	40,25	40,2500	26,50	26,5000
Σ	fra norl. side 1-4, 0,00-4,00	4,00	0,99	3,9600	2,00	8,0000	41,19	164,7500	28,50	114,0000

Sum av profil ①

Σ profil ① samm mektig.	20,10	0,81	16,3650	1,19	23,8300	40,00	804,0000	33,30	669,2500
----------------------------	-------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

prof. ☺

piggprøver på 1. borert over nivå I.-vest, malmsone I.
treerislag mot syd, syd for m.p. 1345, på høyre (vestlig) side.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00 - 1,00	1,00	1,02	1,0200	1,35	1,3500	40,00	40,0000	30,50	30,5000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,72	0,7200	1,10	1,1000	40,50	40,5000	30,00	30,0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,81	0,8100	1,05	1,0500	40,00	40,0000	30,50	30,5000
4.	3,00 - 4,00	1,00	0,75	0,7500	1,15	1,1500	41,50	41,5000	33,00	33,0000
5.	4,00 - 5,00	1,00	0,68	0,6800	1,20	1,2000	42,00	42,0000	35,00	35,0000
6.	5,00 - 6,00	1,00	0,65	0,6500	1,15	1,1500	41,50	41,5000	36,50	36,5000
7.	6,00 - 7,00	1,00	0,63	0,6300	1,10	1,1000	41,00	41,0000	37,00	37,0000
8.	7,00 - 8,00	1,00	0,55	0,5500	0,70	0,7000	43,00	43,0000	37,50	37,5000
9.	8,00 - 9,00	1,00	0,80	0,8000	0,80	0,8000	44,00	44,0000	39,50	39,5000
10.	9,00 - 10,00	1,00	0,30	0,3000	0,75	0,7500	40,50	40,5000	37,25	37,2500
11.	10,00 - 11,00	1,00	0,28	0,2800	0,50	0,5000	35,00	35,0000	33,00	33,0000
12.	11,00 - 12,00	1,00	0,20	0,2000	0,20	0,2000	32,00	32,0000	30,00	30,0000
13.	12,00 - 13,10	1,10	0,15	0,1650	0,30	0,3300	37,50	41,2500	35,00	38,5000
Σ 1.-13.	0,00 - 13,10	13,10	0,58	7,5550	0,87	11,3800	39,87	522,2500	34,22	448,2500

profil (k)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

piggprøver fra tverrslag på I. korort over etg. I.-vest
av sone I., ca 8 m dst fra m.p. 1323. (1. prøve). ①

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nord.gr. 0,00-1,00	1,00	0,95	0,9500	1,15	1,1500	39,00	39,0000	28,50	28,5000
2.	1,00-2,00	1,00	1,85	1,8500	1,75	1,7500	41,00	41,0000	30,50	30,5000
3.	2,00-3,00	1,00	0,42	0,4200	0,80	0,8000	43,50	43,5000	32,00	32,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,95	0,9500	1,20	1,2000	42,25	42,2500	32,00	32,0000
5.	4,00-5,00	1,00	1,37	1,3700	0,80	0,8000	42,25	42,2500	32,50	32,5000
6.	5,00-6,00	1,00	1,55	1,5500	2,55	2,5500	44,00	44,0000	32,00	32,0000
7.	6,00-7,00	1,00	1,65	1,6500	1,85	1,8500	41,50	41,5000	29,00	29,0000
8.	7,00-8,00	1,00	0,70	0,7000	1,50	1,5000	42,00	42,0000	29,00	29,0000
9.	8,00-9,00	1,00	1,65	1,6500	1,55	1,5500	41,50	41,5000	29,50	29,5000
10.	9,00-10,00	1,00	0,45	0,4500	2,50	2,5000	42,00	42,0000	29,25	29,2500
11.	10,00-11,00	1,00	0,55	0,5500	2,90	2,9000	43,75	43,7500	31,50	31,5000
12.	11,00-12,00	1,00	0,30	0,3000	1,60	1,6000	40,75	40,7500	31,25	31,2500
13.	12,00-13,00	1,00	0,25	0,2500	1,60	1,6000	37,50	37,5000	31,00	31,0000
14.	13,00-14,00	1,00	0,05	0,0500	1,20	1,2000	33,50	33,5000	27,50	27,5000
15.	14,00-15,00	1,00	0,05	0,0500	2,00	2,0000	37,00	37,0000	27,50	27,5000
16.	15,00-16,00	1,00	0,05	0,0500	2,20	2,2000	38,00	38,0000	29,00	29,0000

profil (k)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for piggprøver fra tverrslag på I. borert over etg. I. - vest av sone I, ca 8m mot det fra m.p. 1323 (1. prøve) ②

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
17.	16,00-17,00	1,00	0,05	0,0500	1,75	1,7500	37,75	37,7500	29,00	29,0000
18.	17,00-18,00	1,00	0,40	0,4000	2,10	2,1000	24,00	24,0000	29,50	29,5000
19.	18,00-19,00	1,00	0,35	0,3500	0,85	0,8500	29,50	29,5000	26,00	26,0000
20.	19,00-20,00	1,00	0,30	0,3000	2,00	2,0000	40,00	40,0000	30,00	30,0000
21.	20,00-21,30	1,30	1,10	1,4300	0,35	0,4550	46,00	59,8000	35,00	45,5000
Sum av profil (k)										
Σ fra norl. gr. 1-21 0,00-21,30		21,30	0,72	15,3200	1,61	34,3050	39,46	840,5500	30,14	642,0000
Σ sann. mekthet		(19,80)								
22.	21,30-22,30	1,00	0,05	0,0500	0,15	0,1500	2,50	2,5000	9,50	9,5000
23.	22,30-23,30	1,00	0,05	0,0500	2,20	2,2000	35,50	35,5000	26,50	26,5000
24.	23,30-24,90	1,60	0,05	0,0800	1,80	2,8800	38,00	60,8000	26,25	42,0000
Σ 23-24 22,30-24,90		2,60	0,05	0,1300	1,95	5,0800	37,04	96,3000	26,35	68,5000
Σ fra norl. gr. 1-24 0,00-24,90		24,90	0,62	15,5000	1,59	39,5350	37,73	939,3500	28,92	720,0000

profil (J)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 225 G, på 1. borert over nivå I - vest i malmsone I., boret mot nord

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00 - 1,00	1,00	1,10	1,1000	1,05	1,0500	46,00	46,0000	40,50	40,5000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,75	0,7500	0,90	0,9000	41,75	41,7500	38,00	38,0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,72	0,7200	0,80	0,8000	42,00	42,0000	39,00	39,0000
4.	3,00 - 4,00	1,00	0,85	0,8500	0,95	0,9500	40,00	40,0000	34,00	34,0000
5.	4,00 - 5,00	1,00	0,60	0,6000	0,90	0,9000	44,00	44,0000	39,00	39,0000
6.	5,00 - 5,90	0,90	1,80	1,6200	0,75	0,6750	44,50	40,0500	40,50	36,4500
Σ 1-6.	0,00 - 5,90	5,90	0,96	5,6400	0,89	5,2750	43,02	253,8000	38,47	226,9500

Sum av profil (J)

Σ sann mekanisk	profil (J) 20,00	0,59	11,8460	1,13	22,5450	41,83	836,5810	35,40	708,0100
--------------------	---------------------	------	---------	------	---------	-------	----------	-------	----------

opit (j)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 226 G, på l. borert over nivå I - vest i malmsone I, borert mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-0,90	0,90	0,25	0,2250	1,60	1,4400	44,75	40,2750	35,50	31,9500
2.	0,90-1,30	0,40	0,12	0,0480	0,20	0,0800	3,50	1,4000	16,00	6,4000
3.	1,30-2,00	0,70	0,15	0,1050	0,20	0,1400	25,00	17,5000	24,00	16,8000
4.	2,00-2,60	0,60	0,09	0,0540	0,15	0,0900	21,75	13,0500	18,00	10,8000
5.	2,60-3,60	1,00	0,05	0,0500	1,45	1,4500	39,00	39,0000	33,00	33,0000
6.	3,60-4,60	1,00	0,07	0,0700	0,60	0,6000	38,00	38,0000	32,00	32,0000
7.	4,60-5,60	1,00	0,07	0,0700	0,70	0,7000	39,50	39,5000	33,25	33,2500
8.	5,60-6,20	0,60	0,09	0,0540	1,05	0,6300	34,50	20,7000	28,50	17,1000
9.	6,20-7,20	1,00	0,60	0,6000	0,60	0,6000	48,00	48,0000	40,50	40,5000
10.	7,20-8,20	1,00	0,65	0,6500	0,85	0,8500	48,00	48,0000	40,50	40,5000
11.	8,20-9,40	1,20	0,65	0,7800	1,15	1,3800	49,00	58,8000	41,00	49,2000
Σ 1-11.	0,00-9,40	9,40	0,29	2,7060	0,85	7,9600	39,04	366,9310	34,07	320,2600

profil (i)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for:

piggprøver fra I. korort over etg I.-vest, zone I., øst
som ligger 30,30m mot øst fra m.p. 1334.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nort. side 0,00 - 0,40	0,40	1,30	0,5200	0,55	0,2200	41,00	16,4000	34,00	13,6000
2.	0,40 - 0,95	0,55	0,60	0,3300	0,55	0,3025	6,00	3,3000	11,00	6,0500
3.	0,95 - 2,35	1,40	0,70	0,9800	1,25	1,7500	44,00	61,6000	33,00	46,2000
4.	2,35 - 2,65	0,30	0,10	0,0300	2,00	0,6000	23,00	6,9000	29,00	6,0000
5.	2,65 - 3,65	1,00	0,45	0,4500	3,90	3,9000	45,00	45,0000	34,00	34,0000
Σ fra nort. side 1-5 0,00 - 3,65		3,65	0,63	2,3100	1,86	6,7725	36,49	133,2000	29,00	105,8500

Sum av profil (i)

Σ profil (i) sann mektig.	13,80	0,44	6,0100	1,24	17,1275	40,92	564,7500	33,96	468,7000
------------------------------	-------	------	--------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil ①

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 227 G på 1. berørt over nivå I.-vest i malmsone I., boret mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,25	0,2500	1,45	1,4500	39,50	39,5000	33,00	33,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,07	0,0700	0,90	0,9000	36,50	36,5000	30,00	30,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,07	0,0700	1,20	1,2000	42,00	42,0000	36,00	36,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,20	0,2000	0,40	0,4000	40,00	40,0000	34,00	34,0000
5.	4,00-5,00	1,00	0,30	0,3000	0,65	0,6500	41,50	41,5000	34,00	34,0000
6.	5,00-6,00	1,00	0,20	0,2000	0,85	0,8500	41,75	41,7500	36,00	36,0000
7.	6,00-7,00	1,00	0,70	0,7000	0,65	0,6500	41,50	41,5000	36,00	36,0000
8.	7,00-8,00	1,00	0,72	0,7200	1,65	1,6500	47,50	47,5000	39,00	39,0000
9.	8,00-9,00	1,00	0,50	0,5000	1,80	1,8000	47,25	47,2500	40,00	40,0000
10.	9,00-10,15	1,15	0,60	0,6900	0,70	0,8050	47,00	54,0500	39,00	44,8500
Σ 1.-10.	0,00-10,15	10,15	0,36	3,7000	1,02	10,3550	42,52	431,5500	35,75	362,8500

profil (h)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 228 G, på 1. barert over nivå I - vest i malingsone I, barert mot

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,05	1,05	0,80	0,8400	1,05	1,1025	41,00	43,0500	34,00	35,7000
Σ	0,00-1,05	1,05	0,80	0,8400	1,05	1,1025	41,00	43,0500	34,00	35,7000

Sum av profil (h)

Σ	profil (h) sann mektigh.	11,20	0,43	4,7865	1,13	12,6450	41,45	464,2875	33,23	372,1500
---	-----------------------------	-------	------	--------	------	---------	-------	----------	-------	----------

profil (h)

prøvet over fra I. horort over etg. I. - vest, sone I., øst
fra stoffen som ligger 41,20 m mot øst fra m.p. 1334.

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nord-side 0,00 - 1,00	1,00	0,65	0,6500	1,50	1,5000	44,00	44,0000	32,25	32,2500
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,65	0,6500	1,60	1,6000	44,50	44,5000	33,00	33,0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,05	0,0500	1,25	1,2500	37,00	37,0000	30,00	30,0000
4.	3,00 - 3,60	0,60	0,05	0,0300	1,90	1,1400	43,75	26,2500	33,25	19,9500
Σ fra nord-side 1-4. 0,00 - 3,60		3,60	0,38	1,3800	1,53	5,4900	42,15	151,7500	32,00	115,2000

profil **(h)**

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. **229 G**, på 1. borert over nivå T. - vest i malmsone I., borel mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-0,80	0,80	0,13	0,1040	0,70	0,5600	44,50	35,6000	36,00	28,8000
2.	0,80-1,70	0,90	0,20	0,1800	0,55	0,4950	40,00	36,0000	30,00	27,0000
3.	1,70-2,45	0,75	0,20	0,1500	0,80	0,6000	41,75	31,3125	36,00	27,0000
4.	2,45-3,10	0,65	0,05	0,0325	0,15	0,0975	2,50	1,6250	7,00	4,5500
5.	3,10-4,25	1,15	0,60	0,6900	1,10	1,2650	48,00	55,2000	39,00	44,8500
6.	4,25-5,25	1,00	0,50	0,5000	1,80	1,8000	48,00	48,0000	39,00	39,0000
7.	5,25-6,55	1,30	0,70	0,9100	0,95	1,2350	47,50	61,7500	38,50	50,0500
Σ 1-7.	0,00-6,55	6,55	0,39	2,5665	0,92	6,0525	41,14	269,4875	33,78	221,2500

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for *piggprøver, på l. borert over nivå I. - vest i malm-
sone I. fra stoff, 2m vest for m.p. 1387.*

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nordl. side</i> 0,00 - 1,20	1,20	0,55	0,6600	0,90	1,0800	44,50	53,4000	36,00	43,2000
2.	1,20 - 2,60	1,40	0,73	1,0220	0,95	1,3300	46,75	65,4500	40,00	56,0000
3.	2,60 - 4,00	1,40	0,64	0,8960	0,90	1,2600	41,25	57,7500	36,00	50,4000
Σ	<i>fra nordl. side</i> 1-3 0,00 - 4,00	4,00	0,64	2,5780	0,92	3,6700	44,15	176,6000	37,40	149,6000

Piggprøve fra tverrslag mot nord (høyre side), 20m mot vest fra m.p. 1387

7.	5,65 - 6,00	0,35	0,40	0,1400	1,05	0,3675	42,50	14,8750	32,00	11,2000
----	-------------	------	------	--------	------	--------	-------	---------	-------	---------

Σ	<i>1-3 piggprøver</i>	4,35	0,62	2,7180	0,93	4,0375	44,02	191,4750	36,97	160,8000
---	-----------------------	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

Sum av profil ⑨

Σ	<i>profil ⑨ samt metting</i>	10,30	0,43	4,3830	0,93	9,5775	37,68	388,1375	32,24	332,1000
---	----------------------------------	-------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

pro 1/8

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 230 G, på l. borert over nivå l. - vest i malmsone l., boret mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,15	0,1500	0,90	0,9000	40,75	40,7500	34,50	34,5000
2.	1,00-1,95	0,95	0,10	0,0950	1,15	1,0925	39,00	37,0500	34,00	32,3000
3.	1,95-3,50	1,55	0,05	0,0775	0,15	0,2325	2,00	3,1000	7,00	10,8500
4.	3,50-4,50	1,00	0,70	0,7000	1,30	1,3000	47,50	47,5000	39,00	39,0000
5.	4,50-5,20	0,70	0,65	0,4550	0,95	0,6650	48,50	33,9500	39,50	27,6500
6.	5,20-5,95	0,75	0,25	0,1875	1,80	1,3500	45,75	34,3125	36,00	27,0000
Σ 1.-6.	0,00-5,95	5,95	0,28	1,6650	0,93	5,5400	33,05	196,6625	20,79	171,3000
Σ 1.-2.	0,00-1,95	1,95	0,13	0,2450	1,02	1,9925	39,90	77,8000	34,26	66,8000
Σ 4.-6.	3,50-5,95	2,45	0,55	1,3425	1,35	3,3150	47,25	115,7625	38,22	93,6500

profil 

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 23/6, på 1. borert over nivå 1.-vest i malmsone I., boret mot nord

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	0,75	0,7500	0,95	0,9500	46,50	46,5000	41,50	41,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,50	0,5000	1,55	1,5500	45,80	45,8000	39,00	39,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,25	0,2500	2,20	2,2000	46,50	46,5000	39,00	39,0000
4.	3,00-4,00	1,00	0,60	0,6000	1,45	1,4500	45,00	45,0000	38,00	38,0000
5.	4,00-4,85	0,85	0,20	0,1700	1,10	0,9350	44,00	37,4000	35,00	29,7500
6.	4,85-5,35	0,50	0,07	0,0350	0,25	0,1250	3,00	1,0000	2,50	1,2500
7.	5,35-6,10	0,75	0,65	0,4875	0,90	0,6750	40,00	30,0000	33,50	25,1250
8.	6,10-7,10	1,00	0,15	0,1500	0,10	0,1000	3,00	3,0000	8,00	8,0000
9.	7,10-7,75	0,65	0,50	0,3250	0,80	0,5200	41,75	27,1375	37,00	24,0500
Σ 1-5.	0,00-4,85	4,85	0,47	2,2700	1,46	7,0850	46,61	221,2000	38,61	187,2500
Σ 1-9.	0,00-7,75	7,75	0,42	3,2675	1,10	8,5050	36,43	282,3375	31,70	245,6750

profil (F)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>piggprøver fra I. korort over etg. I - vest, sone I. Østlige del, fra stoffen som ligger 30m mot øst fra mp. 1388.</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nord. side</i> 0,00 - 1,00	1,00	0,95	0.9500	0,50	0.5000	47,00	47.0000	35,00	35.0000
2.	1,00 - 2,00	1,00	0,92	0.9200	1,90	1.9000	45,50	45.5000	33,00	33.0000
3.	2,00 - 3,00	1,00	0,55	0.5500	1,60	1.6000	45,50	45.5000	33,00	33.0000
4.	3,00 - 4,00	1,00	0,65	0.6500	1,10	1.1000	48,50	48.5000	35,00	35.0000
Σ	<i>fra nord. side</i> 1-4. 0,00 - 4,00	4,00	0,77	3,0700	1,28	5,1000	46,63	186,5000	34,00	136,0000
Σ Bh 231 G	4,85	0,47	2,2700	1,46	7,0850	45,61	221,2000	38,61	187,2500	
Σ Bh 232 G	3,15	0,29	0,8985	2,56	8,0500	47,52	149,7000	39,21	123,5000	
Sum av profil (f)										
Σ	profil (f) sannmektigh.	12,00	0,52	6,2385	1,69	20,2350	46,45	557,4000	37,23	446,7500

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 232G, i malmsonen I, boret mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ ·m	Zn % a ₂	a ₂ ·m	S % a ₃	a ₃ ·m	Fe % a ₄	a ₄ ·m
1.	0,00-1,00	1,00	0,40	0,4000	2,70	2,7000	47,00	47,0000	38,50	38,5000
2.	1,00-2,00	1,00	0,28	0,2800	1,90	1,9000	47,50	47,5000	39,00	39,0000
3.	2,00-3,15	1,15	0,19	0,2185	3,00	3,4500	48,00	55,2000	40,00	46,0000
Σ 1.-3.	0,00-3,15	3,15	0,29	0,8985	2,56	8,0500	47,52	149,7000	39,21	123,5000

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. **233G**, på l. borort over nivå l. - vest i malmsone I., boret mot nord

Σ	0,00-0,90	0,90	0,40	0,3600	0,60	0,5400	15,00	40,5000	38,50	34,6500
----------	-----------	------	------	--------	------	--------	-------	---------	-------	---------

profil (e)

øst (f)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for <i>Piggprøver på I. borort over etg. I. - vest, malmsonne I. østlige området, 31,60 m mot øst fra m.p. 1387 (fra stoffen)</i>										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	<i>fra nork. side</i> 0,00 - 1,20	1,20	0,75	0,9000	2,10	2,5200	44,00	52,8000	35,00	42,0000
2.	1,20 - 2,50	1,30	0,55	0,7150	2,10	2,7300	46,00	59,8000	35,50	46,1500
3.	2,50 - 4,00	1,50	0,55	0,8250	2,65	3,9750	45,00	67,5000	35,25	52,8750
Σ	<i>fra nork. side</i> 1-3, 0,00 - 4,00	4,00	0,61	2,4400	2,31	9,2250	45,03	180,1000	35,26	141,0250

profil (e)

Gjennomsnitt av kjemisk analyser for borhull nr. 234 G, på l. borort over nivå l. - vest i malmsone l., boret mot syd

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ m	Zn % a ₂	a ₂ m	S % a ₃	a ₃ m	Fe % a ₄	a ₄ m
1.	0,00-1,00	1,00	1,30	1,3000	1,50	1,5000	45,50	45,5000	38,00	38,0000
2.	1,00-1,70	0,70	0,50	0,3500	1,00	0,7000	48,25	33,7750	41,00	28,7000
Σ 1.-2.	0,00-1,70	1,70	0,97	1,6500	1,29	2,2000	46,63	79,2750	39,24	66,7000
Σ Bh 233 G	0,90	0,90	0,40	0,3600	0,60	0,5400	45,00	40,5000	38,50	34,6500
Σ piggprøver	4,00	4,00	0,61	2,4400	2,31	9,2250	45,03	180,1000	35,26	141,0250
Sum av profil (e)										
Σ profil (e) samm. mæktigh.	6,60	6,60	0,67	4,4500	1,81	11,9650	45,44	299,8750	36,72	242,3750

profil (d)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

prøveprøver, l. borert over nivå I.-vest, malmzone I., fra stoff som ligger 42,00m mot dst fra m.p. 1387.

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. side 0,00-1,00	1,00	0,62	0,6200	2,80	2,8000	45,00	45,0000	38,00	38,0000
2.	1,00-2,00	1,00	0,60	0,6000	2,60	2,6000	47,00	47,0000	40,00	40,0000
3.	2,00-3,00	1,00	0,62	0,6200	2,00	2,0000	46,00	46,0000	39,00	39,0000
4.	3,00-3,80	0,80	1,05	0,8400	0,15	0,1200	42,00	33,6000	37,00	29,6000
Σ 1-4.	0,00-3,80	3,80	0,71	2,6800	1,98	7,5200	45,16	171,6000	38,58	146,6000
Σ a	Slamhull 1. mot nord	0,90	0,72	0,6480	2,40	2,1600	46,25	41,6250	39,00	35,1000
Σ b	Slamhull 2. mot syd	1,00	0,95	0,9500	0,45	0,4500	42,00	42,0000	37,50	37,5000
Sum av profil (d)										
Σ profil (d) samme tigh.	5,70	0,75	4,2780	1,78	10,1300	44,78	255,2250	38,46	219,2000	

profil ©

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for: *Piggpr. første borert over Etg. I Sone I østlig del*
6.5m mot øst fra m.p. 1403

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
	0,00-1,00	1,00	1,00	1,0000	0,40	0,4000	42,00	42,0000	40,00	40,0000
	1,00-2,00	1,00	0,50	0,5000	3,20	3,2000	42,50	42,5000	36,00	36,0000
	2,00-3,00	1,00	0,65	0,6500	1,90	1,9000	46,00	46,0000	39,50	39,5000
	3,00-3,70	0,70	1,00	0,7000	0,80	0,5600	43,50	30,4500	36,50	25,5500
Σ	0,00-3,70	3,70	0,77	2,8500	1,64	6,0600	43,50	160,2500	38,12	141,0500

Sum av profil ©

Σ profil © sannmektig.	3,70	0,77	2,8500	1,64	6,0600	43,50	160,2500	38,12	141,0500
---------------------------	------	------	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver, på 1. borort over nivå I. - vest i markise I.
fra stoff som ligger 2,0 m mot vest fra m.p. 14/2.

Σ fra nordl.gr. 1.-3.0.00-2.80	280	1,01	28400	1,19	33200	41,75	116,9000	38,57	108,0000
--	-----	------	-------	------	-------	-------	----------	-------	----------

profil (b)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for										
Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra nordl. gr. 0,00-1,00	1,00	1,75	1,7500	0,40	0,4000	41,50	41,5000	36,50	36,5000
2.	1,00-2,15	1,15	1,40	1,6100	0,40	0,4600	42,00	48,3000	36,50	41,9750
Σ fra nordl. gr. 1-2. 0,00-2,15										
	2,15	1,56	3,3600	0,40	0,8600	41,77	89,8000	36,50	78,4750	
Σ piggprøver 1-3. 0,00-2,80										
	2,80	1,01	2,8400	1,19	3,3200	41,75	116,9000	38,57	108,0000	
sann mektighet (1,60)										
Sum av profil (b)										
Σ profil (b) sann mektig.										
	3,75	1,25	4,6875	0,84	3,1500	41,76	156,6000	37,67	141,2689	

profil(a)

Gjennomsnitt av kjemiske analyser for

piggprøver på l. borort over nivå I. - vest, østlig del
i malmsonen I., nord-vest fra m.p. 1489 (1046-1340m)

Nr.	meter	tykkelse m	Cu % a ₁	a ₁ · m	Zn % a ₂	a ₂ · m	S % a ₃	a ₃ · m	Fe % a ₄	a ₄ · m
1.	fra m.p. 1489 13,40-12,40	1,00	1,50	1,5000	0,50	0,5000	40,25	40,2500	37,00	37,0000
2.	12,40-11,40	1,00	0,65	0,6500	2,10	2,1000	44,00	44,0000	38,50	38,5000
3.	11,40-10,40	1,00	0,30	0,3000	2,60	2,6000	42,00	42,0000	37,25	37,2500
Σ	fra m.p. 1489 1-3. 13,40-10,40	3,00	0,82	2,4500	1,73	5,2000	42,08	126,2500	37,58	112,7500

Sum av profil (a)

Σ profi/@ sann mektigh.	1,10	0,82	0,9020	1,73	1,9030	42,08	43,1800	37,58	41,3380
--------------------------------	------	------	--------	------	--------	-------	---------	-------	---------