



Bergvesenet


Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 622	Intern Journal nr 442/79 FB	Internt arkiv nr T & F 1053	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv Troms & Finnmark USB	Ekstern rapport nr NGU 1650/47B	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Borkjernelogg for diamantboring i Rieppe				
Forfatter Lindahl, Ingvar		Dato 28.05 1979	Bedrift NGU	
Kommune Nordreisa	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 17343	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring Geologi	Dokument type		Forekomster Rieppe	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Kis Zn Cu			
Sammendrag Rapporten presenterer borkjernelogg for Rieppeforekomsten for boringene fra 1968 - 1971. Det er gitt en kort kommentar til boringene, og borhullene er plottet på kart.				

Inv. 442/79.FB.
18/8-79

Nr.: 1053



Jnr. 205/81 FB.
9/3 -81.

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Bergmesteren i
Troms og Finnmark

L 9500 ALTA

DERES REF:

DERES BREV:

VÅR REF:

LEIV EIRIKSSONS VEI 39
POSTBOKS 3006
TELEFON (075) 15860

7001 TRONDHEIM.

Jnr. 864/81G

26. februar 1981

IL/ABD

NGU-RAPPORT NR 1650/47B

Vedlagt oversendes manglende tegninger i NGU-rapport
nr. 1650/47B.

Med hilsen
Geologisk avdeling

Ingvar Lindahl
Ingvar Lindahl
førstestatsgeolog

UNDERSØKELSE AV
STATENS BERGRETTIGHETER
1978

NGU-rapport nr. 1650/47B

Borkjerneolog for diamantboring i
RIEPPE
1968-1971

Nordreisa, Troms

Jnr. 483/79 FB.
17/9 - 79.

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Bergmesteren i Troms og
Finnmark

9500 ALTA

LEIV EIRIKSSONS VEI 39

POSTBOKS 3006

TELEFON (075) 15860

DERES REF:

DERES BREV:


VÅR REF:
Jnr. 3603/79G
IL/Amb

7001 TRONDHEIM,
14. september

ANG. TIDLIGERE OVERSENDT RAPPORT FRA USB NR. 1650/47 B.

Det har sneket seg inn en feil ved innbindingen av rapporten i bilagene. Etter Bilag 4 - side 100 er resten av sidene i dette bilag og sidene i Bilag 5 sortert i motsatt rekkefølge.

Vennlig hilsen


Ingvar Lindahl
førstestatsgeolog



Postgironr. 5168232
Bankgironr. 0633.05.70014

Ved referanse til rapporten oppgis forfatter, tittel og rapportnr.

INNHold

	Side
INNLEDNING	4
BORINGENE I RIEPPE	5
ANALYSEVERDIENE	6
LITTERATURREFERANSER	7

BILAG

- 1: Oversikt over borhull i Rieppe
- 2: Borkjernelog 1968 med analyser
- 3: Borkjernelog 1969 med analyser
- 4: Borkjernelog 1970 med analyser
- 5: Borkjernelog 1971 med analyser

TEGNINGER

1650/47B-01	Oversiktskart Vaddas-Rieppe	M 1:50 000
-02	Boringer i Rieppe	M 1: 2 000

INNLEDNING

I perioden 1968-1974 gjorde A/S Bleikvassli Gruber omfattende prospekteringsarbeider i Nord-Troms. Det ble arbeidet i et område som strekker seg fra Kåfjord i Lyngen til Bergmark og Middavarre-feltene i Kvænangen. Arbeidene ble ledet av sjefsgeolog A. Kruse mens R. Kleine-Hering (1970-71) og I. Lindahl (1969-72) fungerte som feltledere for henholdsvis Reisadalen og Vaddas-Rieppe-området, de to feltene hvor de mest omfattende arbeidene ble gjort (Kruse 1974). Den største aktiviteten i området fant sted i tiden 1969-72, og det meste av midlene ble brukt til boringer på strekningen Vaddas-Jiek'kejav'ri (Tegn. 1) og da hovedsakelig i Rieppe.

Ved undersøkelsene i Vaddas-feltet sto også undertegnede for loggingen av borkjernene fra feltet, samt utsplitting av kjerner for analyse. Loggen har hittil kun forligget i håndskrevet utgave, men i løpet av sommeren 1978 ble de skrevet på maskin og analysetall er ført inn på skjemaene. Tolkning av den håndskrevne borkjernelog samt overføring av analyseverdiene fra analysetabellene er gjort av L.T. Alnor og T. Aune og sistnevnte har også administrert arbeidet.

Fra århundreskiftet og fram til midten av 1970-årene er det gjort omfattende undersøkelser i flere perioder i Vaddas-feltet. En oversikt over dette er gitt av Lindahl (1974). For undersøkelsene i Reisadalen-området har Kleine-Hering (1973) sammenstilt de geologiske dataene. Senere har Kruse (1974) vurdert feltene i området samlet og gir samtidig en fullstendig oversikt over rapportene for området i A/S Bleikvassli Grubers arkiv.

Det som her vil bli presentert er en kort oversikt over boringene i Rieppe som var hovedfeltet samt borkjernelog med analyser av kjernene som er bakgrunnsdata for malmberegningen av forekomsten (Lindahl 1974). Det er viktige bakgrunnsdata for en framtidig søknad om utmål på hele Vaddas-Jiek'kejav'ri.

I undersøkelsesperioden 1968-74 ble det gjort boringer i følgende felter i det nevnte området (Lindahl 1974):

1972	Vaddas Gruve	29 hull	88.55 m
1972	Grytlia	2 ³ hull	20.0 m
1972	Loftani	19 hull	467.35 m
1971	Njoammelloalgi	8 hull	161.75 m
1968-71	Rieppe	43 hull	5757.0 m
1971	Jiek'kejav'ri	2 hull	49.75 m

De forskjellige feltene er merket på Tegn. 1.

I denne rapporten er dataene fra borfeltene i Rieppe-feltet sammenstilt. Dataene fra de øvrige feltene er sammenstilt av Lindahl (1978).

BORINGENE I RIEPPE

A/S Norsk Bergverk ved A/S Vaddas Gruber utførte boringer i Rieppe somrene 1954 og 1957. Til sammen ble det i disse to årene boret 16 hull på en samlet lengde av 1917 m (Bilag 1).

I 1968 fikk A/S Bleikvassli Gruber håndgitt rettighetene i feltet og startet samtidig undersøkelser. I 1968 ble det boret ca. 320 m fordelt på to hull (Bilag 1). Boringene fortsatte i et større omfang i 1969 da der ble boret ca. 1782 m fordelt på 6 hull. Undersøkelsene i 1968 og 69 er beskrevet av Lindahl (1969).

I 1970 var det året det ble boret mest i Rieppe-feltet, hele ca. 4280 m fordelt på 22 hull. I 1971 ble det i Rieppe-feltet boret ca. 1244 m, som samtidig var den foreløpig siste sesongen. Detaljert er dette beskrevet av Lindahl (1974).

Ved A/S Bleikvassli Grubers boringer ble det brukt Longyear-maskiner (24" og 34") med wire line system. En Packsack-maskin ble benyttet i Rieppe i 1970 og 1971, en maskintype som ble brukt for første gang i Norge. Oversikt over samtlige boringer i Rieppe-feltet er gitt i Bilag 1. Plotting av borstedene er gjort i Tegn. 2.

Totalt er det inntil idag diamantboret:

A/S Norsk Bergverk	1954 og 1957	1719 m
A/S Bleikvassli Gruber	1968-1971	<u>5757 m</u>
	Til sammen	<u>7476 m</u>

ANALYSEVERDIENE

Lindahl (1974) gjorde en undersøkelse med hensyn til nøyaktigheten av analysene som er gjort av A/S Bleikvassli Gruber hos Bergverksselskapet Nord-Norge, Mo. Resultatet viser en relativt stor variasjon i analyseverdiene ved forskjellige laboratorier (Mo, NTH og Bjørkåsen Gruver) og med forskjellige analysemetoder. Dette er omtalt av Lindahl (1974 s. 2.61 - 2.64). Reanalyse av en del av prøvene burde vært gjort for å få sikre verdier å holde seg til ved malm-beregninger og vurdering av feltet.

For å få et mer inngående kjennskap til malmene i Vaddasområdet henvises til Lindahl (1974) og Kruse (1975).

Trondheim, 28. mai 1979

Ingvar Lindahl
Ingvar Lindahl
førstestatsgeolog

LITTERATURREFERANSER

- Kleine-Hering, R. 1973: "Der geologische Rahmen un die Mineralogie der Pyrit-freien, zinblendeführenden Kupferkies-Magnetkies-Erzvorkommen des Moskodalen, Nordreisa Kommune, Troms, Nord-Norwegen - unter besonderer Berücksichtigung der Moskodal Grube." Dr. Dissertation, Johannes Gutenberg - Universität, Mainz, 116 sider.
- Kruse, A. 1975: Undersøkelse av statens bergrettigheter ved A/S Bleikvassli Gruber i tidsrommet 1968-1974. Rapp. A/S Bleikvassli Gruber, 34 sider.
- Lindahl, I. 1969: Rapport for prospekteringsarbeider i Vaddas-Rieppe-området sommeren 1969. A/S Bleikvassli Gruber, intern rapp., ca. 30 sider + bilag.
- Lindahl, I. 1974: Økonomisk geologi og prospektering i Vaddas-Rieppe-feltet, Nord Troms.
Del I: Geologi og malmgeologi, 175 sider
Del II: Prospektering, 141 sider
Del III: Plansjer
Lic. avhandl. malmgeologi Geol. Inst. NTH.
- Lindahl, I. 1978: Borkjernelog for diamantboring på strekningen Vaddas-Jiek'kejav'ri 1971 og 1972. NGU-rapp. nr. 1650/47A, 6 sider + bilag.

Oversikt over forkortelser som er brukt i borkjerneloggen
i Bilagene 2-5.

Mineraler:

amf - amfibol (itt)
bio - biotitt
cc - kalkspat
cp - kobberkis
fsp - feltspat
gl - glimmer
gn - blyglans
gr - granat
kl - kloritt
kv - kvarts
musk - muskovitt
po - magnetkis
py - svovelkis
sl - sinkblende
t - talk

Bergarter etc.:

b.a. - bergart
fink. - finkornig
gossan - jernhatt
grovk - grovkornet
gø - grønnstein
impr (egn.) - impregnasjon
konk - konkordant
met - metamorfose
middelk - middelkornet
minr - mineralisering
pegm - pegmatitt
sk - skifer
sulf - sulfid(er)
xx - krystaller

Generelle forkortelser:

el - eller
forb - forbindelse
fyll - fylling
innbl - innblanding
innh - innhold
kj.tap - kjernetap
m/ - med
obs - observert,
observasjon
omkr - omkring
pkt - punkt
rel - relativt
sanns - sannsynlig
spr - sprekke
str - størrelse
utsvetn - utsvetning
v - Vaddas
v/ - ved
veksl - vekslende
vesentl - vesentlig

BILAG 1 Oversikt over diamantboringene i Rieppe. Borhull
fra 1954 og 57 har rene tallnr. Borhull med
Longyear-maskiner 1968-71 har nr. etter initiatene
Bh. Paksack-hullene har initialene RP (Rieppe
Paksack). De to siste sifrene er årstall boret.
Alle hullene er plottet på Tegn. 2.

Boringer i Rieppe ved A/S Vaddas Gruber (A/S Norsk Bergverk)
Koordinater på geofysisk stikningsnett (GM-rapport nr. 139,
1955).

Borhull	Retning	Helning	Koordinater	Lengde	Merknad
---------	---------	---------	-------------	--------	---------

1954

Bh 1	Ø	70°	5565 S - 954 V	98.00 m	
Bh 2	Ø	70°	5473 S - 960 V	100.50 m	
Bh 3	Ø	62°	5361 S - 960 V	<u>73.00 m</u>	
Til sammen				<u>271.50 m</u>	

1957

Bh 4	Ø	70°	5565 S - 965 V	113.75 m	
Bh 5	Ø	Lodd	5475 S - 965 V	89.42 m	
Bh 6	Ø	70°	5525 S - 960 V	121.25 m	
Bh 7	Ø	70°	5610 S - 960 V	118.13 m	
Bh 8	Ø	70°	5660 S - 970 V	117.85 m	
Bh 9	Ø	70°	5860 S - 1025 V	136.45 m	
Bh 11	Ø	45°	5910 S - 1040 V	120.55 m	
Bh 12	Ø	70°	5910 S - 1040 V	127.35 m	
Bh 16	Ø	49°	5860 S - 1025 V	113.45 m	
Bh 17	Ø	70°	5710 S - 975 V	29.40 m	Boret ut i dagen
Bh 18	Ø	45°	5710 S - 975 V	68.65 m	Stoppet pga frost
Bh 19	Ø	45°	5660 S - 970 V	93.45 m	
Bh 20	Ø	45°	5610 S - 960 V	<u>97.80 m</u>	
Til sammen				<u>1347.50 m</u>	

Boret til sammen i Rieppe i 1954 og 1957 1619.00 m

Boring 1968 - Rieppe

Borhull	Retning	Helning	Koordinater (Geofys.nett)	Lengde
Bh1-68	Ø	Lodd	6055 S - 1050 V	180.00 m
Bh2-68	Ø	60°	6165 S - 1065 V	<u>139.25 m</u>
			Til sammen	<u>319.25 m</u>

Boring 1969 - Rieppe

Borhull	Retning	Helning	Lengde	Merknader
Bh 1 -69	Ø	60°	379.60 m	
Bh 5A-69	Ø	60°	260.00 m	
Bh 5B-69		Lodd	345.00 m	
Bh 6 -69		Lodd	377.50 m	
Bh 6B-69	Ø	60°	90.00 m	Stoppet pga. fastboring
Bh 6B-69	Ø	60°	<u>330.00 m</u>	
Boret til sammen i 1969:			<u>1782.10 m</u>	

Diamantboringer i Rieppefeltet sommeren 1970.

Maskin	Borhull	Retning	Helning	Lengde
Longyear 34"	Bh 1 -70	Ø	70°	160.00 m
	Bh 1B-70	Ø	70°	150.00 m
	Bh 2 -70	Ø	60°	195.00 m
	Bh 3 -70	Ø	60°	193.00 m
	Bh 3B-70		Lodd	252.10 m
	Bh 4 -70	Ø	60°	202.00 m
	Bh 4B-70	Ø	78°	158.00 m
	Bh 5 -70	Ø	65°	209.00 m
	Bh 5B-70	Ø	79°	230.00 m
	Bh 6 -70	Ø	60°	150.00 m
			Til sammen	<u>1899.10 m</u>
Packsack	RP 1 -70	Ø	60°	50.00 m
	RP 2 -70	Ø	60°	50.00 m
	RP 3 -70	Ø	70°	50.00 m
	RP 4 -70	Ø	60°	50.00 m
	RP 5 -70	Ø	60°	49.40 m
	RP 6 -70	Ø	60°	49.90 m
	RP 7 -70	Ø	60°	42.40 m
	RP 8 -70	Ø	70°	25.10 m
	RP 8B-70		Lodd	34.80 m
	RP 9 -70	Ø	70°	25.00 m
	RP10 -70	Ø	75°	29.70 m
	RP11 -70	Ø	60°	26.40 m
			Til sammen	<u>482.70 m</u>
Totalt boret lengde 1970:				<u>2381.80 m</u>

Diamantboringer i Rieppe sommeren 1971.

Maskin	Borhull	Retning	Helning	Lengde
Longyear:	Bh 1A-71	Ø	50°	81.00 m
	Bh 1B-71		Lodd	94.20 m
	Bh 2A-71	Ø	70°	125.20 m
	Bh 2B-71		Lodd	142.30 m
	Bh 3A-71	Ø	52°	92.30 m
	Bh 3B-71		Lodd	128.70 m
	Bh 4A-71	Ø	50°	124.25 m
	Bh 4B-71	Ø	80°	146.70 m
	Bh 5A-71	Ø	65°	200.00 m
			Til sammen	<u>1134.65 m</u>
Packsack:	RP 1 -71	Ø	70°	33.40 m
	RP 2 -71	Ø	70°	28.00 m
	RP 3 -71	Ø	70°	15.00 m
	RP 4 -71	Ø	70°	34.70 m
			Til sammen	<u>111.10 m</u>
Boret på Rieppe-forekomsten 1971:				<u>1245.75 m</u>

BILAG 2 Borkjernelog med analyser fra boringene i
Rieppe 1968.
Alle hullene er plottet på Tegn. 2.

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1968
 Koordinater : 1050V & 6055S
 Retning :
 Helling/stigning : vertikalt1
 Høyde : 995 moh.
 Lengde : 180 m

Borhull : 1 - 68

Liste over det som skal splittes og bør analyseres.

side 1

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	1,20 - 2,30	1,10	Noe impr.							
"	5,60 - 7,00	1,40	"							
"	9,00 - 9,40	0,40	"							
"	10,60 - 11,60	1,00	"							
"	12,80 - 14,80	2,00	Svak jevn impr. po - cp.							
	32,50		3 cm tykk impr.sone i klorittsk.							
"	37,00 - 37,40	0,40	Klorittsk. med noe impr. <u>po</u> - cp							
	40,26		Noe po i 2 cm bånd							
	43,70		"							
	45,30		"							
	46,50 - 46,80	0,30	Noe po-impr. i sk.							
	48,85 - 49,03	0,18	"							
	51,30 - 51,50	0,20	Noe impr. i sk.							
	51,90 - 52,90	1,00	" i 5 - 10 cm bånd							
"	53,00 - 53,60	0,60	Noe bedre impr. vesentlig po							
"	55,60 - 58,70	3,10	Klorittsk. - foldet med po - cp							
			impr.							
	60,00 - 60,20	0,20	Hydroth. kvarts med po + cp i flekker							
"	60,00 - 60,70	0,70	Noe impr., bl.a. i klorittsk.							
"	62,35 - 62,75	0,40	Noe impr.							
	65,20 - omkr.		Noe po i spr.fyllinger							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1968
 Koordinater : 1050V - 6055S
 Retning :
 Helling/stigning : vertikalt
 Høyde : 955 moh.
 Lengde : 180 m

Borhull : 1 - 68

Liste over det som skal splittes og bør analyseres

side 2

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	67,70 - 67,85	0,15	Bra impr.							
	70,00 - 84,00	14,00	Amf. - gö. med stedvis opptil 20 cm impr.soner							
"	84,85 - 85,60	0,75	Svak impr. i gö.sk. og klorittsk. po, cp							
"	86,80 - 87,70	0,90	Noe impr.							
"	89,20 - 89,50	0,30	Svak impr. po - cp							
"	91,00 - 91,90	0,90	Impr. po - cp							
"	92,30 - 93,40	1,10	Ujevn impr. po - cp							
	93,40 - 96,00	2,60	Gö - amf. og gö.sk.							
"	96,00 - 98,00	2,00	Jevn impr. i foldet tektonisert sk. po og cp							
"	98,00 & 100,20	2,20	"							
	100,00 - 110,00	10,00	Vesentlig talksk. med flekker av py, po og cp i meget svak impr.							
"	112,20 - 114,00	1,80	Bra impr. i talksk., meget foldet po, cp po, cp, sl. Også gö.sk.							
"	116,40 - 117,05	0,65	"							
"	117,52 - 118,10	0,58	Sterkt foldet talkholdig gö.sk.							
	120,00 - 122,00	2,00	Gö. og gö.sk.							
"	122,00 - 122,90	0,90	Svak jevn impr. i gö.sk. - klorittsk. po - cp							

Lokalitet : Rieppe

Dato 1968
Koordinater : 1050V - 6055S
Retning :
Helling/stigning: vertikalt
Høyde : 995 moh.
Lengde : 180 m

Borhull : 1 - 68

Liste over det som skal splittes og bør analyseres.

side 3

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	123,30 - 123,90	0,60	Gö. og gö.sk.							
"	124,50 - 125,50	1,000	Noe impr. i gö.sk.							
"	130,30 - 132,40	2,10	Ujevn impr. i gö.sk.							
"	132,85 - 133,50	0,65	Ujevn impr. po, sl, cp							
"	137,50 - 140,00	2,50	Impr. i "breksje" (?)							
	142,50		2 cm tykt po - bånd							
"	143,40 - 146,00	2,60	Impr. i "brksje" (?) - b.a.							
"	146,00 - 148,00	2,00	"							
"	148,00 - 150,50	2,50	"							
	150,50 - 152,20	1,70	Gö.sk. tilblandet bio.							
	152,20 - 152,50	0,30	"Brksje" impr.(lik forannevnte)							
	153,90		Litt po - impr.							
	152,50 - 156,50	4,00	Gö.sk.							
	156,50 - 158,00	1,50	Gösk. tilblandet cm - tykke lag av gl.sk.							
	158,00 - 160,00	2,00	Gö. med noen sulfidprikker							
"	160,00 - 162,50	2,50	Svak impr. av po, sl (?)							
"	162,50 - 164,50	2,00	"							
	165,30		2 cm po - impr.							
"	165,70 - 169,20	3,50	Noe impr., po, sl (?)							
	169,20 - 180,00	10,80	Gö. uten impr., delvis med fsp.-porfYROBLASTER.							

Lokaltet : Rieppe

Borhull : 2 - 68

Liste over det som er splittet og ferdigpakket. for analyse.

Dato : 1968
Koordinater : 1065V, 6165S
Retning : 0
Helling/stigning : 60°
Høyde : 990 moh.
Lengde : 139,25

side 1

spl.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
6,50 - 6,80 m	0,30	Noe impr.	-						
7,20 - 7,50	0,30	" "		0	0.36	0.08		11.90	
10,80 - 11,30	0,50	po + cp. i klorittisk skifer							
25,70 - 26,70	1,00	Noe impr.		0	0.08	0.08		4.67	
20,00 - 30,00	10,00	Ellers tynne (5-10 cm) bånd med impr. -po og cp.		sp.	0.11	0.02		5.17	
30,40 - 31,50	1,10	cp-po - svak impr.	-						
32,50 - 33,10	0,60	po - cp - svak impr.							
52,50 - 52,80	0,30	po - cp - sl. - svak impr.		0-	0.13	0.02		4.76	
94,70 - 95,60	0,90	Bra impr. cp - po		0-	1.83	3.64		10.00	
97,10 - 98,20	1,10	Noe impr. po - cp.		sp.	1.94	0.05		10.00	
103,40 - 104,30	0,90	Noe impr.	-	sp.	0.38	0.03		12.50	
104,70 - 105,55	0,85	" "		sp.	0.59	0.02		6.70	
105,90 - 107,10	1,20	" "		0	0.18	0.04		5.50	
108,35 - 109,80	1,45	" "		sp.	0.18	0.05		5.90	
-----	----	1 ks. mangler, no.12, 110 - 120 m.							
132,40 & 133,00	0,60	Noe impr.	-						
133,90 - 135,00	1,10	" "		0-	0.01	sp.		2.50	
136,90 - 138,00	1,10	" "		0-	0.03	sp.		3.57	

Bilag 2 - side 1

BILAG 3 Borkjernelog med analyser fra boringene i
Rieppe 1969.
Alle hullene er plottet på Tegn. 2.

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1969

Koordinater :

Retning : Øst

Helling/stigning: 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 1

Borhull : 1 - 69

Kjerne'engder merket spl. er splittet
og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	0,00 - 1,60	1,60	Kjernetap							
	1,60 - 20,00	18,40	Amf.+gö.							
	99,50		Et pkt. med py							
	20,00 - 40,00	20,00	Gö.og amf.							
	40,00 - 41,80	1,80	Kjernetap							
sp.	49,30 - 50,00	0,70	Noe impr. po, <u>cp.</u>		sp.	0.31	0.21		2.47	
	41,80 - 49,30	7,50	Noen steder svak po+impr. i gö.sk.							
	50,00 - 60,00	10,00	Stedvis 3-4 cm tykke po impr. bånd i gö og gö.sk.							
"	62,00 - 62,70	2,70	Svak impr. av vesentlig <u>po</u>		0	0.08	0.02		3.09	
	60,00 - 70,00	10,00	Gö.sk. og gö.							
	70,00 - 90,00	20,00	Gö. og gö.sk.							
	106,30		1 cm. tykt bånd med po (cp)							
"	107,40 - 107,70	0,30	Noe impr., vesentlig po i gö.sk.		0	0.08	0.02		3.62	
"	108,00 - 108,25	0,25	Noe mer po + py i lys sk.							
	110,00 - 120,00	10,00	Uholdig gö.og gö.sk.							
	120,00 - 130,00	10,00	Gö. og amf.gö.sk. opptil cm tykke bånd med hydroth.kv.- meget svak impr.							
	129,25		Cm-tykt bånd med kun po							
"	130,60 - 130,90	0,30	Noe impr. po - cp.		0	0.13	0		4.51	
"	131,40 - 131,60	0,20	" " " "							

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Øst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 2

Borhull : 1 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet
og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	132,50		Noen gr. (2 cm tykk) - gr.amf.							
sp.	136,20 - 136,50	0,30	Noe impr. cp-po i folget sk.		0	0,23	0,01		2,30	
"	140,50 - 140,85	0,35	Ujevn impr. av po							
"	141,50 - 141,85	0,35	" " " "		0	0,29	0,03		4,89	
	142,60		3 cm tykk po-impr.							
"	144,90 - 145,30	0,40	En del impr. po - cp.		0	0,05	0,03		4,05	
	140,00 - 150,00	10,00	Stedvis tykke bånd med uhyre, svak po-impr.							
"	150,40 - 151,40	1,00	Svak impr. i sk.o.a.		0,-	0,07	0,24		4,28	
	152,00 - 152,15	0,15	Grovk.amf. og kv. i forbindelse med dette noe impr.							
"	157,70 - 157,85	0,15	Bra impr. po - cp							
"	163,20 - 163,70	0,50	Bra impr.		0,-	0,12	0,04		5,90	
	163,70 - 164,35	0,65	Grovk. amf.							
"	164,35 - 164,90	0,55	Ujevn impr.							
	165,40 - 165,70	0,30	Uhyre svak impr.							
	166,50		" " "							
	167,40 - 167,70	0,30	Meget ujevn impr.							
	168,00 - 169,00	1,00	Grovk.amf.							
	169,00 - 170,00	1,00	Kjernetap							
"	173,60 - 174,50	0,90	Noe ujevn impr.		0,-	0,18	0,03		4,67	
	170,00 - 180,00	10,00	Tynne bånd med impr., vesentlig av po. - (Ikke verdt analyse?)							

Bilag 3 - side 2

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 3

Borhull : 1 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	180,00 - 180,10	0,10	God impr. <u>po</u> + cp		0.-	0 22	0 10		19.15	
"	183,20 - 185,30	2,10	Ujevn impr.		0.-	0 08	0 03		3 50	
"	185,75 - 186,40	0,65	"							
"	190,00 - 192,00	2,00	50% kjernetap.							
"	192,00 - 193,00	1,00	Noe impr. i lys sk., gö. og kl.- talksk.		0.-	0 15	0 03		3.52	
"	195,70 - 196,70	1,00	Noe ujevn impr., po og cp		0.-	0 12	0 02		4.50	
"	200,00 - 200,30	0,30	Bra impr. <u>po</u> + cp							
"	202,50 - 202,80	0,30	Impr. cp + po		0.-	0 21	0 03		3 83	
"	202,80 - 204,20	1,40	Gö. og gö.sk.							
"	204,20 - 206,40	2,20	Ujevn stedvis bra impr.							
"	206,75 - 207,20	0,45	Ujevn impr. - cp rik		0.-	0 16	0 03		2.25	
"	200,00 - 207,20	7,20	Utenom de splittede lengder er det stedvis impr. i en skifrig gö.b.a. med kv.-utsvetning.							
"	207,20 - 212,90	5,70	Gö. og gö.sk.							
"	212,90 - 213,90	1,00	Grovk. amf. b.a.							
"	215,00 - 215,50	0,50	Ujevn impr., vesentlig po							
"	218,00 - 219,00	1,00	"		0.-	0 08	0 03		3.59	
"	219,50 - 220,30	0,80	"							
"	221,40 - 221,70	0,30	Noen mm - tykke bånd med po i gö.- sk.							

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Øst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 4

Borhull : 1 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	222,80 - 224,00	1,20	Ujevn impr. av vesentlig po		0.-	0.22	0.02		4.87	
	224,40 og									
	224,70 - 224,90		Gr.amf.							
	224,80 - 225,00	0,20	Tynn impr. av po - cp							
"	227,50 - 228,70	1,20	Ujevn impr.		0.-	0.09	0.01		3.92	
	231,70		Litt po i forbindelse med hydroth. kv.							
	232,20		Cm - tykt lag med po i uholdig gö. b.a.							
"	233,00 - 233,80	0,80	Ujevn impr., vesentlig po							
"	234,40 - 234,60	0,20	" , po + <u>cp</u>		0.-	0.26	0.03		6.70	
"	235,20 - 236,00	0,80	" , <u>po</u> + cp, en skifrig gö.b.a.							
	240,80 - 241,15	0,35	Uhyre tynn po-impr.							
	243,50		Cm - tykk impr. av po							
"	246,75 - 247,40	0,65	Ca. 246,90: cp - rik impr., ellers tynn po - cp impr.		0.-	0.51	0.02		4.17	
	248,00 - 249,00	1,00	Kjernetap							
"	251,00 - 251,60	0,60	En del impr., po + <u>cp</u>		0.-	0.24	0.02		4.67	
	252,20		5 cm tykk impr.sone med cp - po							
"	256,30 - 259,00	2,70	Meget svak og jevn impr. i en lys kl. - talksk. b.a.		0.-	0.06	0.13		2.89	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 5

Borhull : 1 - 69

Kjermelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m.
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	259,00 - 260,00	1,00	Massiv gö.							
	260,90 - 262,80	2,10	Svak jevn impr. i gr.kl.sk. + meget små gr., <u>cp</u> - po		0.-	0.63	0.03		4.84	
"	263,00 - 264,80	1,80	-----"-----		0.-	0.15	0.04		3.92	
	266,80 - 267,60	0,80	Gr. amf. og kl.sk. Noen få sulfidkorn.							
	273,40 - 273,80	0,40	Noe po-impr., sans. uten betydning.							
	277,30		½ cm tykt sl - po impr. bånd.							
	278,00 - 278,25	0,25	Noen spr.fyllinger av kun po							
	270,00 - 280,00	10,00	Uhyre svak po-impr. Øgså andre steder. Gö. og gö.sk.							
"	280,00 - 280,70	0,70	Innblanding av gl.sk. i gö.sk.							
	282,40 - 282,90	0,50	Svak po - impr. i lys kl. - talkholdig sk.		sp.	0.07	0.95		4.34	
	283,50 - 284,20	0,70	Innblanding av cm - tykke gl.sk.-lag i gö.(sk.) (gl. = bio.)							
	288,50		Cm - tykt gl.sk.-lag.							
	289,00 - 300,00	11,00	Innblanding av cm - tykke gl.sk.-lag i gö.(sk.) (gl. = bio.)							
	286,50 - 286,80	0,30	Lys sk. med uhyre svak impr.							
	2290,00-290,50	0,50	Mange gl.sk.-lag (cm - tykke) i gö.sk.							

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Øst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 6

Borhull : 1 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	291,40		Litt po-impr.							
	295,05 - 295,95	0,90	Svak po - sl - impr. i lys foldet sk.		0.0	0.13	0.36		4.76	
	290,00 - 295,00	5,00	Noen steder små pkt. av po							
	296,50 - 300,50	4,00	Rel. grovk. amfibolittisk gö. med spr.fyllinger av po							
"	300,50 - 302,20	1,70	En del impr. i lys grovk. gö.		0 -	0.03	0.23		3.17	
	302,20 - 304,20	2,00	Grovk. amf. (metagabbro ?)							
"	omkring 303,30		Noe po							
	306,25 - 307,50	1,25	Svak impr. i talk-b.a. En lys b.a. med store (cm) amfibol-nåler. Stedvis gr.		sp	0.02	0.04		3.98	
"	307,70 og 308,30	0,60	Noe po							
	300,00 - 310,00	10,00	Kasse 31 er ikke merket og retningen på kjernen er <u>antatt</u> etter b.a. overgangene til kasse 30 og 32.							
	310,30-310,70	0,40	Noe impr. po - cp		0 -	0.04	0.22		3.34	
	311,00 - 320,00	9,00	Gö. og gö.sk. med innblanding av opptil 5 cm tykke gl.sk.-lag.							
"	315,50 - 316,00	0,50	Noe impr. i foldet gö.sk.							
	320,05		½ cm tynt po-bånd.							
	320,00 - 328,30	8,30	Nær steril gö.							

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Øst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 7

Borhull : 1 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	328,50 - 330,00	1,50	Svak impr. i talk - kl.sk. (lys)		0 -	0 11	0 55		4.34	
"	330,00 - 333,00	3,00	Jevn - noe tynn impr. i foldet, lys, bløt talk - kl.sk.		0 -	0 10	0 05		4.00	
"	333,00 - 336,00	3,00	---- " ----		sp.	0 13	1.08		6.70	
"	336,00 - 337,50	1,50	---- " ----		sp.	0 08	0 48		4.13	
"	338,10 - 340,00	1,90	---- " ----		0 -	0.09	0 75		5.00	
"	340,60 - 342,90	2,90	Impr. i lys gö., talk og kl.sk.		sp.	0.21	0.86		6.40	
	343,80		Litt impr. - po							
"	344,50 - 346,00	1,50	Noe impr. i lys sterkt foldet sk. po + cp		0 -	0.12	0 30		7.00	
	347,00 - 348,00	1,00	Grovk. amf.							
	348,15 - 348,95	0,80	Spr.fyllinger med po							
"	349,40 - 350,00	0,60	En del bra impr.		0 -	0.63	0.66		10.00	
	350,00 - 351,00	1,00	Lys skifrig gö. med kl. + talk.							
	351,00 - 353,50	2,50	Grovk. amf.							
"	353,80 - 354,50	0,70	Bra impr. po - cp - sl		0 -	0.15	1.19		10.00	
"	355,70 - 358,00	2,30	En del impr. po, cp, sl, i skifrig b.a. med talk + kl. - foldet.		0 -	0.04	0.30		3.92	
"	358,00 - 360,00	2,00	Jevn tynn impr. i skifrig b.a. med talk + kl. - foldet.		0 -	0.03	0.15		3.17	
"	360,70 - 363,00	2,30	Jevn tynn po-impr. (vesentlig) i kl.sk. og gö.sk. b.a.		0 -	sp.	0.02		3.50	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 379,60 m

side 8

Borhull : 1 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	366,60 - 367,25	0,65	Svak po-impr. i sk.		0.-	0 02	0 02		2.75	
	omkring 365,60		20 cm bånd med impr. <u>po</u> + cp.							
	367,30 - 368,70	1,40	Grovk. amf. med spr.fyllinger av kv. - fsp., noe po							
	368,70 - 377,10	9,20	Gö. og gö.sk.							
"	377,10 - 378,60	1,50	Po - impr., noe cp		0.-	0 04	0 22		4.83	
	370,00 - 379,60	9,60	Noe meget tynn po-impr. i vekslende gö.b.a.							

side 3 - side 8

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Borhull : 5A - 69

Retning : 0st

Helling/stigning : 60°

Kjernelengder merket sp. er splittet
og ferdigpakket for analyse

Høyde : 995 moh

Lengde : 260 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 10,00	10,00	Gö. og gö.sk - synlige amfibol- nåler, noe delvis forvitret po	70-90°						
10,00 - 20,00	10,00	Amf. - gö.- sk. - delvis synlige fsp. - porphyroblaster. Lokalt svak sulfidimpr.							
20,00 - 30,00	10,00	" " " " " " " "							
30,00 - 40,00	10,00	Gö. - gö.sk. - amf. Utyre liten impr.							
40,00 - 50,00	10,00	Gö. - gö.sk. og amf. Utyre liten impr.							
50,00 - 54,00	4,00	" " " " " " " "							
54,00 - 59,00	5,00	tydelig impr. gö. - gö.sk. - amf.		sp	0.03	0.02		1.33	
59,00 - 59,50	0,50	Gö.		0 -	0.03	0.02		1.52	
59,50 - 62,25	2,75	"sterk" men uregelmessig impr., mest po, dessuten py + spor av cp, Gö. og gö.sk og amf.		0 -	0.05	sp.		1.83	
62,25 - 63,35	1,10	Gö. uten impr.		0 -	0.03	0.05		1.84	
63,35 - 67,20	3,85	Svak impr. på konk.flater - gö. og gö.sk.		0 -	0.04	0.02		2.34	
67,20 - 70,20	3,00	Noe bedre impr. gö. og gö.sk. Ved 68,50 en gr.amf.		0 -	0.05	sp.		1.67	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Borhull : 5A - 69

Koordinater :

Retning : Öst

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 260 m

side 2

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	70,20 - 75,50	2,30	Gö. - gö.sk. "uten" impr.							
	75,50 - 76,00	0,50	Noe bedre impr.		0.-	0.13	0.06	-	4.17	
	76,00 - 78,10	2,10	Nesten ingen impr., gö. og gö.sk.							
"	78,10 - 78,30	0,20	Bedre impr. i gö. og gösk.b.a., cp + po		0.-	0.20	sp		3.42	
	78,30 - 79,00	0,70	Gö. og gö.sk.	ikke anal.						
"	79,00 - 79,40	0,40	Sterk impr., po og cp							
	79,40 - 80,00	0,60	Gö. - gö.sk., meget svak impr., cp + po							
"	80,00 - 81,00	1,00	Noe impr. i gö. + gö.sk., cp, po, py		0.-	0.34	0.03		2.81	
	81,00 - 82,30	1,40	Gö. - gö.sk. og amf.							
"	82,30 - 83,50	1,30	Bra impr., mest po og cp, men også py		0.-	0.22	0.02		10.05	
	83,50 - 84,00	0,50	Meget tynn impr.							
"	84,00 - 84,40	0,40	Svak impr.							
	84,40 - 85,00	0,60	Meget svak impr., vesentlig po	ikke anal.	0.-	0.66	0.-		4.64	
"	85,00 - 86,00	1,00	Noe impr.							
"	86,00 - 90,50	4,50	Meget tynn po-impr. i gö. og gö.sk.							
"	90,50 - 91,00	0,50	Noe impr.							
	91,00 - 92,10	1,10	Gö. og gö.sk.							
"	92,10 - 93,40	1,30	Noe po-impr. i gö. og gö.sk. (+ cp)							

Blind 3 - 4

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Øst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 260 m

side 3

Borhull : 5A - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	93,40 - 94,00	0,60	Gö. og gö.sk.							
	94,00 - 100,00	6,00	Noe impr., vesentlig po (I to eller tre poser?)							
"	100,00 - 101,50	1,50	Gö. og gö.sk.							
	101,50 - 103,30	1,80	Noe impr., vesentlig po		0-	0 09	0 02		3 42	
"	103,30 - 106,30	3,00	Gö. og gö.sk.							
	106,30 - 106,50	0,20	En del impr.							
"	106,50 - 107,50	1,00	Gö. og gö.sk.		0-	0 05	0 01		2 39	
	107,50 - 107,70	0,20	En del impr., po + cp							
analyseintervallen	94,00 - 96,00				0-	0 19	0 06		3 84	
	96,00 - 98,00				0-	0 04	0 03		3 17	
	98,00 - 100,00				0-	0 05	0 02		3 50	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 260 m

side 4

Borhull : 5A - 69

Kjernelengdene er logget og de som er merket
spl. bør splittes og analyseres.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	110,00 - 115,90	5,90	Gö. med uhyre svak impr., po							
	115,90 - 116,60	0,70	Noe bedre impr. i en mer skifrig b.a., po + cp							
"	116,60 - 117,00	0,40	Massiv gö.							
	117,00 - 117,40	0,40	Noe ujevn impr., po, cp i sk.b.a.							
	117,40 - 118,00	0,60	Gö.sk. med impr.-flekke av po							
	118,00 - 121,30	3,30	Massiv rel. grovk. gö.							
"	121,30 - 127,20	5,90	Vekslede meget svak impr. i vekslede gö.b.a.							
	127,20 - 128,60	1,40	Kl. - talksk. med jevn impr., po + cp							
	129,30		10 cm mektig svak po - cp-impr.							
	129,75 - 130,00	0,25	Litt impr., po + cp i lys kl.sk.							
	127,20 - 130,00	2,80	Utenom impr. som beskrevet foran er bergarten en gö.							
	130,00 - 130,60	0,60	Massiv gö.							
	130,60 - 131,40	0,80	Ved 136,60 meget cp-rikt bånd. Ellers ujevn impr.							
	131,40 - 132,85	1,45	Gö.							
"	132,85 - 134,60	1,75	Ujevn impr., - po + cp Ved 133,60 et 5 cm tykt gr.amf.-bånd							

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning : Ost

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 260 m

side 5

Borhull : 5A - 69

Kjernelengdene er logget og de som er merket
spl. bør splittes og analyseres.

sp.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
134,60 - 140,00	5,40	Til dels grovk.gö. med fsp.-por- fyroblaster							
139,60		Et 5 cm mektig po-impr.-bånd.							
140,00 - 150,00	10,00	Vekslende gö., delvis med tynne svakt po-impr. bånd							
146,30		Gr. inf.							
150,00 - 150,60	0,60	Svakt impr. gö.sk.							
150,60 - 158,60	8,00	Vekslende gö., uten nevneverdig impr.							
158,60 - 159,50	0,90	Rel. jevn impr., vesentlig po i gö. og gö.sk., delvis klorittisk.							
159,60 - 162,50	2,90	Vekslende gö., stedvis med svak po-impr.							
162,50 - 174,00	11,50	Grovk. gö. med fsp - porfyroblas- ter.							
174,00 - 176,40	2,40	Vekslende gö og gö.sk. uvesentlig impr.							
176,40 - 178,20	1,80	Vekslende impr. i gö.-kl.sk., po + cp.							
178,20 - 179,20	1,00	Svak impr., po + cp i gö. og kl.sk.							
179,70 - 180,20	0,20	Noe impr.							
180,45 - 182,00	1,55	Rel. pen po + cp impr. i foldet kl.sk.b.a - Breksje?							

Stasjon : Rieppe

Dato : 1969

Koordinater :

Retning : Ost

Helling/svingning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 260 m

side 6

Borhull : 5A - 69

Kjernelengdene er logget og de som er merket
spl. bør splittes og analyseres.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	182,00 - 182,70	0,70	Rel.pen <u>cp</u> + po impr i foldet kl.sk.b.a. - breksje?							
"	183,20 - 184,10	0,90	Vekslende svak impr., po + cp i foldet kl.sk.b.a. - breksje?							
	184,10 - 184,70	0,60	Gr.kl.sk.							
	184,50		Et cm-tykt pent cp-bånd.							
	184,70 - 189,00	4,30	Vekslende gö. og gö.sk. med ubetydelig impr.							
"	189,00 - 190,10	1,10	Svak impr. i talk-kl.sk.b.a., po + <u>cp</u>							
	190,10 - 193,80	3,70	Gö. og gö.sk.							
"	193,80 - 197,00	3,20	Kl.sk. (talkig) med jevn tynn po (cp) - impr.							
	197,00 - 199,00	2,00	----- " -----							
	199,00 - 202,00	3,00	Gö. og gö.sk. med ubetydelig po & impr.							
	202,00 - 205,80	3,80	Grovk. gö.b.a. (metagabbro?)							
	205,80 - 207,00	0,70	Svak impr. i foldet kl.sk.							
	208,00 - 214,30	6,30	Gö. Vekslende fra massiv til en gö.sk. Stedvis svak impr.							
	214,30 - 220,00	6,60	Gö.sk. med soner av meget svak impr.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1969

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 260 m

side 7

Borhull : 5A - 69

Kjernelengdene er logget og de som er merket
spl. bør splittes og analyseres.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	220,90 - 223,50	2,60	Sterkt tektonisert po-impr. b.a. En talk-kl.sk.							
"	223,50 - 225,40	1,90	----- " -----							
"	225,40 - 225,70	0,30	----- " -----							
	225,70 - 228,20	2,50	Vekslende gö., stedvis impr., vesentlig av po							
"	228,20 - 229,85	1,65	Svak impr. i gö.sk., foldet							
	229,85 - 230,50	0,65	Gö.sk.							
	230,50 - 232,40	1,90	Kjernetap.							
	232,40 - 238,40	6,00	Gö. og gö.sk., stedvis med opptil 10 cm mektige impr.-bånd, mest po							
"	238,40 - 238,50	0,10	Impr.av po + <u>sl</u>							
	238,50 - 252,00	13,50	Gö., nær "steril" for sulfider.							
	252,00 - 252,70	0,70	Grovk. amf.							
	252,70 - 254,00	1,30	Gö.							
	254,00 - 260,00	6,00	Vekslende gö.sk. og gl.sk.							

Blad 3 - 143

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Borhull : 6 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 377,50 m

side 1

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	0,00 - 10,00	10,00	Gö. - gö.sk., svakt amfibolittisk.							
	10,00 - 37,40	27,40	Samme b.a. - et par flekker med po							
	37,40 - 37,80	0,40	Impr. - noe cp og po							
	37,80 - 53,40	15,60	Gö. med ubetydelig impr.							
	53,40		1 cm impr. i konk. lag, po og cp	} ikke analysert						
	53,40 - 58,20	4,30	Ubetydelig impr.		0.-	0.30	0.02		3.83	
"	58,20 - 58,40	0,20	Tynne cp - po - bånd							
	61,50		Cp, men bare på et pkt.							
	65,60		Litt cp i små pkt.							
	58,40 - 74,30	15,90	Gö. med ubetydelig impr.							
"	74,30 - 74,60	0,30	Svak impr., vesentlig po							
"	79,40 - 79,80	0,40	Svak impr. cp + po		0.-	0.06	0.05		2.68	
"	81,10 - 81,50	0,40	Impr., po + cp							
"	85,50 - 86,20	0,70	Impr., <u>cp</u> + po		0.-	0.37	spor		3.88	
"	94,70 - 97,40	2,70	Ujevn impr. po - cp		0.-	0.08	spor		3.50	
"	98,90 - 99,80	0,90	Ujevn impr. i foldet gö.sk.		0.-	0.06	0.03		2.87	
	104,00 - 105,00	1,00	Meget svak po-impr.							
"	105,50 - 106,50	1,00	Svak impr., po og cp							
"	107,40 - 107,70	0,30	Noe impr., <u>po</u> , cp		0.-	0.14	0.04		4.22	
	108,50		Meget svak impr.							
	111,70		3 cm impr. av po + <u>cp</u>							
	114,00 - 116,00	2,00	1,5 m kjernetap							

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Borhull : 6 - 69

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 377,50 m

side 2

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	117,60		5 cm po-impr.							
spl.	118,90 - 119,20	0,30	Sterk po - cp impr.		0.-	0.56	sp.		23.40	
"	120,70 - 123,00	2,30	Ujevn, delvis bra impr.		0.-	0.27	0.02		3.37	
	123,60		2 cm po - cp impr.							
"	124,70 - 126,40	1,70	Ujevn impr., rel. mye cp		0.-	0.27	sp.		3.76	
"	126,55 - 127,00	0,45	Ujevn impr., po - cp	}	0.-	0.04	sp.		1.49	
"	127,00 - 129,00	2,00	--- " ---							
"	129,00 - 130,00	1,00	--- " ---		0.-	0.25	0.04		3.00	
"	131,40 - 132,60	1,20	Rel. svak impr. (131,00 - 131,40 er også tatt med i analyseposen ved et feiltak. Her er det nær "ste- ril" gö. og gö.sk.)		0.-	0.08	0.03		2.79	
	133,50 og 134,05		3 cm po-impr.							
"	134,50 - 134,80	0,30	Noe impr.	}	0.-	0.09	0.05		1.97	
"	135,50 - 137,20	1,70	Ujevn impr., po + cp							
"	137,50 - 137,80	0,30	Impr., po + cp							
"	138,00 - 138,70	0,70	Svak impr., vesentlig po	}	0.-	0.19	0.04		4.91	
"	139,10 - 140,00	0,90	Rel. svak impr.							
	142,30 og 142,70		Mm - tykke bånd med po - (cp)							
"	144,40 - 144,70	0,30	Impr., cp + po	}	0.-	1.15	0.04		3.17	
"	145,40 - 145,80	0,40	"							
"	148,60 - 149,30	0,70	Ujevn impr., po + cp		sp.	0.07	0.04		2.84	
"	150,10 - 151,20	1,10	Svak impr., po, cp		0.-	0.06	sp.		2.04	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Borhull : 6 - 69

Koordinater :

Retning : Öst

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 377,50

side 3

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl.	151,50 - 152,40	0,90	Svak impr., po + cp							
"	152,90 - 153,10	0,20	"		0 -	0.08	sp.		4.11	
	153,60 - 154,05	0,45	Ujevn svak po-impr.							
"	154,40 - 154,70	0,30	Impr., po + cp							
	155,70		Litt po		0.-	0.06	sp.		3.25	
"	156,40 - 156,70	0,30	Ujevn impr., po - cp							
	157,50		Litt po + <u>cp</u>							
"	159,10 - 159,80	0,70	Ujevn impr., <u>po</u> - cp		0.-	0.24	sp.		2.46	
"	160,10 - 160,25	0,15	Impr. av <u>po</u> + cp							
"	160,80 - 163,00	2,20	Ujevn rik <u>cp</u> - po impr.		sp	0.22	0.02		9.70	
"	163,00 - 164,20	1,20	Ujevn po - cp impr.		0.-	0.26	0.02		3.00	
	165,15		Litt po							
	165,15 - 166,00	0,85	"Steril" gö.							
"	166,00 - 167,70	1,70	Ujevn liten impr. (Ved en feiltakelse er det tatt kjerne til prøveposen fra 165.00 - 167,70. Det vil si en meter av nær "steril" gö.)		0.-	0.05	0.02		2.08	
	167,70 - 168,90	1,20	Gö. og gö.sk.							
"	168,90 - 169,70	0,80	Ujevn svak impr. av cp + <u>po</u> (Ved en feiltakelse er også lengden 168,00 - 168,90 kommet med i prøveposen.)		0.-	0.05	0.-		1.84	

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1969

Koordinater :

Borhull : 6 - 69

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

Høyde : 995 moh.

Lengde : 377,50 m

side 4

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	ca. 171,80		Litt po - cp - impr. i 5 cm tykk sone							
	170,00 - 180,00	10,00	Noen steder mm-tykke bånd av po i gö. og gö.sk.							
	180,00 - 189,00	9,00	----- " -----							
spl.	189,00 - 191,00	2,00	Jevn impr. i skifrig kl.-talkholde b.a., po + cp (Ved en feiltakelse er denne prøveposen blitt å inneholde kjernelengden <u>188,00 - 190,00</u> . Lengden 188,00 - 189,00 har bare meget lite sulfider (se ovenfor))		0.-	0.15	0.-			3.67
					0.-	0.13	0.07			3.4
"	191,00 - 193,20	2,20	Jevn svak cp - po - impr. i lys kl.sk.b.a. (+talk). (Ved en feiltakelse inneholder denne prøveposen lengden <u>190,00 - 193,20</u>)		0.-	0.12	0.12			3.00
	193,20 - 194,40	1,20	Gr.amf.sk.							
	194,40 - 195,00	0,60	Gö.sk.							
"	195,00 - 195,35	0 0,35	Sterk cp - po-impr. (Ved en feiltakelse er lengden <u>194,00 - 195,35</u> med i prøveposen, altså 1 m gö. og gö.sk. sammen med 35 cm rik impr.)		0.-	0.99	0.16			7.70

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Borhull : 6 - 69

Koordinater :

Retning : Øst

Kjerneleſgder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 377,50 m

side 5

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	195,85 - 195,80	0,45	Gr.amf. til kl.sk.							
	195,80 - 197,00	1,20	--- " --- cp + po på spr. parallell kjernen.							
spl.	199,00 - 199,80	0,80	Svak po-impr.							
"	201,20 - 201,80	0,60	"		0.-	0.08	0.47		4.42	
"	202,20 - 202,75	0,55	"							
"	203,75 - 204,70	0,95	" + sl + cp		0.-	0.13	1.04		4.42	
	204,70 - 210,00	5,30	Noe svak po-impr.							
	212,20 - 214,00	1,80	Fsp.-utsvetninger i gö.							
	214,00 - 220,00	6,00	Gö.							
"	222,40 - 224,00	1,60	Svak impr. i lys talk& kl.sk.		0.-	0.02	0.02		2.00	
"	225,00 - 226,50	1,50	Svak po + cp impr.		0.-	0.09	0.30		3.34	
	220,00 - 228,00	8,00	Vekslende lys kl.sk.							
	227,50 - 228,00	0,50	Meget svak po-impr.							
"	229,00 - 229,70	0,70	Noe po-impr.		0.-	0.04	0.16		3.84	
"	230,00 - 233,00	3,00	Svak og jevn po-impr.		0.-	0.08	0.43		3.67	
"	236,70 - 238,60	1,90	"		sp.	0.05	0.14		1.42	
	230,00 - 240,00	10,00	Ellers meget svak po-impr., sans. uten betydning.							
"	243,50 - 244,60	1,10	Jevn po-impr. i lys sk.b.a. (kl. + talk&holdig)		0.-	0.04	0.43		4.50	

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1969

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Høyde : 995 moh.

Lengde : 377,50

Borhull : 6,- 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

side 6

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	240,00 - 250,00	10,00	Noe sulfid-impr., også py-krystal- ler på spr. B.a. er en gö.							
	250,00 - 260,00	10,00	Noen steder svak po-impr. Best mellom 252,40 og 253,50. (Ikke verdt analyse ?) Gö. og amfibolittisk gö.sk.							
sp ¹ .	260,00 - 260,50 264,50	0,50	Noe po-impr. 5 cm po-impr.		0 -	0 02	0 12			2.50
	260,00 - 270,00	10,00	Meget svak po-impr. i gö. og gö.sk. (Utenom det som ellers er beskrevet)							
	270,00 - 280,00	10,00	Noen steder litt po-impr. i gö. og gö.sk.							
"	275,50 - 276,30	0,80	Noen gl.-rike lag.							
"	280,00 - 282,80	2,80	Ujevn impr., po, sl og cp		0 -	0 04	0 06			2.43
"	283,10 - 285,30	2,20	Svak ujevn impr., po vesentlig		0 -	0 01	0 02			2.84
"	285,30 - 290,00	4,70	Meget svak po-impr.							
"	295,00 - 295,15	0,15	Noe po		0.18	0.10	0.13			4.83
	290,00 - 297,00	7,00	Gö. og gö.sk.							
	297,00 - 300,40	3,40	Massiv grovk. amf.b.a. Amfibol- nåler i en grunnmasse, metagabbro(?)							
	300,40 - 308,10	7,70	Gö. med uhyre svak po-impr.							
	308,10 - 311,20	3,10	Kjernetap.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/siktning : vertikalt

Høyde : 995 moh.

Lengde : 330 m

side 1

Borhull : 6B - 69

KjerneleNGder merket spl. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	0,00 - 2,00	2,00	Kjernetap							
	2,00 - 2,00	2,00	Gö.							
	4,00 - 10,00	6,00	Gö.sk. En del kjernetap - noe impr. po - (cp)							
	10,00 - 35,20	15,20	Gö. og gö.sk. - ingen impr.							
	35,20 - 37,30	2,10	Kjernetap							
	37,30 - 69,40	32,10	Gö. og gö.sk uten eller med ubetydelig impr.							
sol.	69,40 - 69,60	0,20	Svak impr. po - cp		0.10	0.14	0.49		4.50	
	71,50		Om-tykt bånd med po - cp impr.							
	78,30		" " " " " "							
	78,60		" " " " " "							
	69,60 - 80,00	10,40	Gö. og gö.sk., delvis amfibolittisk.							
	82,60		3 cm tykk sone med po-impr.							
"	88,50 - 89,60	1,10	Ujevn impr. av po - cp i gö.sk.		0.-	0.11	0.02		2.34	
	91,40		Pkt. med po - cp							
"	95,50 - 95,85	0,35	Ujevn impr.		0.-	0.07	0.09		3.34	
	90,00 - 106,60	16,60	Begynnedde svak po - (cp) impr., da først og fremst i den skifrige gö.b.a.							
"	106,60 - 106,80	0,20	En del po-impr.		sp.	0.09	0.07		5.00	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Borhull : 6 - 69

Koordinater :

Retning : Öst

Helling/stigning : 60°

Kjernelengder merket sp^l. er splittet og ferdigpakket for analyse.

Høyde : 995 moh.

Lengde : 377,50 m

side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
313,70 - 314,75	1,05	Noe po							
311,00 - 320,00	9,00	Tynn po-impr. i gö. og gö.sk.							
316,40 - 316,90	0,50	Massiv b.a. med fsp.-porfyroblaster.							
318,10 - 318,30	0,20	Mel'kekv.							
319,50 - 320,00	0,50	Kl.sk.							
324,40 0g									
326,25 - 326,50	0,25	Noe po-impr.							
320,00 - 330,00	10,00	Noen få steder po-impr. i gö. og gö.sk.							
334,40 - 336,70	2,30	Ujevn vesentlig po-impr., også litt cp							
330,00 - 340,00	10,00	Uhyre svak po-impr. i gö., gö.sk. 0g amf.							
340,00 - 341,90	1,90	Kjernetap.							
341,90 - 346,70	4,80	Gö.sk. med gl.sk.-innblanding							
346,70 - 350,00	3,30	Gö. og gö.sk.							
349,85		En flekk po							
350,00 - 360,00	10,00	Vekslende gö. og gö.sk. Uhyre svak po-impr. (ikke verdt analyse)							
357,00 - 358,50	1,50	Grovk. amf. Uhyre svak po-impr.							
360,00 - 377,50	17,50	Vekslende gö. og gö.sk. Meget svak impr.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : vertikalt

Høyde : 995 moh.

Lengde : 330 m

side 2

Borhull : 6B - 69

Kjernelengder merket sp¹. er splittet og ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	106,80 - 112,85	6,05	Gö. og gö.sk., delvis uhyre svak po-impr.							
	112,50		Ekstra mye po							
sp ¹ .	112,85 - 114,60	1,75	Ujevn po-impr. delvis lys foldet kl.sk.	.	0 -	0.14	0.-		3.20	
"	118,40 - 119,00	0,60	Noe po + <u>cp</u> delvis lys foldet kl.sk.		0.-	0.05	0.04		3.14	
"	120,00 - 130,00	10,00	Noen steder (pkt) med svak impr., delvis talk og kl.sk. prøve 126.20-126.70		0.-	0.10	0.04		6.80	
"	132,00 - 132,25	0,25	Noe po-impr.							
"	137,60 - 138,00	0,40	Noe po + cp-impr.		0 -	0.15	0.02		2.59	
"	139,10 - 140,00	0,90	Svak po-impr.							
"	143,70 - 144,50	0,80	Ujevn, delvis svak po + cp-impr.		0 -	0.09	sp.		2.0	
"	145,40 - 145,60	0,20	Ujevn, delvis svak po + cp - impr., noe gr.amf.							
"	145,90 - 148,25	2,35	<u>cp</u> + po i ujevn impr., noe gr.amf.		0 -	0.18	0.02		5.90	
	140,00 - 150,00	10,00	Stedvis, utenom splittede del, også meget svak po-impr. Den er spredt med mm-tykke bånd.							
"	150,10 - 150,70	0,60	En del impr.		0.-	0.08	0.04		2.42	
"	152,00 - 152,50	0,50	Svak impr. po + <u>cp</u>							
"	153,60 - 154,10	0,50	En del impr. po + <u>cp</u>		sp.	0.16	0.02		2.80	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 6B - 69

Helling/utløsing : vertikalt

Kjerne'engder merket sp¹. er sp¹ittet og

Høyde : 995 moh.

ferdigpakket for analyse.

Lengde : 330 m

side 3

sp¹.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
150,00 - 155,60	5,60	Gö. og gö.sk.							
155,60 - 156,60	1,00	Grovk. amf.b.a.							
156,60 - 160,50	3,90	Gö. og gö.sk.							
160,50 - 160,80	0,30	Svak po-impr.		sp.	0.09	0.18		2.83	
162,60 - 162,90	0,30	Svak po + cp impr.							
164,75 - 165,40	0,65	Ujevn impr., po + cp		0.-	0.24	sp.		2.50	
166,20 - 167,00	0,80	Noe impr. spesielt bra ved 166,70		0.-	0.55	0.03		4.50	
167,00 - 169,20	9,20	Gö. og gö.sk en del kl.sk.							
169,20 - 170,40	1,20	Grovk. amf.							
170,40 - 171,50	1,10	Noe impr. po + cp		0.-	0.16	0.02		5.00	
171,50		Gr.amf.							
172,40 - 172,60	0,20	po + cp-impr.							
173,10 - 174,15	1,05	Ujevn impr., cp + po		0.-	0.10	sp.		3.17	
177,15 - 178,00	0,85	Ujevn impr., po + (cp)							
179,25 - 179,90	0,65	Bra impr., cp + po		0.-	0.63	0.02		4.87	
180,30 - 181,00	0,70	Noe ujevn impr. cp + po							
181,50		Gm-tykk po-impr.							
182,00 - 182,60	0,60	Tynn impr., po + cp							
182,90 - 183,70	0,80	Noe impr., po + cp		0.-	0.21	sp.		4.09	
184,40 - 184,70	0,30	Lite mektig impr.							
186,90 - 187,50	0,60	Ujevn impr.		0.-	0.46	0.02		4.84	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : vertikalt

Høyde : 995 moh.

Lengde : 330 m

side 4

Borhull : 6B - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og
ferdigpakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
spl	187,25		Gr.amf.							
	189,40		En flekk po + cp							
	198,50 - 199,15	0,65	Cp + po-impr., stedvis bra.		0.-	0.52	0.03		4.09	
	190,00 - 200,00	10,00	(utenom splittet) Stedvis meget tynn impr. av po							
	200,90		4 cm impr.-bånd							
"	205,50 - 207,00	1,50	En del impr. i talk og kl.sk.		sp.	0.17	0.02		3.83	
"	207,00 - 208,65	1,65	Kl.sk med impr.		sp.	0.10	0.05		3.67	
	203,00 - 204,00	1,00	Grovk. amf.							
	210,00 - 219,80	9,80	Gö. og gö.sk., delvis amf. Uhyre svak impr.							
	219,80 - 220,00	1,20	Melkekv.							
"	224,50 - 225,00	0,50	Svak impr.							
	224,20 - 224,50	0,30	Gr. amf.							
	225,80 - 227,70	1,90	Vekslede gr.amf. { ikke analysert		0.-	0.26	0.23		8.35	
	226,95		Mm-tykt bånd med po							
"	228,85 - 229,30	0,45	En del impr.							
	229,70 - 230,00	0,30	Gr.amf. + kl.sk.							
	230,50 - 231,60		Små ep-flekker i ellers uholdig gö.							
"	233,00 - 233,65	0,65	En del po + cp-impr.							
"	234,10 - 234,70	0,60	Ujevn impr., po + cp		sp.	0.06	0.12		4.05	
"	236,40 - 237,25	0,85	Ujevn impr., po + cp		0.-	0.06	0.40		9.93	

Lokalitet : Rieppe

Dato 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : vertikalt

Høyde : 995 moh.

Lengde : 330 m

side 5

Borhull : 03 - 69

Kjernelengder merket spl. er splittet og
ferdigoakket for analyse.

	Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
	240,05		Øye med po i merkekv.							
spl.	242,00 - 245,00	3,00	Jernliter impr. i lys kl.-ta'k-sk. <u>po</u> + cp		0.-	0.03	0.05		2.75	
"	245,00 - 248,00	3,00	" " " " " " "		0.-	0.04	0.24		4.17	
"	248,00 - 250,00	2,00	" " " " " " "		sp	0.04	0.19		2.84	
"	250,00 - 253,60	3,00	" " " " " " "		0.-	0.05	0.20		3.84	
"	254,10 - 256,20	1,10	" " " " " " "		0.-	0.04	0.05		2.84	
"	256,30 - 258,40	2,10	" " " " " " "		0.-	0.04	0.26		3.00	
	260,00 - 270,00	10,00	Stedvis meget svak impr. av sulfid, alt vesentligst po gö. og gö.sk., en del kjernetap.							
	270,00 - 280,00	10,00	Meget spredt impr. i gö.sk., - vesentlig po							
"	280,00 - 281,70	1,70	En del po-impr. i skifrig gö.		0.-	0.03	0.18		2.37	
"	284,10 - 286,10	2,00	" " " " " " "		sp.	0.05	0.52		4.34	
	288,20 - 289,10	0,90	Kjernetap							
"	298,50 - 299,40	0,90	Noe po-impr., stedvis + cp							
"	300,10 - 300,70	0,60	" " " "		sp.	0.02	0.35		2.67	
"	306,80 - 307,50	0,70	" " " "							
"	311,20 - 311,80	0,60	" " " "		0.-	0.05	0.49		4.50	
"	316,10 - 316,90	0,80	" " " "							
"	317,30 - 319,00	1,70	Kjernetap		0.-	0.04	0.30		3.75	
"	319,00 - 330,00	11,00	Stedvis pkt. med po i gö. og gö.- anf.sk.							

3

BILAG 4 Borkjernelog med analyser fra boringene i
Rieppe 1970.
Alle hullene er plottet på Tegn. 2.

Lokalitet : Rieppe

Dato : 24/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : lodd

Høyde : ~ 1000 moh.

Lengde : 343 m

Borehull : 5B-69

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0-10 m	10 m	Amf. (tydelige nåler) med få lyse band av fsp. og kv. I disse noen ganger po. 30 % kjernetap.							
10-17 m	7.00	Amf-gø b.a. Noen steder meget sterkt småfoldet. Her er det gjerne en gø. Et par steder noe po.							
17.00-19.20	2.20	Kjernetap							
19.20-33.30	14.10	Vekslende amf. stedvis noen sulfidkorn -po-cp. Ved 23.20 en gø-amf.m/fsp-xx-porfyrer.							
26.00-30.00	4 m	Oppsprukket b.a. og ~ 15 % kjernetap.							
33.30-36.00	2.70	Kjernetap							
36.00-40.80	4.80	Vekslende amf. stedvis klorittrik(gø) som er intenst små foldet. Amplitude ~ 3 mm.							
37.00-39.00	2.00	Oppsprukket fjell-20 % kjernetap.							
40.80-42.30	1.50	Kjernetap							
42.30-51 m	8.70	Vekslende amf gø gjerne fsp xx i massen. Opptil 5 cm impr. bånd med vesentlig po (45,70). Disse bånd er en helt lys b.a. Også cm tykt karb. bånd (46.70) Po.minr. også i kv/sprekker-Ikke i karb. spr.							
51-56 m	5.00	20 % kjernetap. Rel. grovk. amf. men tynne bånd men en helt fink. gø(amf).							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 24/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: lodd

Høyde : $\sim$ 1000 moh.

Lengde : 343 m

Borehull: 5B-69

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56-63.05	7.05	Vekslende gø.amf.							
63.05-63.30	0.25	Kv. f sp, ba med po. Litt cp.		0.15	0.08	0.05		2.88	x
63.30-64.00	0.70	Gø.(amf)b.a. med svak impr. Noen steder svak minr.							
64.00-65.90	1.90	Uhomogen gø. med kv+fsp. årer. Noen steder svak minr.							
65.90-66.30	0.40	Amf. -homogen							
66.30-66.90	0.60	Noe ompr. po-cp på sprekker og lagplan.		0.7	0.11	0.02		2.80	x
66.90-70.00	3.10	Rel.homogen gø.amf. Ved 68.05 et po impregn.bånd. Rundt (20cm) 69.40 store fsp. xx i foldet kl.amf. masse.							
70.00-75.80	5.80	Ved 70.45 - et cm tykt bånd med po. Ellers amf. -gø.							
75.80-76.70	0.90	Rel.fink. amf-gø.							
76.70-77.40	0.70	Homogen amf. gø.							
77.40-78.15	0.75	Finlam.b.a. m/en del impr. vesentlig po							
78.15-78.20	0.05	Gr.amf.		0.7	0.13	0.02		2.94	x
78.20-78.85	0.65	Gø-amf.							
78.85-79.70	0.85	Båndet-gø/amf-sk. med noe ompregn.							
79.70-80.60	0.90	Steril gø-amf.							

Lokalitet : Rieppe

Borehull : 5B-69

Dato : 24/6-70 IL
 Koordinater :
 Retning : ϕ
 Helling/stigning : lodd
 Høyde : $\sim$ 1000 moh.
 Lengde : 343 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
80.60-81.00	0.40	En del impregn. i foldet b.a. po + cp.		0. -	0.06	0.03		2.21	x
81.00-81.80	0.80	Gø/amf. med fsp. xx. tydelig.							
81.80-87.60	6.90	Gø/amf. skifrig uten mineralisering							
87.60-88.20	0.60	En del impregn. cp + po i foldet på skifer		0. ,	0.57	0.05		5.70	x
88.20-88.30	0.10	Gr. amf.							
88.30 - 93.40	5.10	Ved 89.15 et minr. bånd, -po. i lys b.a. Gø/amf sk. delvis m/store fsp. xx. Ved 90.40 et cm. tynt po. bånd.							
93.40-95.00	1.60	God minr. (rel) po + cp Spr. fyll også. fsp. xx i denne po. massen.		0. ,	0.47	0.03		13.25	x
95.00-98.75	3.75	Go/amf. ujevn . minr. I 10 cm bånd rel. bra , po. cp.		0. ,	0.07	0.03		2.30	x
98.75-102.50	3.75	Gø(amf)-skifer. Stedvis med 2-3 cm impregn. bånd av vesentlig po.							
102.50-104.00	1.50	En del impr. av po. cp. i gø. sk.		0. -	0.15	0. -		3.02	x
104.00-105.70	1.70	Svak impr. i gø. sk. - Ujevn impr.		0. ,	0.35	0.04		6.81	x
105.70-107.80	2.10	Impr. i Talk-kl. - gø. sk. po + py-lite		0. -	0.08	0.04		3.90	x
107.80-109.50	1.70	Ujevn dårlig impr. Bra i 5 cm bånd v/ 108.70. Gø-bergart.		0. -	0.06	0.02		2.85	x
109.50-111.20	1.70	En gø b.a. med meget tynn impregn. oftest steril.							
111.20-112.90	1.70	Grovk. amf.							
112.90-117.40	4.50	Vesentlig en gø-gøskifer som er amfibolittisk (): amf. nålen kan ses). Noe impr. spes. i kloritt sk. bånd. po. cp.							

Stasjon : Rieppe

Dato : 24/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : lodd

Høyde : $\approx$ 1000 moh.

Lengde : 343 m

Borehull : 5B-69

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
117.40-130.00	12.60	Gø. gøsk og opptil 10-20 cm bånd med grovk. amf. Noen tynne kl. sk. bånd. Svak minr. i tynne (5 cm) bånd (langt mellom)							
130.00-137.90 130.50 136.70	7.90	Gø-b.a. - skifrig noen steder Spr. fylt med ehedrale karb.xx. 10 cm impr. bånd. Impr. sitter i lys fsp. rik b.a. Stedvis større amf. nåler i gø. b.a.							
137.90--138.40	0.50	Grovk. amf.							
138.40-138.60	0.20	Gø							
138.60-139.00	0.40	Grovk. amf.							
139.00-139.40	0.40	Gø. b. a.							
139.40-150.00	10.60	Ujevn gø. (amf) b. a. Opptil 31-40 cm bånd med svak impregn. men mellom disse steril b. a.							
139.40-140.00	0.60	Impregn. vesentl. po.							
141.00-142.00	1.00	Pkt. med po(cp). Ingen analyseverdi.							
142.90-143.10	0.20	Impregn. (po) i kl. -(talk) sk.							
143.60-143.80	0.20	Noe impr. i sk. b. a.							
144.50-144.70	0.20	Fsp. porfyrer i gø.							
145.00-146.00	1.00	Gø sk.m/svak impregn.							
147.10		Po. bånd							

Lokalitet : Rieppe

Borehull : 5B-69

USB/1650/47B

Dato : 24/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : lodd

Høyde : $\sim$ 1000 moh.

Lengde : 343 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
149.00-150.50	1.00	Punktvis sulfider po - <u>cp.</u> Bræ ved. 149.60-160.50.Gø b. a.		0, -	0.20	0.05		3,74	x
150.50-152.80	2.30	Ujevn impregn. - stedvis bra i tynne bånd		0, -	0.10	0.04		2,80	x
152.80-157.20	4.40	Gø-amf b. a. Enkelte bånd med impregn.							
157.20-158.30	0.50	Noe bedre impr. - vesentlig po.							
158.30-160.00	1.70	Gø.- amfibolittisk							
160.00-171.40	11.40	Vekslende gø.og amf. gø,stedvis fsp xxx i gø-porfyr							
160.05-160.15	0.15	Impr. i gø. sk po +cp.noen gr.							
164.40 og 164.50		Et po impr. bånd							
171.40-171.85	0.45	En del impr. av po + noe cp.		0, -	0,24	0,05		6,98	x
171.85-173.60	1.75	Vekslende gø, delvis amfibolittiske							x
173.60-174.10	0.50	Grovk. amf.							
$\sqrt{174.20}$ -og 174.90		5 cm tykke impr. bånd.							
174.10-185.00	10.90	Veksl. gø/amf. Stedvis noen po-flekker							
185.00-186.50	1.50	Flekk-(bånd)vis noen sulfider, vesentlig po.		0, -	0,12	0,08		5,50	x
186.50-189.00	1.50	Gø-Gøsk-amf.							
189.00--191.00	2.00	Noe ompr. po+cp i lys gø. sk/Talksk.		0, -	0,23	0,10		5,89	x
191.00--193.00	2.00	En del gr.amf. el.gr.amf.gø. sk.		0, -	0,09	0,06		3,49	x
193.00-195.50	2.50	Gø/gøsk noe ompr. po+cp+sl i et cm tykt bånd.		0, -	0,08	0,38		3,74	x
195.50-200.60	5.10	Gø. vekslende							
200.60-201.40	0.80	Kl. talk. skifer.							

Lokaltet : Rieppe

Dato : 24/6-70 IL

Koordinater :

Borehull : 5B-69

Retning : ϕ

Helling/stigning : lodd

Høyde : $\sim$ 1000 moh.

Lengde : 343 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
201.40--202.96	1.56	Gø. Ved 202.90 en fsp. porfyr.							
202.96-204.60	1.64	En del impr. i lys sk talk/kl. sk.		0, -	0,05	0,07		2,80	x
204.60-206.20	1.60	Gø/grovk. amf.							
206.20-208.00	1.80	En del svak impr. (Kl. sk. 206.20-207.50) ellers gø. sk.		0,09	0,06	0,37		2,97	x
208.00-210.00	2.00	En del svak impr. gø. sk.		0,11	0,04	0,17		2,45	x
210-213	3.00	Svak impr. gø. sk.		0,09	0,02	0,09		1,19	x
213-216.40	3.40	Svak ujevnr impr. gø. sk.		0,07	0,04	0,12		2,42	x
216.40-220.20	3.60	Gø. sk med ubetydelig impregn. -po.							
220.20--224.00	3.80	Svak impr. vesentlig po i gø. sk.		0,05	0,02	0,06		2,42	x
224.00--226.70	2.70	- " -		0,05	0,04	0,13		4,40	x
226.70-229.00	2.30	Gø og gø. sk stedvis med små gr. Noen få impr. bånd av po (og ikke annet).							
229.00-231.10	2.10	Grovk. amf. Stedvis po-korn.							
231.10-234.00	2.90	En del impr. -po. i gø. sk.		0,07	0,02	0,05		3,63	x
234.00-236.00	2.00	- " -		0,09	0,02	0,07		2,37	x
236.00-238.00	2.00	- " -		0, -	0,04	0,34		3,35	x
238.00-239.00	1.00	20 % kj. tap. litt po i gø/amf. sk.							
239.00-242.00	3.00	Gø. noen po. korn.							

Lokallitet : Rieppe

Dato : 24/6-70

Borehull : 5B-69

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : lodd

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 343 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
242.00-245.00	3.00	Rel. mass. gø. til grovk. amf. Noen øyne med po,25 % kjernetap.							
245.00-254.50	9.50	Gø → Gø. sk . Stedvis med bånd med po impr. Impr. er alt vesentlig po.							
254.50-255.10	0.60	Grovk. amf.							
255.10-260.00	4.90	Gø og gø. skifer med tynne spredte po. bånd.							
260.00- 261.00	1.00	Gø. sk med innblanding av cm tynne gl. sk. lag.							
261.00-267.60	6.60	Gø og gø. sk med et par $\frac{1}{2}$ cm tynne po. mineraliseringer.							
267.60-268.00	0.40	Grovk. amf.							
268.00-269.20	1.20	Gø. sk med en del innbl. av gl. sk.							
269.20-270.00	0.80	Alt vesentlig gl. sk.							
270.00-278.50	8.50	Halvt om halvt vekslende gl. sk. og gø. sk Nær steril for sulfider.							
278.50-280.00	1.50	Kjernetap							
280.00-280.90	0.90	50-50 gl. sk. gø. sk.							
280.90-281.50	0.60	Grovk. amf.							

Lokalitet : Rieppe

Borehull : 5B-69

USB/1650/47B

Dato : 24/6-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : lodd

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 343 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
281.50-286.00	4.50	Gø. sk. + gl. sk. Gø. sk i overvekt i mengde.							
286.00-289.80	3.80	50-50 gø. sk. - gl. sk.							
289.80-290.20	0.40	Gl. sk.							
290.20-303.25	13.05	Gø. sk. og gl. sk. vekslende.							
303.25-303.50	0.25	Grovk. amf.							
303.50-304.75	1.25	Vesentl. gø. sk- noe gl. sk.							
304.75-328.70	23.95	Vesentlig gl. sk. med innbl. av gø. sk- kloritt. Ingen impr.							
328.70-335.70	7.00	Grovk. amf. - gø. stenaktig i overg. gl. sk. - grovk. amf.							
335.70-336.00	0.30	Gø med fsp. porfyrer							
336.00-343.00	7.00	Gø. -gø. sk.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/6-70 IL

Borehull : 1-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 70°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 160 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					XXXX Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
1-1.10	1.10	Kjernetap							
1.10-2.00	0.90	Grovk. amf.							
2.00-2.40	0.40	Gø. amf. sk. stedvis fsp. porfyrer.							
2.40-3.00	0.60	Grovk. amf.							
3.00-3.40	0.40	Gø amf. med en del impr. på lagflatene, vesentlig po.							
3.40-3.50	0.10	Store fsp.xx i en spr. fylling(prøve for mikroskopering) . Po+cp+ bornitt ?							
3.50-7.85	4.35	Gø og amf. sk. Ved 4.75 noen korn av po +cp.							
7.85-8.50	0.65	Noe impr. i amf. po. + cp.		0.07	0.18	0.02		3.31	x
8.50-9.05	0.55	Amf.-gø.- rel. massiv.							
9.05-9.10	0.05	Po. impregn. bånd i gø-amf.							
9.10-12.15	3.05	Gø. og amf. gø. noe impr. v/10.60.							
12.15-12.20	0.00	Kv. klyse m/impr. spes.cp.							
12.15-15.00	2.85	Rel. ujevn svak.impr. i gø.sk - amf. stedvis en gr.amf. Impr. fører tydelig cp.		0.-	0.06	0.10		2.16	x
15.00-17.50	2.50	---- " -----		0.-	0.02	0.07		1.15	x
17.50-18.50	1.00	Noe bedre impr. i gø.sk. svak talk-kl. holdig po + cp. Sterkt foldet.		0.07	0.09	0.09		3.26	x
18.50-19.25	0.75	Sterkt foldet gø.amf. sk. Steril.							
19.25-21.20	1.95	Gø.sk amf. Stedvis rel. grovk. noen steder noe gr. amf. Ved 20.15 litt cp. Ellers noen pkt. med po.							

Borehull : 1-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 70° Høyde : ≈ 1000 moh.

Lengde : 160 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.20-23.30	2.00	Gø. delvis m/fsp. porfyrer delvis gø.sk og amf. Noen steder litt sulfider men tykke "lag" vesentlig po.							
23.20-25.60	2.40	Ujevn impr. i vekslende b.a. po og en del cp. Gø.sk-amf.(lite talk-kl).		0, -	0.17	0.06		3,99	x
25.60-28.80	3.20	Gø.sk - amf. spredt impr. vesentl. po.							
28.80		Et dm tykt ^{po} bånd.							
28.80-30.00	1.20	Mørk amf. middelskornig.							
30.00-32.50	2.50	Amf. mørk fra 30.00 men blir gradvis lysere. Noen få po.korn.							
32.50-33.00	0.50	Gø.sk til amf. delvis talkig. Sterkt foldet							
33.00-33.60	0.60	Talk kl.sk. stedvis med litt po. - " -							
33.60-36.20	2.60	Vekslende gø.sk.-amf. talk kl.sk. Stedvis litt po. Druserom på spr. fyllinger med CaCO ₃ .							
36.20-37.10	0.90	Amf. stedvis temmelig skifrig + lyse bånd							
37.10-45.50	8.40	Middelskornig massiv amf. Noen meget små po.korn. Fra 45.00 og oppover fsp. xx i amf.							
45.50-45.55	0.05	Kly ^{ys} se med fsp.xx og sulfider po og litt cp.							
45.55-52.30	6.75	Amf. rel. massiv med kv.klyser (5 cm) og tynne impr. bånd (46.50 49,80 og 51.10) Også tynne talk.kl.sk.bånd (49.50 og 50,95)							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27.6-70 IL

Borehull : 1-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 70° Høyde : ~ 1000 moh.

Lengde : 160 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52.30-53.60	1.30	Grovk. amf. (gabbro)							
53.60-60.30	6.70	Amf. alt vesentlig, noen kl. sk. lag og gø. sk.-aktige soner. Også kv. fsp. utsvetninger med litt po - også amf. nåler.							
56.30-56.40	0.10	Talk kl. sk. - litt po.							
60.30-61.50	1.20	Grovk. amf. ("gabbro").							
61.50-63.05	1.55	Amf. m/gø. sk. lag (tynne).							
63.05-63.20	0.15	Po minr. i gø. sk. ikke obs. noe cp.							
63.20-68.00	4.80	Amf. med tynne kl. sk. og gø. sk. lag med frekvens på ca. 1 m (66.60 litt minr. po + (cp). Ofte massiv amf. middelkornig.							
68.00-71.00	3.00	Grovk. amf. massiv.							
71.00-71.50	0.50	Gø. sk. - talk-kl. sk.							
71.50-74.00	2.50	Talk kl. sk. m/en del impr., foldet.		0, -	0.11	0.08		5,66	x
74.00-77.00	3.00	Talk kl. sk. m/impr. Sterkt foldet, po+cp.		0,09	0,06	spor		4,44	X
77.00-78.20	1.20	Gø-amf. rel massiv ujevn impr. (analyseres "mellomrom" fsp. porfyrer. i gø-massen.		0, -	0,03	0,05		1,76	x
78.20-80.00	1.80	Ujevn impr. gø-talk kl. sk.		0, -	0,04	0,09		4,03	x
80.00-82.20	2.20	Nær ingen impr. Delvis grovk. amf. i gø. kl. sk. (analyseres for kontinuiteten).		0, -	0,03	0,07		1,56	x
82.20-83.90	1.70	En del impr. i gø. talk. kl. sk. po+cp.		0, -	0,12	0,05		2,13	x
83.90-85.10	1.20	Svak impr. (kontinuitetsanal) gø. sk. vesentlig		0, -	0,02	0,10		1,23	x
85.10-85.35	0.25	En god del impr. po + cp i gø. sk.		0,07	0,49	0,07		18,37	x
85.35-86.15	0.80	Amf. gø. sk							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/6-70 IL

Koordinater :

Borehull : 1-70

Retning : ϕ

Helling/stigning : 70°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 160 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					XXXXX Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
86.15-87.15	1.00	Sterkt foldet tekt. b. a. m/3-4 mm lange amf. nåler. Også fsp. utsvetninger.							
87.15-92.10	4.95	Gø. sk → amf. - nær steril							
92.10-92.30	0.20	Fsp. utsvetning talkkl. - gø. sk. m/amf nåler.							
92.30-93.60	1.30	Mørk båndet amf. fsp. bånd og amf. bånd.							
93.60-94.00	0.40	En del rel. bra cp. impregn.-amf. gø. sk		0, -	2,19	0,07		5,61	x
94.00-95.90	1.90	Stedvis cp prikker + po ujevn impregn. amf-gø. sk.		0, -	0,05	0,03		2,11	x
95.90-105.90	10.00	Gø. sk også amf. bånd noen po flekker. Ved 100.95 og 102.30 noen cp flekker.							
105.90-106.60	0.70	Fsp. "utsvetn" i gø. sk m/amf nåler.							
106.60-107.00	0.40	Grovk. amf. - lys type.							
107.00-110.10	3.10	Gø. sk -- amf noen po-korn							
110.10-113.00	1.90	Rel. massiv amf. Ved 110.30 noe po impr.							
		Ved 111.50 et $\frac{1}{2}$ cm po bånd med noe cp.							
113.00-115.00	2.0	Gø.-amf. sk.-delvis talk sk. m/hovedsaklig po impr.		0,30	0,18	0,28		4,28	x
115.00-117.00	2.0	----- " -----		0, -	0,25	0,06		5,81	x
117.00-119.50	2.50	----- " -----		0, -	0,09	0,05		4,36	x
119.50-120.10	0.60	Steril mørk fink. amf.							
120.10-123.00	2.90	En del impr i gø. sk. kl. sk vesentlig po		0, -	0,06	0,07		3,11	x
123.00-126.00	3.00	(+cp) også noe py. Opptil 5 cm kv/fsp.		0, -	0,06	0,06		2,35	x
126.00-129.40	3.40	utsvetn. forekommer.		0, -	0,08	0,10		2,88	x

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 70° Høyde : $\sim$ 1000 moh.

Lengde : 160 m

Borehull : 1-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					XXXX Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
129.40-130.60	1.20	Talk-kl. sk. uten minr.							
130.60-134.00	3.40	Vekslede talk-kl. og gø. sk.							
134.00-135.10	1.10	En del impr. i gø-kl. sk.		0, -	0,20	0,68		6,01	x
135.10-139.60	4.50	Talkig b.a. - gø. sk. type glatt. Et par steder ubetydelig med sulfider.							
139.60-141.40	1.80	Hård mass fink: mørk amf. hovedsaklig uten lagning.							
141.40-143.85	2.45	Svakt talkig gø. rel. massiv & lys.							
143.85-145.00	1.15	----- " ----- med en del impr.		0, -	0,02	0,21		1,91	X
145.00-148.00	3.00	Talk. sk med po impr. + cp po-cp + py.		0, -	0,02	0,19		1,99	x x
148.00-151.00	3.00	----- " -----		0, -	0,03	0,11		2,51	x
151.00-153.50	2.50	----- " -----		0, -	0,02	0,07		2,35	x
153.50-154.40	0.90	Gø. sk m/innbl. av tynne gl. sk. lag.							
154.40-154.90	0.50	Gø. sk.							
154.90-155.95	1.05	Grovk. amf. m/noen øyne med po.							
155.95-156.50	0.55	Gø. sk m/ endel po + cp.							
156.50-157.30	0.80	Mørk, massiv fink. amf.							
157.30-160.00	2.70	Gø. skifer. Små amf. nåler er stedvis synlig.							

Lokallitet : Rieppe

Dato : 29/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 70°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 150 m

Borehull : 1B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0-1.50	1.50	Kjernetap							
1.50-11.70	10.20	Amfibolittisk skifer, oppsprukket dagfjell i begynnelsen. 7.50. Spr.fylling av CaCO_3 . En jevn tynn fordeling av sulfider. ³ Det aller meste po. men også litt cp, spes. ved 6.50. Også tynne kl.talk. sk. bånd(<5 cm)							
11.70-14.00	2.30	Ved 11.80 - 12.70 og 13.60-13.90 ser del impr. po + litt cp. Amf. sk. → gø. sk. Ved 13.85 gr.amf.		0, -	0,06	0,02		4,36	x
14.00-18.30	4.30	Gø. sk → amf. sk.							
18.30-19.80	1.50	"Knudret" takt.amf. sk. Med lyse fsp. utsvetn. - foldet sterkt.							
19.80--21.50	1.70	Gø. sk → amf. sk.							
21.50-22.10	0.60	-- " -- m/fsp. porfyrrer.							
22.10-24.55	2.45	Gø. sk → amf. sk stedvis m/fsp.utsvetninger.							
24.55-25.80	1.25	Ujevn pen cp impr. spes. pen v/25.65 Gø. sk. → amf. foldet.		0, -	2,22	0,14		7,36	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 29/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 70°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 150 m

Borehull: 1B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
25.80-28.55	2,75	Meget ujevn men noe impr. Det vesentligste po.		0, -	0.10	0.01		2,39	x
28.55-35.30	6,75	Hovedsaklig massiv middelkornig amf.							
33.70-33.85	0.15	Litt impr. <u>po</u> + cp.							
35.30-35.50	0.20	" i gø. sk.							
35.50-37.15	1,65	Gø. sk amf. sk.							
37.15-39.80	2.75	Ba : Talk kl. sk. gø. sk./amf. sk. Jevn svak impr. <u>po</u> + cp.		0, -	0.07	0.05		2,35	x
39.80-42.00	2.20	Gø. sk - amf. sk. m/flekkvis <u>po</u> + cp impr.		0.04	0.06	0.07		1.99	x
42.00-44.30	2.30	"		0. -	0.04	0.02		1.60	x
44.30-44.80	0.50	Bedre impr. i t.kl. sk.		spor	0.17	0.03		5,77	x
44.80-50.30	5,50	Gø. sk. amf. sk. v/50.30 en i impr. flekk <u>po</u> og cp.							
50.30-51.60	1.30	Massiv middelk. amf							
51.60-52.10	0.50	Vesentlig t.kl. sk og (gø. sk).							
52.10-52.30	0.20	Grovk. amf.							
52.30-53.10	0.80	En del impr. i gø. sk. og t.kl. sk.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 29/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : 70°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 150 m

Borehull : 1B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
53.10-61.35	8.25	Amf. og gø.sk Pkt.vis noe po (cp).							
55.50-55.80	0.30	Grovk. amf.							
61.35-64.50	3.15	Grovk. amf. siste halve meter (64.-65.50) noe mer fink. Alt massivt.							
64.50-65.00	0.50	Amf. sk.							
65.00-66.20	1.20	Ujevn flekk-impr. av po + cp i amf.sk som er rel. massiv.		0,09	0,08	0,05		3,17	x
66.20-68.75	2.55	----- " -----		0,04	0,06	0,02		2,72	x
68.65-70.40	1.75	Impregn. i talk kl.sk. noe massiv amf. mellom lagene.		0,-	0,03	spor		2,84	x
70.40-73.00	2.60	Impr. i amf. og gø.sk. po + også tydeligere cp.flekker.		0,-	0,06	spor		2,39	x
73.00-75.00	2.00	Vekslede gø.- amf.sk m/ujevn impr. po + cp		0,-	0,09	0,02		2,89	x
75.00-77.50	2.50	----- " -----		0,-	0,18	0,06		2,48	x
77.50-80.00	2.50	----- " -----		0,-	0,10	0,02		2,31	x
80.00-81.25	1.25	Gode impr. biter 80.05-80.10 80.60-80.85 (fsp. utsv område) og 81.10-81.25. Ba. er amf. sk.		0,-	0,23	0,03		3,59	

Lokalitet : Rieppe

Borehull : 1B-70

USB/1650/47B

Dato : 1976-70 IL
 Koordinater :
 Retning : ϕ
 Helling/stigning : 70°
 Høyde : ~ 1000 moh.
 Lengde : 150 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					XXXX Prøve m Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
81.25-85.30	4.05	Amf. sk. og gø. sk Enkelte steder litt po.							
85.30-85.80	0.50	Amf. sk.m/3-4 mm store amf. nåler i en lysere fsp. masse.							
85.80-89.10	3.30	Amf. sk-gø. sk.							
89.10-89.90	0.80	Grovk. amf.							
89.90-90.20	0.30	Fink. amf. - gø. sk.							
90.20-90.40	0.20	En del impr. vesentlig po i gø. sk.							
90.40-93.55	3.15	Amf. $\rightarrow$ gø. sk. ofte med fsp. porfyrer.							
93.55-93.75	0.20	Amf. med slanke lange amf. nåler.							
93.75-95.20	1.55	Stedvis pen po + cp impr. - gø $\rightarrow$ amf. sk.		spor	0,34	spor		3,59	x
93.85-94.10	0.25	Melkekv. m/cp. flekker.							
95.20-95.65	0.45	Amf. Store amf. nåler i gø.-fsp.grunnmasse.							
95.65-96.65	1.00	Amf.-gø, massiv steril.							
96.65-96.95	0.30	En del impr. i foldet gø. sk. delvis talkig.		0, -	0,10	0,03		6,70	x
96.95-100.20	3.25	Gø $\rightarrow$ amf m/fsp. porfyrer.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 29/6-70 IL

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde : ~ 1000 moh.

Lengde : 150 m

Borehull : 1B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
100.20-101.70	1.30	Amf. sk.							
101.70-103.20	1.50	Amf. sk, delvis m/fsp porfyrer.							
103.20-104.20	1.00	Grovk. amf. (nesten "gabbro").							
104.20-106.00	1.80	Tekt. påvirket amf., talk. kl. sk og gr. litt minr. <u>po</u> (cp).							
106.00-111.00	5.00	Gø. sk-amf. sk. Ved 107.02 litt <u>po</u> + <u>cp</u> .							
111.00-111.20	0.20	Grovk. amf.							
111.20-113.30	2.10	En del minr. i gø. sk. Talk og kl. sk. <u>po</u> + <u>cp</u> .		0, -	0,09	0,08		5,16	x
113.30-115.45	2.15	Bra minr. <u>po</u> og <u>cp</u> .		0,04	0,32	0,06		6,57	x
115.45-115.70	0.25	Melkekv.		0, -	0,12	0,05		3,13	
115.70-116.75	1.05	Mindre minr. Utenom kv-gø. sk-talkig.							x
116.75-118.50	1.75	Minr. i opptil 2 cm sulfidbånd + impr. <u>po</u> + <u>cp</u> . Gøsk, Talkig.		0, -	0,18	0,08		6,70	x
118.50-119.75	1.25	Bra impr. <u>po</u> + <u>cp</u>		0, -	0,19	0,11		6,45	x

Lokalitet : Rieppe

Dato : 29/6-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 70°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 150 m

Borehull : 1B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
119.75-122.40	2.65	Rel. dårlig impr. Gø. sk-amf. sk po. vesentlig		0,02	0,08	0,06		2,48	x
122.40-124.50	2.10	Ujevn impr. i gø. sk talkig. Et fint cp band v/124.40 po+ cp.		0,05	0,09	0,06		3,68	x
124.50-127.00	2.50	----- " -----		0,06	0,15	0,11		4,25	x
127.00-129.50	2.50	----- " -----		0,07	0,14	0,02		4,57	x
129.50-130.00	0.50	Meget dårlig minr. i massiv amf-gø		0,09	0,24	0,01		4,82	x
130.00-132.00	2.00	Minr. i talk. kl. sk. → gø. sk. Vesentlig po men en del cp.		0,25	0,15	0,05		3,54	x
132.00-134.00	2.00	----- " -----		0,19	0,02	0,08		1,80	x
134.00-136.00	2.00	----- " -----		0,06	0,04	0,11		2,01	x
136.00-138.00	2.00	----- " -----		0,11	0,04	0,02		2,72	x
138.00-140.00	2.00	----- " -----		0,09	0,05	0,26		2,83	x
140.00-142.00	2.00	----- " -----		0, -	0,02	0,12		1,66	x
142.00-144.50	2.50	----- " -----		0,11	0,05	0,18		2,58	x
144.50-149.20	4.70	Gø. sk noen få små pkt med po.							
149.20-150.00	0.80	Talk kl. med svak po. impr.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 23/7-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : 900 moh.

Lengde : 195 m

Borehull : Bh-2-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0-1.40	1.40	Kjernetap							
1.40-4.40	3.00	Gø-gø. sk m/fsp.årer.							
4.40-5.40	1.00	En del impregn. Foldet gø-gø. sk 4.00-4.30 gr.amf. m/impr.-po-cp		0,07	0,26	0,06		5,40	x
5.40-7.30	1.90	Massiv amf → gø. middelkornig. Sted- vis tynne spr.fyll m/sulfider. po-cp.							
7.30-8.00	0.70	Svak impr. i gø.amf. po-cp		0,09	0,26	0,01		5,64	x
8.00-8.80	0.80	uholdig gø-amf. rel. massiv							
8.80-10.00	1.20	Svak ujevn impr. i gø.-amf. po-cp		0,08	0,07	0,05		1,68	x
10.00-10.80	0.80	Meget svak impr. i gø-amf.		0,10	0,08	0,02		1,79	x
10.80-12.00	1.20	Gø. sk → talk kl. sk m/impr. po-cp		0,07	0,07	0		3,02	x
12.00-13.25	1.25	----- " ----- noe bedre impr.		0,10	0,34	0,05		8,49	x
13.25-14.60	1.35	Svak ujevn impr. i gø-amf. rel massiv.		0	0,04	0,02		1,38	x
14.60-14.90	0.30	Lys fsp. b.å. m/opptil 3 mm amf.nåler.							
14.90-17.60	2.70	Massiv amf. gø.							
17.60-18.05	0.45	Ujevn impr. i gø. sk.-amfibolittisk po-cp.		0,05	0,03	0,03		1,43	x
18.05-18.70	0.65	Uholdig rel. massiv amf/gø.							
18.70-18.80	0.90	En del po impr. i gø/amf. sk							
18.80-19.30	0.50	Gø-amf. massiv							
19.30-19.40	0.10	Fsp. utsvetn. m/noe sulfider po-cp							
19.40-22.50	3.10	Fink. gø/amf- massiv							
22.50-24.60	2.10	Middelk. ---- " ----							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 23/7-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : 900 moh.

Lengde : 195 m

Borehull : Bh-2-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.60-28.60	4.00	Gø/amf. delvis m/tynne impr. bånd av po (cp) m/tynne fsp striper (5 mm).							
28.60-28.70	0.10	Grovk. amf.							
28.70-29.70	1.00	Massiv. fink.							
29.70-31.00	1.30	Rel. grovk. amf.							
31.00-33.70	2.70	Gø. amf/skifrig til massiv							
33.70-36.00	2.30	Svak impr. i gø/amf. Skifrig		0,05	0,02	0,03		1,49	x
36.00-38.00	2.00	----- " -----		0	0,02	0,03		1,89	x
38.00-39.30	1.30	Nær uholdig gø.amf		0,10	0,02	0,04		1,69	x
39.30-39.70	0.40	Noe bedre impr. i gø.amf		0,04	0,36	0,04		3,79	x
39.70-40.60	0.90	Nær uholdig gø-amf.		0,05	0,02	0,05		1,79	x
40.60-43.00	2.40	Gø.sk- delvis talkig-svak impr.		0,08	0,13	0,04		4,29	x
43.00-44.50	1.50	Svak ujevn impr. i gø.sk.delvis talkig -klorittisk		0,10	0,11	0,06		4,64	x
44.50-48.70	4.20	Massiv fink. gø/amf.							
48.70-49.75	1.05	Gø.sk m/noe impr. po.cp		0,11	0,06	0,05		3,32	x
49.75-58.50	8.75	Veksl. gø-gø.sk Tynne bånd m/impr. po-cp. Spes v/57.10 og 58.20-28.30 hvor en har talk.kl.sk. + impr.							
58.50-62.40	3.90	Sk.gø (svakt amf)							
62.40-62.80	0.40	Gø.sk. delvis talkig svak impr. po (cp) foldet.		0,05	0,13	0,06		4,19	x
62.80-64.80	2.00	Gø.sk. delvis sterkt sk. delvis massiv. også amfibolittisk.							

Lokalitet : Rieppe

Borehull : Bh-2-70

USB/1650/47B

Dato : 23/7-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : 60°

Høyde : 900 moh.

Lengde : 195 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
64.80-89.00	24.20	Gø.sk. Meget skifrig- 5 ører. også amfibolittisk.							
89.00-107.40	18.40	Vekslende gø/amf.							
107.40-109.00	1.60	Grovk. amf. massiv.							
109.00-110.50	1.50	Massiv gø/amf							
110.50-111.60	1.10	Middelkornig massiv amf.							
111.60-112.60	1.00	Gø/amf. massiv							
112.60-114.40	1.80	Skifrig gø/amf (5 ører).							
114.40-116.50	2.10	Veksl. gø/amf. rel. massiv.							
116.50-119.00	2.50	Grovk. amf. meget massiv							
119.00-121.00	2.00	Fsp. flekket gø/amf. Ved 120.50-120.70 meget skifrig.							
121.00-122.50	1.50	Grovk. amf.							
122.50-126.40	3.90	Fsp. flekket gø/amf.							
126.40-130.00	3.60	Rel. homogen gø/amf. -rel. massiv							
130.00-170.00	40.00	Gø/amf. massiv m/tette fsp. flekker porfyrer ? Nær steril for sulfider.							
170.00-196.00	28.00	Noe mindre fsp. flekket gø/amf. - steril							
190.00-195.00	5.00	Delvis fsp. " ; også homogen gø/amf. delvis skifrig.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/7-70 IL

Borehull : 3-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 193 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0-1.40	1.40	Kjernetap							
1.40-2.75	1.35	Gø.sk-amf.sk. dagfjell							
2.75-2.95	0.20	Grovk. pegm. amf.							
2.95-4.10	1.15	Mørk amf/gø							
4.10-8.60	4.50	Gø.sk → amf. sk.							
7.90-8.00	0.10	En del po impr. i lagflatene							
8.60-9.50	0.90	Gø.amf m fsp xx -flekke type. Ved 8.80 et cm tykt po-bånd							
9.50-9.80	0.30	Massiv amf/gø							
9.80-10.30	0.50	Gø/amf							
10.30-13.00	2.70	Massiv, mørk fin til middelkornig amf (gø).							
13.00-13.65	0.65	Gø-amf. sk.							
13.65-13.70	0.05	En impr. sone med po også litt cp.							
13.70-19.20	5.50	Gø-amf. Oftest massiv men også skifrig.							
14.50		En 2-3 cm impr. po.sone							
19.20-19.65	0.45	En del impr. i gø.sk. Delvis en gr. amf, foldet. po + cp.		0,-	0,18	spor		5,21	x
19.65-21.70	1.05	Amf.gø. Rel massiv. Ved 20.60 et cm tykt po impr. bånd							
21.70-23.00	1.30	Gø.sk → amf noe impr. po+cp men totalt sett meget lite sulfider.		0,-	0,18	spor		3,54	x
23.00-23.90	0.90	Svært tynn impr. i foldet gø.sk-amf		0,-	0,68	0,06		3,57	x
23.90-24.10	0.20	Steril gø							

Lokalitet : Rieppe

Borehull : 3-70

USB/1650/47B

Dato : 27/7-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : 60°

Høyde : ~ 1000 moh.

Lengde : 193.m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					XXXXX Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.10-24.40	0.30	Gø/amf med mange fsp xx							
24.40-26.30	1.90	Gø → amf dels med tynne kl. sk. soner hvor en har en ubetydelig po - impr. (også litt cp).							
26.30-27.20	0.90	Impr. i gø. sk og til dels talkig kl. sk. po + cp (rel dårlig)		0, -	0, 07	0, 03		3, 04	x
27.20-27.40	0.20	Nær steril gø-amf.		0, 06	0, 06	0, 04		5, 28	x
27.40-28.00	0.60	En del impr. i gø. sk og kl. sk dels talkig		0, -	0, 08	spor		5, 61	x
28.00-30.95	2.95	Steril gø-amf. rel. massiv.							
30.95-32.10	1.15	En del impr. i gø. sk - kl. sk. delvis talkig po + cp.		0, 05	0, 24	spor		3, 16	x
32.10-32.45	0.35	Bra impr. ----- " -----		0, 05	2, 76	0, 05		11, 90	x
32.45-33.40	0.95	Dårlig impr. i gø. sk. → kl. sk.		0, 18	0, 09	0, 03		2, 67	x
33.40-33.50	0.10	Rel. fink. amf. - gø.							
33.50-34.50	1.00	Middelk. amf. Sulfider på tynne spr. ellers steril.							
34.50-35.20	0.70	Gø-amf.							
35.20-36.05	0.85	Næe po (cp) impr. i gø. sk - kl. sk-talkig		0, 23	0, 05	spor		1, 60	x
36.05-41.40	5.35	Vekslede gøsk - gø amfibolittisk. Po stedvis på mentynne lagflater.							
41.40-42.40	1.00	Impr. 41.40-41.60 41.90-42.00 } ellers nær steril gø. ved 42.10 42.30-42.40 }		0, -	0, 17	0, 02		5, 28	x
42.40-45.50	3.30	Gø → amf. m/2 cm soner m/fsp-kv.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27.7-70 IL

Koordinater :

Borehull : 3-70

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

USB/1650 /47B

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 193 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.50-47.00	1.50	Impr. v/45.55 (4 cm bånd-po+cp) 46.15 (2 cm bånd po) 46.40 (4 cm bånd po) ellers uholdige gø/amf og gø. sk.							
47.00-49.00	2.00	Gø/amf. med utsv. soner av fsp/kv.							
49.00-50.10	1.10	Homogen gø/amf.							
50.10-50.15	0.05	En po klyse i amf-gø.							
50.15-52.50	2.35	Gø til amf. til dels skifrig.							
52.50-52.80	0.30	Noe ujevn impr. , mest po men også cp		0, -	0,35	0,01		6,46	x
52.80-53.60	0.80	Middelk. amf. grovest kornstr. i midten							
53.60-54.10	0.50	Vekslende skifrig b.a. gø. sk → amf. En del po impr.							
54.10-55.00	0.90	En del svak impr. til. dels sk. gø.-amf. <u>po</u> (cp).							
55.00-55.30	0.30	Kjernetap							
55.30-55.70	0.40	Gø/amf. sk.							
55.70-56.30	0.60	Grovk. amf.							
56.30-58.50	2.20	Vekslende amfibolittisk . gø. Stedvis noe impr. <u>po</u> (cp).							
58.50-58.90	0.40	Noe impr. i gø. sk po + cp.		0,02	0,07	0,03		3,69	x
58.90-60.15	1.25	Dårlig impr. , ujevn i gø. sk og til dels massiv gø.amf.		0,02	0,06	0,02		2,36	x
60.15-61.70	1.55	Noe impr. Vesentlig po-ujevn. gø. sk.		0,05	0,21	0,03		5,91	x
61.70-62.60	0.90	Steril gø.amf.							
62.60-62.70	0.10	Noe po impr. i gø. sk.							
62.70-63.40	0.70	Steril gø-amf.							
63.40-63.60	0.20	Noe impr. vesentlig po i gø. sk.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/7-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 193. m

Borehull : 3-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.60-65.00	1.40	Amf. $\rightarrow$ gø, som til dels er skifrig							
65.00-65.30	0.30	Sterkt grønnfarget b.a. med fsp.kv. utsvtn. Po mineralisering foldet-tekt.							
65.30-66.05	0.75	Amf. gø							
66.05-66.40	0.35	Gø. sk m/fsp.kv. utsvetn. po + cp.		0, -	0,06	0,01		2,67	x
66.40-67.00	0.60	Steril amf. gø.							
67.00-67.35	0.35	Am ---gø. sk Noe impr. po + cp.							x
67.35-68.40	1.05	Steril amf. - gø.							
68.40-68.50	0.10	Noe impr. po (cp).							
68.50-68.80	0.30	Steril amf-gø							
68.80-69.50	0.70	Ujevn impr. vesentlig po + litt cp.		0,10	0,13	0,02		2,98	x
69.50-70.60	1.10	Dårlig ,nær steril gø.-amf.		0, -	0,11	0,06		5,27	x
70.60-71.50	0.90	Ujevn til dels bra po + cp impr. i gø. sk klorittisk.		0, -	0,20	0,01		16,04	x
71.50-74.00	2.50	Rel. massiv amf.(gø) med enkelte po pkt.							
74.00-74.50	0.50	Noe ujevn til dels bra impr. i kl. sk og gø. sk men også uholdig massiv amf. -gø.		0, -	0,13	0,04		23,58	x

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/7-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60° Høyde : ~ 1000 moh.

Lengde : 193 m.

Borehull : 3-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
74.50-75.30	0.80	Nær steril massiv (gø) amf		0, -	0,06	0,03		1,96	x
75.30-76.35	1.05	Ujevn impr. i gø.sk - kl.sk. delvis også amf.sk.		0, -	0,09	0,08		6,62	x
76.35-76.55	0.20	God impr. i gø.sk po + cp.		0, -	1,30	0,01		30,18	x
76.55-78.30	1.75	Ujevn rel. dårlig impr. i massiv amf $\rightarrow$ gøsk.		0, -	0,13	spor		2,91	x
78.30-78.60	0.30	Rel god. impr. i gø.sk po + cp.		0,02	0,07	0,06		7,59	x
78.60-79.80	1.20	Ujevn tynn impr. i amf $\rightarrow$ gø.sk, po + cp.		0, -	0,08	0,03		3,02	x
79.80-81.30	1.50	Nær steril gø. $\rightarrow$ gø.sk også massiv amf.		0, -	0,07	0,05		2,63	x
81.30-85.50	2.20	En del impr. i gø.sk. po + cp		0, -	0,17	spor		4,97	x
83.50-84.50	1.00	Dårlig impr. i massiv amf. gø		0, -	0,07	0,01		2,18	x
84.50-85.00	0.50	Rel. bra impr. i gø.sk-klorittisk		0,05	0,22	0,08		18,02	x
85.00-86.50	1.50	Ujevn svak impr. i gø.sk. Uholdig amf gø. mellom disse impr. bånd.		0, -	0,19	0,09		8,86	x
86.50-95.00	8.50	Massiv amf. gø. v/90.80 et 2 cm bånd på impr. i kv.fsp. v/94.70 et 5 cm bånd amf.nåler i fsp(?) masse.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/7-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : () 1000 moh.

Lengde : 193. m

Borehull : 3-70

USB/1650 /47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
95.00-96.00	1.00	Amf. gø m/bånd av lys b.a. opptil $\frac{1}{2}$ cm tykke vanlig. Dette en kv.fsp. b.a. (v/95.50 et 3 cm bånd av dette m/po).							
96.00-96.75	0.75	Amf. gø.							
96.75-96.90	0.15	Amf. nåler hovedmasse m/sans. fsp. gr.masse.							
96.90-98.90	2.00	(Amf) gø og gø. sk							
98.90-99.00	0.10	Gø. sk m/po impr. - ganske kraftig.							
99.00-100.00	1.00	Gø og gø. sk stedvis svakt amfibolittisk							
100.00- 107.50	7.50	Vekslende gø og gø. sk Til dels amfibolittisk. v/101, 35, 103, 40, 103, 70, 103, 20 - utsvetn av fsp-kvarts 2-5 cm mektig. v/106, 30 og 107, 25 - 5 cm kv-fsp. utsvetn. m/litt po + cp.							
107.50-108.20	0.70	Gø m/mye fsp som hvite xx og mye fsp i bergarten ellers.							
108.20-110.10	1.90	Gø → gø. sk.							
110.10-110.75	0.65	Noe impr. po - cp i gø. sk. kl. sk delvis talkig.		0, -	0, 18	0, 05		4, 73	x
110.75-111.60	0.80	Svak impr. po - cp i lys fsp b.a. nesten en kv. sitt, laminert.							
111, 60-111.85	0.25	Lys kv. sittisk b.a. lagdelt, mye fsp.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/7-70 IL

Borehull : 3-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 193 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					XXXXXX Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
111.85-112.50	0.65	G ϕ $\rightarrow$ g ϕ . sk.							
112.50-120.00	7.50	Relativt grovk. amf. b. a. meget massiv							
120.00-123.50	3.50	Massiv amf(g ϕ) b. a. fink. til middelkornig.							
123.50-127.00	3.50	Grovk. amf. - massiv.							
127.00-129.60	2.60	Massiv middelk. til fink. amf.							
129.60-132.10	2.50	Massiv amf $\rightarrow$ g ϕ m/fsp flekker.							
132.10-132.80	0.70	Tett fink. g ϕ . Svakt amfibolittisk.v/ 132.65 et 5 cm impr. bånd m/po -cp impr.							
132.80-134.90	2.10	Grovk. amf - massiv.							
134.90-135.05	0.15	G ϕ -g ϕ . sk. amfibolittisk.							
135.05-135.85	0.80	Svak impr. po + cp i fsp. rik g ϕ $\rightarrow$ g ϕ . sk		0, -	0,28	0,04		5,53	x
135.85-136.30	0.45	Massiv g ϕ -amf. Steril							
136.30-136.45	0.15	Lys fsp rik b. a. - amf-g ϕ . Steril							
136.45-136.70	0.25	Svak impr. po + cp i fsp. rik g ϕ -g ϕ . sk		0,05	0,29	0,05		4,28	x
136.70-139.00	2.30	Vekslende g ϕ -amf- massiv.							
137.60-137.70	0.10	Noe po + cp impr. i g ϕ . sk.							
139.00-139.80	0.80	Mørk, massiv middelk - fink amf.							
139.80-140.85	1.05	G ϕ - rel massiv.							
140.85-143.65	2.80	Litt impr. -po +cp i veksl. amf. g ϕ -g ϕ . sk.		0, -	0,08	spor		7,66	x
143.65-144.55	0.90	Meget dårlig impr. i g ϕ		0,09	0,04	spor		1,98	x
144.55-144.80	0.25	Rel. bra impr. i g ϕ . sk		0, -	0,16	0,09		13,66	x
144.80-145.30	0.50	Massiv -fink. amf.-g ϕ .							

Lokallitet : Rieppe

Dato :

21/7-76 IL

Koordinater :

Retning :

Ø

Helling/stigning :

60°

Høyde :

1000 moh.

Lengde :

193 m

Borehull : 3-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
145.30-148.50	3.20	Gø. sk (amfibolittisk) stedvis noe po impr.							
148.50-149.40	0.90	Rel. massiv amf. gø.							
149.40-151.40	2.00	Tynn impr. po + cp i gø. sk		0,17	0,29	0,08		5,87	x
151.40-152.15	0.75	Dårlig ujevn impr. i gø → gø. sk.		0,08	0,12	0,11		4,62	x
152.15-152.60	0.45	Rel. bra impr. i gø. sk. po + cp.		0,05	0,13	0,02		18,77	x
152.60-154.00	1.40	Gø. sk → gø, m/ujevn impr. po + cp.		0,-	0,06	0,-		2,40	x
154.00-154.60	0.60	En del impr. i gø. sk. po + cp.		0,-	0,36	0,07		7,37	x
154.60-155.40	0.80	Massiv amf/gø nær steril		0,-	0,05	0,04		1,59	x
155.40-156.10	0.70	Noe impr. i gø → gø. sk. po + cp.		0,-	0,13	0,03		4,58	x
156.10-157.95	1.85	Jevn, impr. i gø. sk. -kl. sk-talkig po + cp		0,07	0,15	0,39		6,55	x
157.95-160.50	2.55	Gø. sk m/fsp. rike lag mm tykke og fsp. flekker, tydelig fsp. rik -gø lagning.							
160.50-162.05	1.55	Rel. massiv amf.-gø							
162.05-162.55	0.50	Noe impr. i gø. sk- lys, mye fsp		0,-	0,01	0,17		3,38	x
162.55-163.20	0.65	Middelk. → fink. amf.							
163.20-163.30	0.10	Mørk. amf.							
163.30-164.30	1.00	Gø. rel massiv m/fsp flekker							
164.30-168.40	4.10	Gø-gø. sk tynne fsp (mm) bånd og fsp-flekker. Stedvis litt po. 165.15-165.40 } grovk. amf. 165.65-165.80 }							
168.40-168.80	0.80	En del impr. po + cp i gø. sk.							
168.80-169.10	0.30	Gø. m/flekker av fsp.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 27/7-70 IL

Koordinater :

Borehull : 3-70

Retning : Ø

Helling/stigning : 60°

Høyde : 1000 moh.

Lengde : 193 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
169.10-171.50	2.40	Lys fsp. rik (meget) gø → gø. sk. Litt py +(po).							
171.50-174.30	2.80	Noe impr. i fsp. b.a. -kv. sitt. py		0, -	0, 12	0, 10		5, 15	x
174.30-177.50	3.20	Noe ----- " -----		0, 22	0, 03	0, 38		6, 25	x
177.50-179.00	1.50	Lys fsp. b.a. delvis laminert kv. sitt litt py. impr.		0, 08	0, 03	0, 03		2, 99	x
179.00-179.80	0.80	Gø → gø. sk.							
179.80-183.00	3.20	Noe py impr. kv. sittisk b.a. -fsp kv. sitt		0, -	0, 08	0, 02		4, 13	x
183.00-186.00	3.00	En god del py i fsp kv. sitt.		0, -	0, 04	0, 05		5, 70	x
186.00-189.10	3.10	----- " -----		0, -	0, 04	0, 02		4, 61	x
189.10-190.50	1.40	Kvartsittisk i begynnelsen, delvis gø. sk så gl. sk.							
190.50-193.00	2.50	Veksl. gø. mest m/fsp flekker og fsp/kv i tynne lag, også massiv gø. (svakt amfibolittsik).							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Borehull : 3B-70

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : lodd

Høyde : $\sim$ 900 moh.Lengde : $\sim$ 252,10 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.-2.30	2.30	Kjernetap							
2.30-4.10	1.80	Gø-amf- m/fsp-kv utsvetn.							
4.10-4.80	0.70	Massiv gø. amf.m/fsp xx.							
4.80-12.20	7.40	Vekslende- gø. sk-amf. sk ($\sim$ 45°)							
12.20-13.50	1.30	Gø. sk-gø-amfibolittisk m/fsp xx event. tynne lyse bånd av fsp.-kvarts.							
13.50-17.45	3.95	Veksl. gø. sk amf. sk opptil 5 cm bånd m/gø-amf. som har fsp. xx.							
17.45-17.70	0.25	En del impr. po + cp i gø. sk-amf. sk.		0.17	0.13	0.01		2.83	x
17.70-19.70	2.00	Gø-amf m/fsp.xx-delvis sterkt foldet.							
19.70-20.50	0.80	Massiv amf./gø							
20.50-22.00	1.50	Massiv amf. m/spredte fsp.xx.							
22.00-24.10	2.10	Vekslende amf.-gø. Til dels m/foldede fsp utsvetninger.							
24.10-25.60	1.50	En del impr. delvis rel. bra i gø. sk foldet kv. fsp rik po + cp - stedvis noen gr.		0.02	0.27	0.03		7.23	x
25.60-27.00	1.40	Ujevn impr. i amfibolittisk gø $\rightarrow$ gø sk. -po + cp. Ved 26.55. en cm tykk spr. fylling m/cp. skifrihet $\sim$ 30°.		0.38	12.89	0.26		14.33	x
27.00-29.00	2.00	Ujevn rel. tynn impr. po + cp., amf gø sk. til amf.		0.05	0.20	0.04		12.77	x
29.00-29.50	0.50	Amf-sk $\rightarrow$ gø.							
29.50-29.60	0.10	Svak impr. i gø. sk.							
29.60-33.15	3.55	Vekslende gø-amf.							
33.15-33.45	0.30	En del impr. i gø. sk po + cp.		0.08	0.13	0.06		5.39	x

Borehull : 3B-70

Retning :

Helling/stigning : lodd

Høyde : ~ 900 m0h.

Lengde : ~ 252,10 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.45-34.25	0.80	Steril gø. sk - gø. Svakt amfibolittisk							
34.25-35.15	0.90	Jevn impr. i foldet gø. sk-klorittisk til talkig po + cp.		0.10	0.19	0.05		7.59	x
35.15-37.00	1.85	Vekslende gø. sk-gø. Litt po v/35.80.							
37.00-45.00	8.00	Amf-gø-relativt massiv. Stedvis småfoldet							
45.00-46.60	1.60	Gø - gø. sk- skifrig foldet.							
46.60-48.00	1.40	Massiv middelk amf.							
48.00-48.90	0.90	48.00 - 48.30-Gø. sk m/impr po + cp - ditto 48.70-48.90. 48.30-48.70- Melkekv. og fsp utsvetn po + cp.		0.38	0.12	0.04		3.12	x
48.90-55.70	6.80	Vekslende massiv amf til amf gø. sk							
52.75-52.90	0.15	Endel po+cp impr. i gø. sk.							x
53.35-53.50	0.15	----- " -----		0.09	0.39	0.03		7.04	x
54.10-54.40	0.30	----- " ----- også gø. sk 54.40-54.70 uten impr.							x
55.70-56.50	0.80	Grovk. amf							
56.50-56.65	0.15	Melkekv.							
56.65-58.30	1.65	Middelkornig amf rel. massiv.							
58.30-59.20	0.90	Gø → gø. sk							
59.20-59.45	0.25	Grovk. amf.							
59.45-62.50	3.05	Vekslende gø. sk → amf. sk. foldet. Stedvis litt po som pkt. og spr. fyllinger.							
62.50-62.60	0.10	Gr. amf.							
62.60-67.80	5.20	Meget svak impr. av po (cp) i gø. sk til amf. sk.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Koordinater :

Retning :

Borehull : 3B-70

Helling/stigning : lodd

Høyde : 900 moh.

Lengde : 252,10 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
68.65-68.80	0.15	En del impr. po + cp i gø. sk	}	0.08	0.79	0.13		6.96	x
69.50-69.60	0.10	----- " -----							.
68.80-69.50	0.70	Middelk. steril amf.							
69.60-69.70	0.10	Uholdig gø. sk- amf. sk.							
69.70-70.50	0.80	Grovk. amf							
70.50-70.65	0.15	Foldet amf. sk.							x
70.65-72.75	2.10	En del bra po + cp impr. i gø. sk. Skifrihet 0.60° 30° gj. sn.		0.02	0.18	0.05		4.13	x
72.75-74.05	1.30	Ujevn impr. uholdig massiv amf til til impr. gø. sk. Skifrihet. 0-60°, 30° gj. sn.							
74.05-77.70	3.65	Vekslende amf. sk → gø. sk. Stedvis litt po som impregn. + tynne ($\frac{1}{2}$ cm) bånd på lagplan.							
77.70-78.30	0.60	En del impr. - vesentlig po i gø. sk.		0, -	0.07	0.05		7.15	x
78.30-80.30	2.00	Gø. sk - amf. sk. Stedvis litt po.							
80.30-81.60	1.30	Middelk. → fink. massiv amf.							
81.60-81.80	0.20	Nær massiv malm po + cp. Gø. sk filler		0, -	0.34	0.02		38.01	x
81.80-89.00	7.20	Vekls. go. sk. - amf. bånd med vesentlig po impr. i gø. sk. og gø. (Det beste slås sammen i en analyse)							
83.85-84.00	0.15	Po. impr. i gø. sk.	}						
84.85-85.20	0.35	--- " ---		0, -	0.11	0.02		4.95	x
85.65-86.00	0.35	--- " ---							
88.10-88.25	0.15	--- " ---							.

Lokalitet : Rieppe

Borehull : 3B-70

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : lodd

Høyde : () 900 moh.

Lengde : 252.10 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
89.00-94.40	5.40	Amf. m/fsp xx- middelkornig							
99.40-95.00	0.60	Rel. massiv fink. amf.							
95.00-95.50	0.50	En god del po- litt cp i gø-amf. sk		0. -	0.19	0.01		11.06	x
95.50-98.00	2.50	Rel massiv amf. - dels m/noen få fsp xx.							
98.00-98.90	0.90	Vekslende amf m/fsp xx til gø, kl. sk m/noe po.							
98.90-102.80	3.90	Vekslende <u>a</u> mf - gø. rel massiv.							
102.80-103.40	0.60	Kjernetap							
103.40-104.10	0.70	Amf.							
104.10-107.20	3.10	Gø-amf med fsp xx spredt-rel. massiv							
107.20-111.40	4.20	Vekslende amfibolittisk gø mm- $\frac{1}{2}$ cm tykk fsp (kv.) lag . Også opptil 10 cm gø. sk. lag.							
111.40-111.75	0.35	Gø-amf m/fsp xx ganske tekt.							
111.75-117.00	5.25	Vekslende Amf → amfibolittisk gø og gø. sk. Klyser og lag med fsp.							
117.00-117.30	0.30	Gø. sk m/svak po. impr. (cp)							
117.30-117.70	0.40	Gø. sk m/fsp lag (mm) og xx.							
117.70-118.10	0.40	Middelkornig til fink. amf.							
118.10-118.75	0.65	Gø. sk - amfibolittisk m/fsp lag (mm) og xx av fsp							
118.75-119.40	0.65	Amfibolittisk gø → amf.							
119.40-119.60	0.20	Noe po impr. i gø. sk. (cp).							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : lodd

Høyde : 900 moh.

Lengde : 252,10 m

Borehull : 3B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
119.60-122.50	2.90	Massiv amfibolittisk gø							
122.50-123.60	1.10	Gø-amf m/fsp xx							
123.60-124.25	0.65	Massiv amfibolittisk gø							
124.25-125.90	1.65	Massiv gø-amf m/fsp xx og årer av fsp.							
125.90-126.60	0.70	Massiv fink. amf.							
126.60-130.80	4.20	Grovk. amf. b.a.							
130.80-131.00	0.30	Amf.							
131.00-132.10	1.10	Grovk. amf. b.a.							
132.10-159.60	27.50	Vekslende amf → amf gø-delvis skifrig. Utsvettede fsp-klyser og fsp lag forek. 140.00-140.30 Noe po (+cp) impr. i gø. sk.							
159.60-161.40	1.80	Ujevn mineralisering, vesentlig po i opptil 5 cm massivbånd. Gø.sk- amf. b.a. med 2-3 mm lange nåler-gø.		0, -	0,16	0,06		7,94	x
161.40-161.70	0.30	Fink. amf. Steril							
161.70-161.90	0.20	Fsp. utsvetn. m/store (cm) amf-nåler Steril.							
161.90-164.75	2.85	Ujevn meget svak impr. i gø og gø.sk- delvis også amf. Dessuten po i opptil 2 cm bånd med ubetydelig cp		0, -	0,10	0,05		3,15	x
164.75-167.30	2.55	Gø.amf. m/po impr. i cm tykke bånd.							
167.30-167.60	0.30	Jevn po impr. i gø sk.							
167.60-168.75	1.15	Gø.sk → amf sl. og amf-gø.							
168.75-168.80	0.05	Fsp. utsvetn m/po + cp klyser							
168.80-173.05	4.25	Vekslende amf.gø. til dels gø.sk. Noen steder litt po.							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Koordinater :

Retning :

Borehull: 3B-70

Helling/stigning: lodd

Høyde : 900 m

Lengde : 252.10 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
173.05-173.90	0.85	Grovk. amf. b.a. m/litt po							
173.90-184.60	10.70	Vekslende Gø-Gø.sk og amf. Noen po-flekke							
175.50-175.70	0.20	Noe impr. i gø.sk. <u>po</u> + (cp)		0.05	0.23	0.09		3.66	x
176.10-176.30	0.20	---- " ----							x
184.60-185.00	0.40	Grovk. amf.							
185.00-198.70	4.70	Vekslende gø-amf.sk. m/årer av fsp og fsp på lagplan							
198.70-190.25	1.55	Gø.sk-kl.sk							
190.25-191.30	1.05	" m/impr. av po-(cp). Lys ba.		0.02	0.09	0.20		3.88	x
191.30-194.20	2.90	" delvis korte stykker m/amf sk. Lys b.a. Impregn av litt po og <u>py</u> .							
194.20-196.80	2.60	Mørk gø.sk. m/ <u>py</u> impregn. i opptil cm store xx.							
196.80-197.60	0.80	Lys gø.sk. Delvis klorittisk. Po.impr. + litt py.							
197.60-201.90	4.30	Gø.sk-delvis også gø. Noen få små po-korn.							
201.90-204.00	2.10	En del impr. av po og py i lys gø.sk. klorittisk og talkig		0.05	0.08	0.19		9.91	x
204.00-207.00	3.00	Py.impr. i lys talk./kl.sk.b.a.		0.-	0.03	0.18		4.31	x
207.00-209.90	2.90	"		0.-	0.03	0.29		3.66	x
209.90-216.70	6.80	Gø-gø.sk også m/gl.rike lag - bio. Stedvis noe po og py.							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Borehull : 3B-70

Koordinater :

Retning : 7

Helling/stigning : lodd

Høyde : 900 m

Lengde : 252.10 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
216.70-217.50	0.80	Gl. sk.							
217.50-245.50	28.00	Vekslende Gø-amf-oftest skifrig . Stedvis ubetydelig po-impr. Hele vegen fsp og fsp lag og spr fyllinger.							
245.50-252.10	6.60	Massiv gø→gø.sk. Noen få fsp xx.							

Lokalitet : Rieppe

Borehull : 4-70

Dato : 12.8-70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning : 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 202 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0-1.70	1.70	Kjernetap							
170- 7.75	6.05	Amf. middelk. v/ 4.50 et gø. sk.lag på 5 cm. Ellers tynne sk.-soner							
7.75-8.90	1.15	Gø. sk- kl. sk. m/ujevn svak impr. po + cp + litt py . Sk.også delvis talkig		0.02	0.18	0.10		3.39	x
8.90-9.60	0.70	Gø. sk - kl. sk m/tynne gø.lag.							
9.60-11.80	2.20	Fink. amf-skifrig- svakt gø-aktig stedvis							
11.80-11.90	0.10	CaCO ₃ utsvetning m/korn av po og cp							
11.90-1230	0.40	Grovk. til middelk. amf- grovk i midten v/12.05 en CaCO ₃ + fsp utsvetn. m/po.							
12.30-13.70	1.40	Amf. delvis skifrig- delvis sterkt foldet Impr. bånd ved 12.50, 12.80 og 13.20 po + cp							
13.70-13.80	0.10	Sterk foldet b.a. lyse kv.fsp bånd i gø. sk							
13.80-15.30	1.50	Amf → amfibolittisk gø. Fsp klyser og fsp flekker enkelte steder.							
15.30-15.70	0.40	Gr.amf m/fsp bånd på opptil ved $\frac{1}{2}$ cm. Foldet (pen fold) Litt po + cp.							
15.70-16.10	0.40	Sterkt foldet gø. sk m/fsp bånd-hyppig. Noe impr. av po + cp							
16.10-16.55	0.45	Amf. sk.							
16.55-16.65	0.10	Gø. sk - kl →talkig m/impr. po + cp							
16.65-19.45	2.80	Veksl. amf - gø. sk, også massiv amf i 20-30 cm soner.							
19.45-19.70	0.25	Gr.amf.							
19.70-19.85	0.15	Gø-gø. sk							

Lokalitet : Rieppe

Dato : 12.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 202 m

Borehull : 4-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Bevexm Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.85-20.00	0.15	Gø.sk m/hyppige fsp bånd, noen gr. og rel.bra impr. po + cp. (ikke verdt analyse)							
20.00-23.20	3.20	Amf → gø.sk - tydelig foldet- små "drag-foldes" og større. Noen lagplan m/po + cp							
20.60-20.70	0.10	Gr. amf.							
23.20-23.55	0.35	Gø.sk m/gr. rel. spredt. Litt po + cp på lagplan.							
23.55-24.00	0.45	Amf. tettpakket av fsp xx							
24.00-24.20	0.20	Amf (sk) po + cp i 2 mm tykt lag på sk. plan							
24.20-24.50	0.30	Anf-gø.sk med hyppige fsp. bånd og gr. Ubetydelig po + cp.							
24.50-28.00	3.50	Vekslende amf → gø.sk stedvis tynne impr. bånd po + py + cp. Disse er "åpne" (utlutet ?). Også fsp-rike lag, et sted også også fsp xx i amf. i 10 cm mekt. (25.80-25.90). B.a. er foldet.							
28.00-30.00	2.00	Rel. massiv fink. amf. - mørk.							
30.00--31.20	1.20	Amf. rel.skifrig.							
31.20-31.40	0.20	-- " -- Litt impr. po + cp på lagplan		0.00	0.49	0.07		5.08	x
31.40-31.55	0.15	Melkekv. rusten pkt. m/po + cp.							x
31.55-31.90	0.35	Gø.sk m/impr. po + cp.							x

Lokalitet : Rieppe

Dato : 12.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning : 60°

Høyde : 900 moh.

Lengde : 202 m

Borehull : 4-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.90-35.40	3.50	Veksl. amf. gø. sk noen steder litt po.							
35.40-36.90	1.50	Rel. massiv fink. amf.							
36.90-37.40	0.50	Amf. sk.							
37.40-37.60	0.20	Grovk. amf.							
37.60-45.40	7.80	Vekslande amf. sk. og underordnet tynne gø. sk horisonter. Også stedvis cm tykke fsp. bånd- konk. skifriheten.							
45.40-48.00	2.60	Rel. massiv fink. - middelk. amf. Et par steder fsp klyser. V. 46.90 større fsp. klyse m. amf nåler på opptil $\frac{1}{2}$ cm.							
48.00-49.70	1.70	Amf. skifer. (gø. sk).							
49.70-50.80	1.10	Gø. sk → kl. sk - svakt talkig.							
50.80-51.10	0.30	" → amf. sk.							
51.10-51.30	0.20	Fink. amf.							
51.30-53.55	2.25	Grovk. amf.							
53.55-53.70	0.15	Gø. sk m/noe impr. av po + cp.							
53.70-54.10	0.40	Gø. sk							
54.10-54.35	0.25	Fsp. klyse utsvetning i amf. - gø. sk m/po + cp		0.07	2.43	0.05		11.04	x
54.35-57.10	2.75	Veksl. amf. - gø. sk- rel. homogen							
57.10-57.80	0.70	Veksl. fink. massiv amf. → amf. sk.							
57.80-58.40	0.60	Amf. sk.							
58.40-58.60	0.20	Rel bra. impr. i gø. sk → kl. sk. po + cp		0.07	0.42	0.31		14.97	x
58.60-59.50	0.90	Amf- gø. sk.							
59.50-59.80	0.30	Gø-kl. sk m/impr. av po + cp, svak							

Lokaltet: Rieppe

Dato

12.8.70

Borehull: 4-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 202 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.80-60.00	0.20	Amf. sk.							
60.00-62.10	2.10	Fink. rel. massiv amf. Stedvis mm. tykke fsp lag på lagplan.							
62.10-66.50	4.40	Amf. sk m/hyppige fsp utsvetninger på opptil 2 cm							
66.50-66.90	0.40	Massiv fin- middelk. amf.							
66.90-67.90	1.00	Amf./gø. sk.							
67.90-68.00	0.10	Impr. i gø. sk - svak, vesentlig po.							
68.00-68.10	0.10	Gø. sk.							
68.10-80.10	12.00	Veksl. amf. fink. massiv vesentlig, v/79.30 3-4 cm fsp utsvetn. ellers rel. homogen. Enkelte steder svakt skifrig.							
80.10-80.50	0.40	Amf. sk. m/opptil 2-3 mm fsp-bånd på lagplan.							
80.50-81.50	1.00	Amf. rel. massiv. v/80.75 og 80.85 tynne impr. soner.							
81.50-82.65	1.15	Amf. skifrig til massiv en god del fsp klyser og bånd parallell lagningen.							
82.65-82.75	0.10	Fsp klyse m/litt po i flekker							
82.75-83.80	1.05	Sterkt vekslende Amf → amf. sk. → gø. sk m/fsp klyser v/83.50 . Noe impr. po + cp i gø. sk, foldet							
83.80-98.10	14.30	Vekslende amf. sk. stedvis rel. massiv fink. amf. også helt underordnet gø. sk. v/86.40 - 2 cm fsp klyse. (også v/93.55). v/95/70 et 3 cm impr. bånd po + cp.							

Lokalitet: Rieppe

Borehull: 4-70

USB/1650/47B

Dato : 12.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde : ~ 900 moh

Lengde : 202 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Provean Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
98.10- 98.40	0.30	Amf. sk. (lcit)							
98.40- 99.80	1.40	Amf. sk. og gø. sk. Jevne overganger 50-50							
99.80-101.20	1.40	Vesentlig amf. sk. men også tynne lag m/gø. sk.							
101.20-101.60	0.40	Gø. sk. (101.20-101.40 -også klorittisk)							
101.60-102.60	1.00	Amf. sk. — rel. massiv fink. amf.							
102.60-103.60	1.00	Grovk. amf. ved 103.40. Spr. fyllinger m/sulfider (tynne) po + cp.							
103.60-103.90	0.30	Gø. sk. foldet med en del bra impr. av po og cp. Foldet b. a.	40°	0.05	0.09	0.49		10.16	x
103.90-105.00	1.10	Ujevn impr. i gø. sk. Stedvis rel. bra po + cp. Foldet b. a.	$20-30^{\circ}$	0.05	0.11	0.19		5.93	x
105.00-107.70	2.70	Noen steder litt impr. i amf. sk. og gø. sk. stedvis rel. massiv po + cp.		0.07	0.04	0.06		3.44	x
107.70-108.20	0.50	Rel. bra impr. i gø. sk delvis klorittisk, po + cp.	$10-30^{\circ}$	0.07	0.16	0.45		8.90	x
108.20-109.20	1.00	Meget god impr. eller "massiv-malm". Po + cp (sl?). Sterkt tektonisert b. a. skiferfiller flyter i sulfidene. Ba. gø-kl. sk, også talk sk.		0.00	1.18	3.87		23.79	x
109.20-110.00	0.80	Rel. svak impr. av po + cp i kl. sk, foldet og svakt talkig. Hovedskiffrighet.	$10-20^{\circ}$	0.00	0.19	0.07		7.00	x
110.00-111.20	1.20	Gø. sk $\rightarrow$ kl. sk. - foldet. Skiffrighet gj. sn. Ubet. impr.	20°	0.05	0.13	0.05		6.74	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 12.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60° Høyde : ~ 900 moh

Lengde : 202 m

Borehull: 4-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
111.20-113.00	1.80	Noe impr. - rel. svak po + cp i gø.sk. Fsp.rik b.a. Fsp. forekommer i bånd. Ved 113.00 m er b.a. sterkt foldet.		0.02	0.18	0.06		7.35	x
113.00-113.70	0.70	B.a. er sterkt foldet. Gø.sk. m/fsp rike bånd. Fra 113.40-113.60 forefinnes samme fsp.rike bånd i kjernen. Sterkt småfoldet - meget svak impr.		0.19	0.07	0.07		4.99	x
113.70-115.90	2.20	Svak impr. i gø.sk. delvis klorittisk. Tildels sterkt foldet po + cp.	10-20°	0.14	0.21	0.07		5.08	x
115.90-118.00	2.10	Svak ujevn impr. i gø.sk. po + cp. Impr. mest i de mest skifrige b.a. soner. V/117.35-117.90 - 5 cm bånd med melkekvarter.	20°	0.22	0.10	0.07		4.55	x
118.00-119.50	1.50	Svak ujevn impr. i gø.sk po+ cp		0.09	0.09	0.08		5.88	x
119.50-120.45	0.95	En del impr. i gø.sk og delvis klorittisk po + cp. Fra 119.50-119.70 melkekvarter + fsp m/sulfidflekke		0.00	0.25	0.11		7.75	x
120.45-125.00	4.55	Gø.sk rel. vekslende m/fsp. bånd tynne (2-3 mm) og 2-3 cm tykke utsvetninger av fsp-kv. Stedvis ubet. impr. v/123.15 best po + cp + sl.	10-15°						
125.00-131.30	6.30	Rel. homogen gø.sk - delvis klorittisk noen få meget spredte prikker av sulfider.	20°						
131.30-134.00	2.70	Gø.sk m/en del impr. po + cp - Jevn impr.	20°	0.07	0.07	0.24		4.33	x
134.00-136.80	2.80	----- noe --- " -----	20°	0.10	0.05	0.13		3.13	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 12.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60° Høyde : $\approx$ 900 moh

Lengde : 202 m

Borehull: 4-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
136.80-137.90	1.10	Massiv fink. amf. - steril							x
137.90-140.00	2.10	Gø.sk m/litt impr. Jevn po + cp. B.a. er foldet og knudret.	20°						
140.00-142.10	2.10	Gø.sk m/litt impr., noe vekslende po + cp, foldet, knudret.	20°	0.00	0.04	0.07		3.45	x
142.10-143.20	1.10	Gø.sk., foldet knudret m/ujevn impr. po + cp.	20°	0.02	0.06	0.06		6.68	x
143.20-147.05	2.75	Massiv grovk. amf. et par sulfidflekker po							
147.05-147.50	0.45	Massiv gø.							
147.50-149.00	1.50	Foldet knudret go.sk m/litt impr. av po + cp.	30°	0.00	0.11	0.43		3.79	x
149.00-150.70	1.70	Gø.sk.-nær steril, v/149.65 et 2-3 cm impr. bånd <u>po</u> + sl.							
150.70-151.60	0.90	Gø.sk. m/innblanding av opptil 2-3 cm tykke gl.sk-lag.							
151.60-152.20	0.60	Gø-gø.sk.							
152.20-153.50	1.30	Middelk.-grovk. massiv amf., mest grovk. i sentrale del.							
153.50-156.00	2.50	Veksl. gø $\rightarrow$ gø.sk (kan være svak klorittisk).							
156.00-156.80	0.80	Gø.sk. m/meget svak po impr.	20°						
156.80-159.20	2.40	Veksl. gø.sk (gø), v/158.50 en 10 cm impr. sone <u>po</u> + cp.	20°						

Lokantet: Rieppe

Dato : 12. 8. 70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 202 m

Borehull: 4-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
159.20-159.70	0.50	Grovk. amf. b.a. v/159.25-store grønne amf.nåler.							
159.20-159.50	0.30	Hyppig fsp xx - flekker i b.a.							
159.70-160.75	1.05	Massiv rel. mørk gø.							
160.75-163.40	2.65	Gø-gø. sk S. 20°. Noen få sulfidflekker							
163.40-170.00	6.60	Kv. sitt b.a. også vekslende med gø-gø. sk. Kv. sitten har gø.sk.filler. Sterkt foldet b.a. Impr. v/165.90, 166.60-166.85, 167.00-168.00. Denne er rel. svak, mest po. men også cp.							
170.00-170.40	0.40	Massiv gø m/fsp xx							
170.40-171.05	0.65	Gø. sk $\rightarrow$ kv. sitt.							
171.05-171.90	0.85	Sterkt foldet kv. sitt b.a. m/gø. sk i tynne (mm) lag. Litt po.							
171.90-172.00	0.10	Sterkt foldet gø. sk m/ en god del po+(cp)							
172.00-178.40	6.40	Kv. sitt b.a. m/svakt innbl. av gø. sk							
178.40-180.00	1.60	Sterkt tekt. vesentl. kv.sitt. med mellomlegg av gø. sk. Noen flekker po.							
180.00-202.00	22.00	Hele tiden hovedsaklig kv. sitt og kv. sittisk gø.b.a. Delvis sterkt foldet og sterkt tektonisert. Stedvis noe po (cp + sl). i tynne soner (10-15 cm).							

Lokamet: Rieppe

Dato : 20.8.70 IL

Borehull: 4B-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 78°

Høyde :

Lengde : 158. m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.1-60	1.60	Kj. tap							
1.60-7.20	5.60	Vesentl. amf. sk. men også litt gø. sk.							
7.20-8.60	1.40	Gø-amf. sk.							
8.60-8.80	0.20	Jevn impr. av po + cp. sk. ($S \sim 30^{\circ}$) (sl)		0, -	0, 12	0, 04		3, 24	x
8.80-13.45	4.65	Sterkt foldet amf- gø. sk.							
13.45-13.75	0.30	(Amf) - gø. sk. m/sulfider (litt) po + cp.							x
13.75-16.35	2.60	Amf-gø. sk							
16.35-16.60	0.25	Kv. fsp rik sk. b.a. også noen gr. Kv.- fsp i opptil 2-3 cm tykke bånd.		0, -	0, 32	0, 03		8, 57	x
16.60-16.90	0.30	Gr. amf,							
16.90-18.20	1.30	Amf. b.a. massiv - skifrig mest opp mot 18.0 m.							
18.20-18.50	0.30	Noen sulfider vesentl. po i gø(amf) sk.							x
18.50-19.00	0.50	Vesentl. gø. sk.							
19.00-19.90	0.90	Gø.amf. sk.							
19.90-20.00	0.10	Sulfidimpr. i foldet amf. gø. sk. po + cp							x
20.00-22.10	2.10	Vesentl. amf. sk. en del foldet, noen fsp -cc utsvetn.							
22.10-22.45	0.40	Gø. sk							
22.45-22.65	0.10	Impr. i gø. sk - et par gr.							x
22.65-23.30	0.65	Gø. sk- m/gr. noen steder litt po.							
23.30-24.10	0.80	Amf. gø. sk							
24.10-27.00	2.90	Gø. sk til dels m/cc klyser et par steder noen po flekker. V/26.60 noen gr.							

Lokaltet: Rieppe

Borehull: 4B-70

USB/1650/47B

Dato : 20.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 78°

Høyde :

Lengde : 158 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Brøye xx Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.00-29.00	2.00	Gø. b. a. m/fsp xx.							
29.00-33.00	4.00	Svakt skifrig gø. b. a. (Amf)-gø. sk.							
29.95-30.00	0.05	Impr. ov po + cp.							
33.00-33.50	0.50	Gø b. a. rel. massiv . Noen få spredte fsp xx.							
33.50-34.10	0.60	Amf. gø. sk b. a.							
34.10-35.10	1.00	Rel. massiv amf.							
35.10-41.00	5.90	Veksl. amf. gø. sk. b. a. V/39.40-39.50 sone av fink. gø. m/store amf.nåler. cc + fsp.							
41.00-42.00	1.00	En noe mere massiv gø. amf.							
42.00-47.15	5.15	Veksl. amf. sk. → gø. sk. også stedvis litt mere massiv gø. amf b. a.							
47.15-47.70	0.55	Massiv , middel - grovk. amf (gabbro).							
47.70-48.95	1.25	Amf. - gø. sk.							
48.95-49.50	0.55	Sterkt foldet og tekt. b. a. m/impr. av po + cp, rel bra.		0, -	0,66	0,04		8,12	x
49.50-50.10	0.60	Massiv middelk. → fink. amf.							
50.10-52.35	2.25	Vesentl. amf. - amf. sk. også litt gø. sk vekslende							
52.35-53.30	0.95	Meget grovk. amf.							
53.30-55.20	1.90	Amf. — gø. sk.							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 20.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 78°

Høyde :

Lengde : 158 m

Borehull: 4B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve nr. Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
55.20-56.20	1.00	Ujevne sulfidflekke i gø. b. a. veks. fra skifrig til massiv po + cp, også ren cp i større pkt.		0, -	0,43	0,01		5,64	x
56.20-59.60	3.40	Gø. sk i rel. tynne soner og en nær massiv gø ellers. Noen sulfidflekke og bånd.							
59.60-60.00	0.40	Rel. fink. massiv amf.							
60.00-61.30	1.30	Grovk. amf. Stedvis også middelk.							
61.30-65.20	3.90	Amfibolittisk gø, v/62.30 gø. sk m/noe po.							
65.20-65.60	0.40	Massiv rel. fink. amf.							
65.60-66.50	0.90	Amf. b. a. sterkt tekt. og foldet m/fsp klyser							
66.50-67.00	0.50	Amf. b. a. med klyser av fsp/cc. Ba, er massiv. I klysene sitter sulfidminr. po + cp.		0, -	0,04	0,03		2,10	x
67.00-68.20	1.20	Amf, rel. massiv m/fsp klyser.							
68.20-69.70	1.50	Rel. massiv et par steder middelk. amf.							
69.70-69.90	0.20	Gø. sk. bløt, m/impr. av sulfider.							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 20.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 78°

Høyde :

Lengde : 158 m

Borehull: 4B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
69.90-70.75	0.85	Bløt talk. kl. sk. Noen po. korn (cp)	45°	0, -	0,10	0,05		6,78	x
70.75-72.40	1.65	Ujevn minr. i bånd/spr. i gø-gø. sk.		0, -	0,07	0,00		3,47	x
72.40-74.40	2.00	Gø. rel. massiv noen få spr. fyllinger med vesentlig po (cp)							
74.40-74.60	0.20	Fsp. amf. b.a. med en del sulfider po + py + (cp).							
75.90-76.00	0.10	" "							
74.60-76.70	2.10	Gø og gø. sk. Noen steder i tynnere (5 cm) impr. litt po.							
76.70-77.10	0.40	v/76.80 god cp anrikning , men dette synes å være nokså lokalt.		0, -	0,31	0,03		6,49	x
77.10-82.70	5.60	Rel. massiv gø b.a. Noen steder noen po flekker men så godt som steril.							
82.70-83.00	0.30	Amf. b.a. m/kv. fsp klyser m/noe po.							
83.00-83.30	0.30	Gø.amf. b.a. - litt po i $\frac{1}{2}$ cm bånd.							
83.30-83.40	0.10	Kv.fsp. utsvetning m/noe po.							
83.40-84.10	0.70	Gø m/fsp xx jevnt fordelt . Meget finfordelte po flekker.							

Lokallitet: Kjepppe

Dato : 21. 9. 70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 78°

Høyde :

Lengde : 158 m

Borehull: 4B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
84.10-85.00	0.90	Massiv amf. fink.							
85.00-87.60	2.60	Gø-gø. sk noen steder m/fsp xx.							
87.60-87.75	0.15	Impr. i gø. sk vesentl. po, også cp							x
87.75-88.90	1.15	v/88.25 en cp-flekk 5 mm ² . <u>A</u> .mf-gø.							
88.90-89.00	0.10	Rik cp-po impr. i gø. sk.							x
89.00-93.15	4.15	Veksl. gø.amf- stedvis noen tynne soner m/fsp utsvetn.		0, -	0,63	0,12		4,92	x
93.15-93.50	0.35	Cp-po impr. i gø-amf. sk bra impr.							x
93.50-100.20	6.70	Veksl. gø.amf rel. massiv. Stedvis mindre fsp. utsvetn. Årer. v/96.85 et 3 cm fsp kv. bånd m/po.							
100.20-104.10	3.90	Veksl. gø.sk-amf sk. m/hyppige tynne fsp band og lag. v/103.20 et 10 cm impr. band, po + litt cp.							
104.10-106.10	2.00	Gø-amf. m/fsp xx , og fsp utsvetn.							
106.10-108.60	2.50	Veksl. gø-stedvis m/soner som har fsp xx . v/106.30 en sone m/grove amf. nåler cm-lange. po-flekke m/cp.							
108.60-108.75	0.15	Impr. og bånd av po + cp		0,05	0,26	0,14		5,70	x
108.75-109.50	0.70	Steril gø-gø. sk.							

Lokallitet: Rieppe

Dato : 20.8.70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 78°

Høyde :

Lengde : 158 m

Borehull: 4B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove- Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
109.50-109.70	0.20	Bra impr. av po + cp i foldet gø. sk.		0,05	0,26	0,14		5,70	x
109.70-110.80	1.10	Ujevn sulfidimpr. vesentl. i bånd		0, -	0,12	0,03		5,41	x
110.80-114.20	3.40	Gø-og gø. sk Noen tynne fsp bånd utsvetn. litt po i flekker.							
114.20-115.90	1.70	Spredt ujevn impr. po + cp i veksl. gø → gø. sk-amf.		0, -	0,07	0,03		2,17	x
115.90-117.60	1.70	Amf. "middelk-gø-gø. sk. noen få sulfid-flekker							
117.60-118.40	0.80	En del ujevn impr. i foldet gø. sk.		0,05	0,01	0,03		2,50	x
118.40-119.60	1.20	Uholdig amf-gø.		0, -	0,02	0,03		2,33	x
119.60-120.20	0.60	Ujevn noe meget god impr. i gø. gø. sk. foldet po + cp + sl.		0,10	0,39	0,33		6,08	x
120.20-121.00	0.80	Meget god malm-nær massiv. po + sl + cp i gø-gø. sk.		0, -	2,37	6,36		31,77	x
121.00-122.00	1.00	Ujevn tynn impr. - stedvis bra -gø. sk our. cp+po+sl.		0, -	0,54	0,44		6,82	x
122.00-123.00	1.00	God impr. og til dels massiv malm. (122.70-123.00) po -sl + cp. I foldet talk. kl. sk.		0,15	1,24	3,83		25,50	x

Lokantet: Rieppe

Dato : 20.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 78°

Høyde :

Lengde : 158 m

Borehull: 4B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove max Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
123.00-123.70	0.70	God impr. i talk kl. sk. po-sl-cp.		0,05	0,78	1,58		11,97	x
123.70-125.10	1.40	En del impr. i gø. sk og talk kl. sk. po + cp + sl.		0, -	0,46	0,27		8,23	x
125.10-126.80	1.70	Ujevn impr. i massiv gø-gø. sk		0, -	0,26	0,05		5,70	
126.80-128.20	1.40	Dårlig impr. og til dels sterile partier veksl. amf-gø. sk. -talk kl. sk.		0,07	0,32	0,03		3,36	x
128.20-128.90	0.70	Noen pene cp flekker + sl+po i gø. sk. vesentlig.		0,05	0,07	0,11		4,69	x
128.90-130.70	1.80	Steril gø. sk. -amf. sk.							
130.70+132.10	1.40	Tynn impr. i flekker av po-sl-cp		0,07	0,18	0,15		2,88	x
132.10-134.50	2.40	En del impr. - stedvis bra po-cp, -sl.		0, -	0,78	0,16		3,40	x
134.50-137.00	2.50	Gø-talk kl. sk. - noe impr. po + cp+sl sans.rel. dårlig		0,02	0,06	0,98		4,07	x
137.00-139.00	2.00	— " —		0,05	0,06	0,45		3,24	x
139.00-140.20	1.20	Steril talk kl. gø. sk.							
140.20-141.30	1.10	Gø. talk. kl. sk. noen po flekker							
141.30-142.50	1.20	Grovk. amf. noen po. flekker							
142.50-145.00	2.50	En del po -sl. flekker i gø-talk. kl. sk.		0, -	0,05	0,04		4,07	x
145.00-148.00	3.00	Veksl. massiv grovk. amf. gø-gø. sk.							
148.00-158.00	10.00	Massiv grov amf. Ett par steder noe po.							

Lokalitet: Rieppe

Borehull: Bh-5-70

USB/1650/47B

Dato : 23.9.70 I. L.

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 65°

Høyde : 1000 moh

Lengde : 209 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 -1.50	1.50	Kj.tap.							
1.50-10.00	8.50	Veksl. amf.sk.-gø. aktig stedvis. Noen tynne fsp flekker og årer/lag. Kj.tap 2-3 m- 50 cm 3-4 m- 60 cm 4-5 m- 50 cm 5-6 m- 10 cm 6-7 m- 20 cm 7-8 m- 80 cm 8-9 m- 10 cm 9-10m - 70 cm							
10.00-10.20	0.20	Kj.tap.							
10.20-40.00	29.80	Veksl. amf → amf.sk. en del sprekke- fyllinger av calcit/fsp. v/19.40. En del fsp. i lag og noen sulfidkorn po (cp). Sprekkene som omtalt går gjerne ll kjerneaksen el. med meget liten vinkel til denne. v/39.00-39.20 er en spr. m/cc. langs kjernen.							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 23.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 65°

Høyde : $\sim$ 1000 moh

Lengde : 209 m

Borehull: Bh-5-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.00-49.00	9.00	Vekslende amf-amf. sk. Delvis også middelk. massiv. Kj.tap. 40-41 m- 10 cm 41-42 m- 10 cm 42-43 m- 30 cm 43-44 m- 20 cm 44-45 m- 10 cm 45-46 m- 10 cm 46-47 m- 25 cm 47-48 m- 10 cm v/ 41.50-42.10 - en langsgående spr. fylt m/cc. v/43.00-43.20 - " v/ 46.00-46.35 - en cm tykk calcit-sleppe sprekk. v/47.00-48.00 - langsgående cc sprekk. Opp mot 49.00 - en blanding amf. sk- gø. sk.							
49.00-50.00	1.00	Gø. sk - amf. sk. Kj.tap: 20 cm.							

Lokalitet: Rieppe

Borehull: Bh-5-70

USB/1650/47B

Dato : 23.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 65°

Høyde : ~ 1000 moh

Lengde : 209 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prospekt Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
50.00-51.60	1.60	Gø. sk- amf. sk. V/50.65 et 2cm tykt po. band							
51.60-51.80	0.20	Svak impr. i gø. sk, po + cp.							x
51.80-52.20	0.40	Gø. sk		0.05	0.30	0.02		3.59	x
52.20-53.65	1.45	Fink. massiv amf.							
53.65-53.75	0.10	Et cm tykt foldet sulfidbånd i massiv amf.							x
53.75-55.70	1.95	Massiv fink. amf.							
55.70-57.10	1.40	Amf. sk. og fink. middelk. amf. noen få po-korn							
57.10-57.60	0.50	Gø.-sk $\rightarrow$ amf. sk.							
57.60-63.15	5.55.	Fink. massiv amf. $\rightarrow$ amf. sk. Et par steder obs. po. korn							
63.15-63.25	0.10	Svak impr. po + cp i gø. sk- talkig kl. rittisk.							
63.25-63.55	0.30	Gø. sk							x
63.55-63.80	0.25	En del impr. og sulfider i mm tykke bånd i kv. fsp rik gø. sk.		0, -	0.24	0.03		6.67	x
63.80-69.50	5.70	Det meste middelk. amf. men vekslende med amf. sk.							
69.50-72.40	2.90	Veksl. gø $\rightarrow$ gø. sk- noe amfibolittisk							
72.40-77.30	4.90	Rel. massiv amfibolittisk gø. Stedvis sprekker nær ll kjerneaksen							

Lokaltet: Rieppe

Dato: 25.7.70

Borehull: Bh-5-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 65°

Høyde : 1000 moh

Lengde : 209 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
77.30-77.40	0.10	Svak impr. po + cp i gø. sk							x
77.40-77.70	0.30	Amf./gø.							x
77.70-78.35	0.65	Tynn impr. i gø-gø. sk-svakt amfibolittisk							x
78.35-78.85	0.50	Veksl. gø. sk (amf)- gr. amf. En tynn impr. po + cp.							x
78.85-79.10	0.25	Bra (impr.)-minr. po + cp i kv. fsp . rik gø. amf. sk.		0.07	0.19	0.04		3.28	x
79.10-79.65	0.55	Gø. amf og amf → gø. sk-steril							x
79.65-80.05	0.40	En del impr. i gr. amf. gø. sk. m/kv. fsp klyse		0.12	2.33	0.06		7.69	x
80.05-82.80	2.75	Amf- amf skifer og gø. sk.							x
82.80-83.00	1.20	Impr. av po - cp i gø. sk. (talkig -kl)							x
83.00-83.10	0.10	Gø + kv. klyse - steril							x
83.10-83.35	0.25	Bra cp-po impr. i gø-sk-amf-sk og et band (5 cm) med gr. amf.		0, -	0.42	0.06		7.58	x
83.35-83.75	0.40	Svak impr. i gø. sk → amf. sk. cp + po		0,05	0,11	0,03		3,60	x
83.75-85.10	1.35	Amf - amf. sk. - nær steril							
85.10-87.80	2.70	Ujevn minr. i tynne bånd , pent med cp-gø-gø. sk. stedvis m/fsp xx.		0,05	0,33	0,02		3,03	x
87.80-88.85	1.05	Steril gø. amf m/spr. av cc langsgående på aksen.							
88.85-89.70	0.85	Svak impr. i gø → amf. sk. po + cp.		0.02	0.20	0.02		3.21	x
89.70-97.00	7.30	Veksl. amf → amf. gø. rel. massiv til dels også skifrig. Langsgående cc spr : 91.50-93.30, 93.70-94.00 Et impr. bånd i gø. sk 92.05-92.25 - vesentlig po.							

Borehull: Bh-5-70

USB/1650/47B

Koordinater :
 Retning : ϕ
 Helling/stigning: 65°
 Høyde : ≈ 1000 moh
 Lengde : 209 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Proven Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
97.00-98.65	1.65	Ujevn minr. i klyser i $\frac{1}{2}$ mm bånd.		0, -	0,16	0,05		5.02	x
98.65-99.35	0.70	Steril amf. $\rightarrow$ gø							
99.35-99.70	0.35	En del impr. i kv-fsp rik gø. sk. - gø- Kv/fsp utsvetn.		0.05	0.24	0.06		9.91	x
99.70-100.50	0.80	Gø-gø. sk svakt amfibolittisk - nær steril, men noen få po prikker.							
100.50-102.00	1.50	Amf og amf. sk - oppsprukket . Kj. tap 100.50-101.00 - 10 cm 101.00-102.00 - 40 cm							
102.00-102.05	0.05	Gø. sk.							
102.05-102.20	0.15	Kj. tap							
102.20-102.50	0.30	Svak po-cp impr. i gø $\rightarrow$ gøsk.		0, -	0.14	0.06		5.20	x
102.50-107.10	4.60	Fink. amf. rel. massiv v/105.65- et 10 cm bånd m/kl-talkig gø. sk							
107.10-107.55	0.45	v/107.30 rikt 5 cm impr. bånd. Ellers svak impr. i gø $\rightarrow$ gø. sk, svakt amfibol- ittisk.							
107.55-108.50	0.95	gø $\rightarrow$ gø sk, -steril-svakt klorittisk		0.05	0.55	0.03		6.67	x
108.50-108.65	0.15	Rel. bra cp - po impr. i gø. sk.							x
108.65-110.20	1.55	Gø-gø sk: steril							
110.20-112.50	2.30	Middelk. $\rightarrow$ fink. rel. massiv amf. gø sk.							
111.30-111.65	0.35	Svak impr. i amfibolittisk gø. sk cp+po							x
112.50-113.60	1.10	Gø. sk $\rightarrow$ amf. sk.		0.05	0.41	0.03		4.07	x
113.60-113.85	0.25	Impr. av po + cp i gø. sk (amfibolittisk- svakt).							x

Lokallitet: Rieppe

Dato : 23.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 65°

Høyde : N 1000 moh

Lengde : 209 m

Borehull: Bh-5-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
113.85-118.15	4.30	Amf → amf. sk. Noen tynne bånd med middelk. massiv amf. v/114.70 et cm bånd m/kv.fsp og po							
118.15-121.00	2.85	Grovk. amf. v/120.30 et cm kv/fsp m/po + cp + oksydisk minr. Ikke magnetisk - sans.ilm.							
121.00-124.50	3.50	Veksl. amf. fink og amf-sk. v/121.70 et 2-3 cm tykt svakt impr. bånd - cp.							
124.50-124.70	0.20	Gø-gø. sk.							
124.70-125.50	0.80	Middelk → fink massiv amf.							
125.50-126.00	0.50	Svak ujevn impr. av po + cp i amfibolittisk gø. sk.		0, -	0.19	0.03		6.22	x
126.00-128.70	2.70	Gø. sk og amf gøsk. v/126.70 og 127.35 noen sulfider i tynt bånd.							
128.70-131.30	2.60	Grovk. — middelk. massiv amf.							
131.30-132.30	1.00	Fink. massiv amf.							
132.30-133.90	1.60	Rel. massiv b.a. veksl. fra amf - gø. v/132.80 - en sulfidklyse i massiv amf po+ cp. Noen få steder noen sulfidkorn.							
133.90-135.70	1.80	Ujevn, men stedvis rel. bra impr. i gø-gø. sk. po - cp		0, 05	0.08	0.05		5.25	x
135.70-136.30	0.60	Meget pen cp impr. i talkig -kl. gø. sk.		0.02	0.78	0.02		4.91	x
136.30-137.00	0.70	Amf. sk- et par småprikker med cp.							
137.00-139.20	2.20	Massiv fink. amf. Langsgående cc fylt sprekk 137.20-137.70.							

Lokamet: Rieppe

Dato 25. 7. 70

Borehull: Bh-5-70

USB/1650/47B

Koordinater :
 Retning : ϕ
 Helling/stigning: 65°
 Høyde : N 1000 moh
 Lengde : 209 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prosent Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
139.20-139.85	0.65	Ujevn minr. stedvis rel. bra impr. i delvis oppsprukket amf-amf. sk.							x
139.85-145.15	5.30	Massiv fink. amf. - stedvis amf. sk. V/124.40 og 124.65 noe sulfider i tynne bånd po - cp							
145.15-145.30	0.15	Impr. i amf. sk.							x
145.30-145.80	0.50	Steril amf.							
145.80-146.15	0.15	En del impr/minr. i amf sk. og gø. sk		0.05	0.15	0.03		5.13	x
146.35-146.50	0.15	----- " -----							
146.15-146.35	0.20	Steril massiv amf.							
146.50-147.00	0.50	"							
147.00-147.30	0.30	En del minr. i et rikt band + på sprekker fylt med cc							x
147.30-149.15	1.85	Massiv fink. amf- 2-3 stk 2-3 mm sulfid bånd (po).							
149.15-149.70	0.55	Amf m/2-3 cm langsgående cc fylling.							
149.70-151.50	1.80	Amf → amf. sk. m/mm tykke langsgående cc-slepper.							
151.50-152.10	0.60	Oppsprukket (langsgående) fsp/cc fylt sprekk							
152.10-155.60	3.60	Amf → gø. sk v/154.90 - 155.00 en kv. fsp klyse.							
155.60-157.00	1.40	Amf- siste meteren har hyppige kv-fsp klyser							
157.00-158.00	1.00	Amf massiv fink.							
158.00-159.20	1.20	" svakt gø. aktig rel. massiv.							
159.20-159.40	0.20	Po-cp impr. i amf/gø → gø. sk		0.02	0.40	0.03		6.56	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 25.9.70 IL

Borehull: Bh-5-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 65°

Høyde : $\sim$ 1000 moh

Lengde : 209 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Ressourss Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
159.40-160.00	0.60	G ϕ $\rightarrow$ g ϕ . sk amfibolittisk m/hyppige fsp xx og kv/fsp bånd.							
160.00-160.10	0.10	En del impr. po + cp i g ϕ $\rightarrow$ amf. sk.							x
160.10-162.20	2.10	Knudret amf-g ϕ . m/spredte fsp xx og fsp-kv-bånd							
162.20-163.70	1.50	Homogen rel. massiv fink amf. (g ϕ).							
163.70-165.30	1.60	Massiv g ϕ . amf m/spredte fsp xx 164.70-165.30 langsgående cc (leirminr) fylt steppe.							
165.30-174.50	9.20	Veksl. g ϕ . sk $\rightarrow$ amf. sk. massiv g ϕ . amf. Noen steder meget spredte fsp xx.							
174.50-175.20	0.70	Meget svak impr. po + cp i g ϕ . sk - amfibolittisk.		0.02	0.03	0.03		2.87	x
175.20-175.50	0.30	Noe bedre impr. i g ϕ $\rightarrow$ g ϕ . sk. po + cp		0. -	0.14	0.02		4.12	x
175.50-177.00	1.50	Ujevn — " —		0.02	0.18	0.57		8.89	x
177.00-178.70	1.70	Rel jevn impr. i g ϕ . sk - svakt klorittisk		0.05	0.10	0.33		5.88	x
178.20-180.60	1.90	Rel bra i impr. i g ϕ . sk ptalkig-kl. <u>po + cp.</u>		0.05	0.34	0.07		10.02	x
180.60-181.75	1.35	180.60-181.10 Massiv fink. amf. m/cp + po på spr. 181.10-181.75 Noen få po - cp korn		0.02	0.16	0.02		3.78	x
181.75-182.70	0.95	En del impr. i g ϕ . sk. talklorittisk, po + cp + (sl). ?		0. -	0.19	0.04		7.13	x
182.70-185.00	2.30	Svak (meget) men jevn impr. i g ϕ . sk (t, kl) po + cp.		0.05	0.25	0.08		5.48	x
185.00-186.50	1.50	— " — " — " —		0. -	0.16	0.06		6.15	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 23.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 65°

Høyde : $\sim$ 1000 moh

Lengde : 209 m

Borehull: Bh-5-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
186.50-187.60	1.10	En del ujevn impr. stedvis cp rik men ellers tynn gø. sk. (t + kl.).		0.07	0.21	0.06		5.43	x
187.60-188.70	1.10	Ujevn v/et par steder bra impr.		0.02	0.51	0.-		5.25	x
188.70-189.10	0.40	Steril gø. sk.							
189.10-198.85	0.75	Gø. amf. vesentlig store og små gr., foldet gø. b. a.							
198.85-190.50	0.65	Gø. sk (t. kl) m/noe impr. po + cp 189.85-190.00) massiv gø m/cp på spr.							
190.50-196.80	6.30	Talk-kl-gø. sk. Noen få steder små sulfidprikker							
196.80-197.10	0.30	Noe mer impr. i ovenfornevnte b. a.							x
197.10-199.00	0.90	Veksl. talk-kl-gø. sk og rel. massiv gø noen sulfidprikker.							
199.00-199.30	0.30	Noe mer sulfidimpr. i massiv gø -amfibolittisk.							
199.30-199.80	0.50	Massiv amf $\rightarrow$ gø		0.07	0.05	0.49		4.52	x
199.80-200.40	0.50	En del impr. i gø. sk po, cp. sl.							x
200.40-201.30	0.90	Massiv gø - en del sk. i begynnelsen							
201.30-209.00	7.70	Massiv grovk. amf (gabbro).							

Lokalitet: Kreppe

Dato : 24.9.70 IL

Borehull: Bh-5B-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 79°

Høyde :

Lengde : 230 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.-1.90	1.90	Jordboring- Kjernetap							
1.90-20.00	18.10	Veksl. amf - amf. sk.							
		Kj. tap: 2 - 3m - 20 cm							
		3 - 4m - 40 cm							
		4 - 5m - 50 cm							
		6 - 7m - 10 cm							
		7 - 8m - 10 cm							
		9 - 10m - 30 cm							
		10 - 11m - 20 cm							
		11 - 12m - 15 cm							
		12 - 13m - 10 cm							
		13--14 m - 20 cm							
		14 - 15 m - 25 cm							
		15 - 16 m - 10 cm							
		16 - 17 m - 20 cm							
		17 - 18 m - 20 cm							
		18 - 19 m - 35 cm							
		19 - 20 m - 20 cm							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 24. 9. 70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 79°

Høyde :

Lengde : 230 m

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove i Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.00-36.00	16.00	Veksl.amf. $\rightarrow$ amf. sk. Enkelte gø. sk bånd v/26.60 en spr. minr. av po-tynn og bare po. Sedvis opptil cm tykke lyse kv/fsp bånd. v/32.60 en 20 cm sone med middels massiv amf.	20°						
36.00-37.00	1.00	20 cm kjerne- amf. sk. 80 cm- kj. tap.							
37.00-40.00	3.00	Veksl. amf. sk $\rightarrow$ gø. sk.							
40.00-41.00	1.00	Amf $\rightarrow$ amf. sk. fsp xx-klyser.							
41.00-44.30	3.30	Veksl. amf.- amf. sk. svakt gø. aktig. Et par steder noen få fsp xx.							
44.30-46.30	2.00	Gø-amf-sk.m/spredte fsp xx							
46.30-47.00	0.70	Fink. amf (gø) sk.							
47.00-48.00	1.00	Amf-(gø) sk. m $\frac{1}{2}$ cm lyse bånd av kv fsp - 3-4 st og spredte i fsp xx.							
48.00-49.60	1.60	Amf-amf. $\rightarrow$ gø. sk. rel. homogen.							
49.60-50.10	0.50	En del impr. i kv/fsp rik. amf $\rightarrow$ gø. sk po + cp		0. - 0. -	0.29 0.254	0.02 0. -		4.14 4.63	x
50.10-55.30	5.20	Middelk. amf. veksl. med amf. sk & g. sk.							
55.30-55.70	0.40	Foldet - sterkt gø $\rightarrow$ amf. sk.							
55.70-56.50	0.90	Noe spredt impr. - sulfidklyser i fink. b. a. amf $\rightarrow$ (gø) po + cp.		0.07 0. -	0.09 0.100	0. - 0.019		1.88 2.61	x
56.50-57.20	0.60	Noe bra impr./minr. i massiv fink. amf ($\rightarrow$ gø) og gø. sk		0. , 0. -	0.14 0.151	0.07 0.098		4.94 6.14	x
57.20-62.10	4.90	Massiv homogen fink. (enkelte steder opp-til middelk). amf (svakt. gø-aktig enkelte steder).							

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Koordinator :

Retning : Ø

Helling/stigning: 79°

Høyde :

Lengde : 230 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Resultat Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
62.10-67.10	5.00	Samme b.a. som ovenfor men med fsp. klyse utsvetn. og gø. sk samt amf. sk. bånd. Kv/fsp klyser : v/62.60, 64.70, 66.50 → m / litt po. v/65.00-65.70 svak impr. i kv/fsp tik amf. → gø. sk.							
67.10-67.40	0.30	En del sulfider i kv/fsp rik b.a. sterkt foldet po + cp							x
67.40-67.70	0.30	Samme b.a. som ovenfor m/cc også uten sulfider.							
67.70-70.80	3.10	Veksl. rel. massiv amf. → amf. sk og tynne bånd m/gø. sk. v/67.90 en spr. fylling m/sulfider vesentl. po		0.07	0.20	0.05		4.98	x
70.80-71.00	0.20	Kv/fsp - klyse m/cc - i gø. sk - amf. sk.							
71.00-71.30	0.30	Gø. sk m/endel sulfidimpr. po + cp							x
71.30-71.80	0.50	Gø. sk → amf. sk.							
71.80-72.50	0.70	Middelk. amf. - gø. sk.							
72.50-73.80	1.30	Gø. sk → amf. sk, v/73.20 gø. sk. m/noen sulfider.							
73.80-77.15	3.25	Grovk. → middelk. amf. v/75.30 et oksydisk minr. impr. - PRØVE							
77.15-77.40	0.25	Fsp-utsvetn og gø m/store amf. nåler (2 cm) noen sulfider i klyser & bånd. po-py-cp		0, -	0,274	0,044		10,12	x
77.40-77.60	0.20	Gø. b.a. m/amf. nåler - opptil 2 cm også fsp/kv-utsvetn.							
77.60-80.00	2.40	Veksl. gø. sk amf. sk. noen få uregelmessige fsp band/klyser/xx							
80.00-80.10	0.10	Meget tynn po impr. i gø. sk.							

Lokantet: Kjeppa

Dato

1970. 7

Borehull: Bh-5B-70

Koordinater :

Retning :

Ø

Helling/stigning:

79°

Høyde :

Lengde :

230 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
80.10-84.10	4.00	Overganger; amf- fink. massiv } like -gø. sk } mye -amf. sk } av hver.							
84.10-84.70	0.60	En del rel. svak impr. av po + cp i gø. sk og gø. sk m/gr.		0, -	0,396	0,013		4,18	x
84.70-85.50	0.80	Til dels meget bra <u>cp</u> minr. i kv/fsp rik (band) gø. sk cp-po 50-50 ca.		0,05	1,91	0,07		9,65	x
85.50-91.00	5.50	Fink. (opp mot middelk) massiv <u>amf</u> (gø). Fsp klyser v/87.10 (m/cc), 87.50, 87.90, 89.50 m/noe po i pkt.							
91.00-93.00	2.00	Middelk. massiv - amf. vesentlig.							
91.85-91.90	0.05	En del impr. (rel svak) i gø. sk og amf gø. sk . po + cp.							x
92.15-92.30	0.15	" " " "		0,09	0,10	0,02		2,69	x
93.00-93.55	0.55	" " " "							x
93.55-94.60	1.05	I opptil 3-4 cm bånd meget ren minr. po - cp. Dette i gø. sk delvis m/granater Gø. sk er fsp kv. rik i bånd							x
94.60-95.00	0.40	Litt impr. - ovenf. beskr. b.a. - po+cp		0.05	0.19	0.03		5.77	x
95.55-95.75	0.20	" " " "							x
95.80-95.55	0.55	Steril gø. sk svakt amfibolittisk							
95.75-98.00	2.25	Gø. sk → gø. Noen få sulfidprikker v/ 96.70- cp. po på spr. mass. gø. v/97.50 po + cp i gø. sk. Et par steder gr v/96.30, 97.10-97.30							

Lokalitet: Rieppe

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Dato : 24.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 79°

Høyde :

Lengde : 230 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
98.00-99.60	1.60	Gø/gø. sk v/98.30 noe cp + po- ubetydelig							
99.60-100.00	0.40	Ujevn minr- impr. i gø. sk. m/kv/fsp bånd po + py + cp		0, -	0,072	0,023		2,37	x
100.00-105.50	5.50	Gø-gø. sk, amfibolittisk til sine steder v/104.50 et 5 cm impr. band i gø. sk po + cp - ubet. p.g.a. steril b.a. omkr.							
105.50-106.00	0.50	Ujevn rel. svak impr. i gø. sk. po + cp Best impr. v/typisk gø. sk. b.a.		0, -	0,09	0,03		4,68	x
106.00-106.60	0.60	Gø og gø. sk - steril		0, -	0,204	0,005		2,77	x
106.60-108.20	1.60	Svak rel. ujevn impr. i gø-gø. sk		0, -	0,34	0,01		3,51	x
108.20-108.65	0.45	Nær steril gø.		0, -	0,042	0,015		2,04	x
108.65-109.70	1.05	En del rel. bra men noe ujevn impr. i gø. sk vesentl. også kv/fsp rik.		0, -	0,17	0,07		8,68	x
109.70-111.10	1.40	Homogen massiv amf (gø)- steril							
111.10-112.40	1.30	Svak impr. i veksl. b.a. - massiv <u>amf.</u> (gø) og gø. sk. po + cp		0, -	0,052	0,008		2,12	x
112.40-115.00	2.60	Jevn impr. i gø. sk po + cp., skifrihet	20-30°	0, -	0,14	0,05		3,71	x

Lokallitet: Rieppe

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Dato : 24.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 79°

Høyde :

Lengde : 230 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve nr. Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
115.00-116.00	1.00	Ujevn impr. i <u>amf</u> gø.og gø. sk po +cp		0, -	0,051	0,018		2,81	{ x
116.75-117.25	0.50	" " " "							
116.00-116.75	0.75	Litt bedre impr. i gø. sk		0, -	0,070	0,005		3,65	x
117.25-119.10	1.85	Gø. sk - amf. sk. m/noen få spredte sulfidkorn po + cp.							
119.10-123.00	3.90	Rel. massiv for det meste middelk. fink. amf.							
123.00-123.70	0.70	Noe ujevn impr. i gø → gø. sk po + cp		0, -	0,379	0, -		3,32	x
123.70-125.95	2.25	Massiv gø-amfibolittisk → gø. sk. noen få po-prikker- små.							
125.95-126.65	0.70	Noe ujevn cp. impr. på spr. og innen tykke lag - også po.		0, -	0,231	0, -		1,57	x
126.65-130.50	3.85	Massiv amf-gø → amf.gø. sk.							
130.50-137.35	6.85	Veksl. amf. sk. - gø. amf. sk. Noen sulfidprikker v/130.50 og 130.75 po+cp. Fsp. klyser v/133.50, 134.20- 134.30 noen po-prikker.							
137.35-137.50	0.15	En del ujevn noe bra impr. po + cp i gø → gø. sk po + cp		0, -	0,491	0,028		3,66	{ x
138.40-138.80	0.40	" " "							
137.50-138.40	0.90	Steril massiv middelk. -fink. amf.og amf. gø.							

Lokalitet: Rieppe

Dato

1979. 7. 11

Koordinater :

Retning :

Ø

Helling/stigning:

79°

Høyde :

Lengde :

230 m

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
138.80-140.35	1.55	Gø. sk → amf. sk.							
140.35-140.75	0.40	Grov amf. pepret m/fsp. klyser & flekker.							
140.75-142.30	1.55	Grovk. til middelk. amf. Et tynt gø. sk band v/141.45. Fsp. klyse v/141.65							
142.30-145.10	2.80	Amf-gø. sk-til rel. massiv gø.-amf.							
145.10-145.30	0.20	Bra cp. impr. i amf-gø. sk po + cp.							x
145.60-145.85	0.25	" " "		0, -	0,286	0,018		5,76	x
146.60-146.90	0.30	" " "							x
145.30-145.60	0.30	Massiv amf. gø m/spredte fsp xx							
145.85-146.60	0.75	" " "							
146.90-149.10	2.20	Fink. massiv, homogen, amfibolittisk gø.							
149.10-149.60	0.50	Ujevn impr. i gø/gø. sk, po + cp.		0,10	0,51	0,01		4,46	x
149.60-150.00	0.40	Gø. sk amfibolittisk	20-30°						
150.00-152.30	2.30	Vesentlig massiv fink. amf. Fsp. klyse v/150.60- noen po-korn.							
152.30-152.60	0.30	En god del sulfider i gø. sk po + cp. Delvis talk-kl. sk.		0, -	1,296	0,018		4,83	x

Lokalitet: Rieppe

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Dato : 24.7.70 IL
Koordinater :
Retning : ϕ
Helling/stigning: 79°
Høyde :
Lengde : 230 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
152.60-153.70	1.10	Massiv gø-til talk kl. gø. sk. Svak 5 cm impr. v/153.60 i talk. kl. gø. sk.							
153.70-155.60	1.90	Skifrig-amf-gø. sk. (mynt-kjerne) og amf-gø-rel.massiv.							
155.60-161.30	5.70	Fink. rel. massiv amf-gø. Tynne soner m/gøsk.							
161.30-161.50	0.20	Noe impr. i gø. sk. po + cp		0, -	0,35	0,03		5,28	{ x x
161.80-162.25	0.45	" " + gø. potcp.							
161.50-161.80	0.30	Steril gø/gø. sk.							
162.25-164.50	1.25	Gø. sk → massiv gø. amf. opp mot 164. 50 noe middelk. amf m/spr. fyll av fsp/kv.							
164.50-164.80	0.30	"Gode" stor po - cp flekker i grovk. amf m/fsp klyser.		0, -	1,639	0,046		3,85	x
164.80-166.20	1.40	En del rel. svak og ujevn i gø/gø. sk. - amfibolittisk		0, -	0,108	0,026		2,89	x
166.20-168.00	1.80	Gø/gø. sk - amfibolittisk v/166.95-167.15 - en god del fsp xx. v/167.50 - et 5 cm impr. po + cp i kv fsp rik b.a.							
168.00-170.30	2.30	Massiv amf-gø m/spredte ujevnt fordelte fsp xx							
170.30-171.00	0.70	Fink. gø-gø. sk - svakt amfibolittisk							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 24.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ°

Helling/stigning: 79°

Høyde :

Lengde : 230 m

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
171.00-171.75	0.75	Bra men noe ujevn impr. - og minr. band i massiv gø → gø. sk. - amfibolittisk, po + cp							{ x
171.75-173.60	1.85	I midten massiv grovk. amf., på endene fink massiv gø/amf.		0, -	0,29	0,03		5,09	
173.60-173.80	0.20	Gø.-amf - m/fsp xx							
173.80-174.00	0.20	Impr, i gø-amf.sk. po - cp							
174.00-180.20	6.20	Veksl. amf gø. sk. og amf. - gø. V/ 174.50 en liten fsp klyse med gø m/ grove amf nåler. 175.70-176.05 langsgående cc-fylt sprekk v/179.80 en 10 cm fsp klyse iblandet gø/po							
180.20-183.00	2.80	Amf. sk. - og en del gø. sk. hyppig fsp i mm tykke bånd.							
183.00-184.00	1.00	Ujevn tynn, impr. - i rel.massiv gø-amf, stedvis noe skifer.		0,07	0,17	0,03		4,34	x
184.00-186.00	2.00	Gø-gø. sk - amfibolittisk							
186.00-188.00	2.00	Jevn impr. i gø. sk. delvis talkig og klorittisk po + cp		0,07	0,39	0,05		5,93	x
188.00-189.00	1.00	Bra " " "		0,02	0,92	0,05		8,84	{ x
188.20-189.70	0.50	" " "							
189.00-189.20	0.20	Svak impr. i gø-gø. sk po + cp.		0, -	0,529	0,015		4,83	{ x
189.70-190.25	0.55	" " "							
190.25-191.00	0.75	En del impr. og cpi mm tykke lag gø + gø. sk. talkig etc.		0, -	0,569	0,005		2,97	x
191.00-194.30	3.30	Tynn impr. og dels 2-3 m tykke spredte lag med sulfider po + cp.		0, -	0,143	0,008		3,12	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 24.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 79°

Høyde :

Lengde : 230 m

Borehull: Bh-5B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
194.30-198.50	4.20	Gø.amf og gø. sk. m/gr. 195.00-195.15 noen sulfider.	10-20°						
195.00-195.15	0.15	Ujevn impr. po + cp							
198.50-199.00	0.50	" "		0,02	0,51	0,04		6,79	{ x x
198.50-198.75	0.25	Massiv fink. gø/amf. m/cp på spr.							
198.75-199.00	0.25	Gr.amf m/fin impr.							
199.00-202.20	3.20	Fink. go → gø.sk v/ 199.80 et 5 cm impr. bånd - po							
202.20-202.70	0.50	Gø. sk og talk kl. sk		0,09	0,04	0,05		2,31	x
202.70-204.00	1.30	Meget tynn impr i talk-gø. sk po + cp+sl		0, -	0,03	0,22		2,41	x
204.00-204.80	0.80	Talk. kl. sk og gø. sk							
204.80-206.00	1.20	Rel. tynn impr. i talk. kl. sk. po + cp+sl		0,07	0,08	0,21		3,02	x
206.00-207.60	1.60	Tynn " " " " " " " "		0,05	0,04	0,19		1,70	x
207.60-209.75	2.15	Rel tynn " " " " " " " "		0,07	0,03	0,05		3,17	x
209.75-211.75	2.00	" " " "		0,02	0,04	0,05		6,04	x
211.75-212.10	0.35	Gø-amf b.a. skifrig - noen po korn							
212.10-220.50	8.60	Grovk. amf. v/214.50 en kv.klyse m/ noe po.							
220.50-222.00	1.50	Talkig kl. gø. sk.							
222.00-224.50	2.50	Svak po impr. vesentl. i gø. sk		0,07	0,11	0,23		3,67	x
224.50-226.30	1.80	" " "		0,159	0,041	0,088		2,89	x
226.30-228.60	2.30	Svak po impr. i gø og gø. sk		0, -	0,03	0, -		4,25	x
228.60-230.00	1.40	gø → gø. sk							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 28.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 150 m

Borehull: Bh-6-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0-2.00	2.00	Jordboring- kjernetap							
2.00-4.60	2.60	Veksl. amf. sk.							
4.60-5.00	0.40	Gr.amf.							
5.00-8.25	3.25	Amf & amf. sk. noen sulfidprikker							
8.25-8.45	0.20	En del ujevn minr. po + cp-massiv amf							x
8.45-8.60	0.15	Gø. sk → amf. sk.		0, -	0,95	0,04		5,39	x
8.60-8.90	0.30	Gr.amf.							
8.90-9.60	0.70	En del impr. stedvis bra po + cp- amf → gø. sk							x
9.60-11.00	1.40	Amf → gø. sk en del impr. po + cp.							x
11.00-11.80	0.80	Nær steril amf.		0.02	0.06	0.02		3.02	x
11.80-12.35	0.55	En del impr. i amf. → amf. sk. <u>po</u> + cp							x
12.35-17.50	5.15	Veksl. amf. rel massiv og amfibolittisk (gø) sk. v/14.70 et $\frac{1}{2}$ cm tykt <u>po</u> -bånd (cp) v/15.35 et 2-3 cm impr. bånd.							
17.50-18.00	0.50	God impr. og til dels nesten massiv malm <u>po</u> + <u>cp</u>		0.05	0.34	0.04		21.98	x
18.00-21.65	3.65	Veksl. amf → amf. sk. og litt gø. sk. Noen få sulfidflekker stedvis.							
21.65-22.00	0.35	En del bra impr. i gø. sk, po + cp		0.12	0.12	0.83		6.42	x
22.00-24.70	2.70	Veksl. amf. sk. & amf.							
24.70-25.60	0.90	Fink. massiv amf.							
25.60-27.00	1.40	Amfibolittisk gø. sk.							
27.00-29.40	2.40	Veksl. amf. - rel massiv m/fsp klyse, veksl. kornstr.							

Lokamet: Kleppe

Borehull: Bh-6-70

USB/1650/47B

Koordinator :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 150 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.40-29.60	0.20	Gø. sk m/noe sulfider impr. - <u>po</u> (cp)							
29.60-32.00	2.40	Amfibolittisk gø, delvis også skifrig							
32.00-35.00	3.00	Amf. sk. men også gø. sk. + overganger delvis fsp. klyser.							
35.00-36.40	1.40	Rel. mass. amf.							
36.40-37.60	1.20	Gø. sk.							
37.60-39.40	1.80	Rel. massiv amf. og amf. sk.							
39.40-39.70	0.30	Stedvis bra impr. og sulfidklyser i kv. fsp-utsvetn. i gø. sk. po + cp.		0. -	0.66	0.07		5.99	x
39.70-41.45	1.75	Rel. massiv fink → middelk. amf.							
41.45-41.70	0.25	En del spr. minr. og i lag i gø → amf. sk. <u>po + cp</u> .		0.07	0.10	0.05		4.57	x
41.70-44.10	2.40	Veksl. amf. sk. → gø. sk også tynne massiv amf. bånd.							
44.10-45.70	1.60	Grovk. → middelk. amf- mest grovk. mot midten. Også her (44.70) kv/fsp m/litt sulfider po + cp.							
45.70-47.50	1.80	Gø. sk → amf. sk.							

Lokallitet: Rieppe

Dato : 28.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 150 m

Borehull: Bh-6-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
47.50-55.00	7.50	Massiv fink. (enkelte steder middelk. amf). v/50.80 og 53.20 litt po (cp)							
55.00-59.10	4.10	Veksl. mass. og sk. amf. Få cm tykke lag / klyser m/fsp. V/56.99 et cm tykt po band. v/55.80-svak sulfid impr.							
59.10-62.00	2.90	Rel. massiv fink. amf. 1-3 fsp utsvetn. pr. m.							
62.00-62.10	0.10	Svak sulfid impr. (po) i gø. sk.							
62.10-63.40	1.30	Rel massiv fink. amf i tynne bånd noe skifrig. V/63.20 en fsp kv. utsvetn m/en sulfidklyse <u>po + cp</u>							
63.40-64.20	0.80	Massiv - gø. m/noen få spredte fsp xx							
64.20-65.20	1.00	Gø. amf. (massiv) m/en god del fspxx							
65.20-67.00	1.80	Veksl. rel. massiv amf → gø. m/fsp/kv utsvetn. og tynnere bånd. V/65.40 et 10 cm gø bånd m/fsp xx							
67.00-69.40	2.40	Massiv gø → amf m/fsp ^{hele} kv. utsvetn. un- tatt (67.65-67.90)							
69.40-71.00	1.60	Massiv fink. amf (gø), noen meget få fsp xx - spredt.							
71.00-71.20	0.20	Kv. fsp. utsvetn. m/sulfider, vesentl. po.							x
71.20-71.95	0.75	Steril fink. amf.							x
71.95-72.40	0.45	En del sulfider <u>po + cp</u> i fink. amf → gø. sk.		0.12	0.19	0.02		2.63	x
72.40-94.70	22.30	Veksl. (svakt) fink. rel. massiv gø-amf. spredte fsp/kv klyser, V/88.50 et cm po bånd, Mot slutten gø. aktig.							

Lokusitet Rieppe

Dato : 28.9.70 IL

Koordinator :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60° Høyde : ~ 900 moh

Lengde : 150 m

Borehull: Bh-6-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
95.00-98.80	3.80	Foldet Gø.amf-sk. Noen fsp-kv.klyser 96.55-96.75 - noen få sulfidprikker po + cp. 96.75-97.00- spredte gr., også 97.25-97.60							
98.80-99.10	0.30	Massiv gø-amf m/mange fsp xx							
99.10-103.00	3.90	Massiv rel. fink. amf. $\rightarrow$ amf.gø.sk							
103.00-103.20	0.20	Gø.sk.							
103.20-104.00	0.80	En del impr. i foldet gø.sk,po + cp		0,-	0.23	0.69		6.89	x
104.00-105.20	1.20	Svak impr. i massiv gø - (svakt amf).		0,-	0.04	0.06		3.02	x
105.20-105.80	0.60	Endel bra impr. po + cp i gø.sk. noe talkig og klorittisk.		0.12	0.11	0.12		5.39	x
105.80-106.25	0.45	Tynn impr. i gø.sk. po + cp		0.02	0.05	0.12		4.85	x
106.25-107.60	1.35	En del impr. po + cp i talkig klorittisk gø.sk.		0.02	0.13	0.07		4.96	x
107.60-108.20	0.60	Bra impr. i gø.sk - svakt talk kloritt- isk,po + cp		0.07	0.20	0.99		8.15	x
108.20-109.20	1.00	" Massiv malm" breksjefiller av talk- kl.sk. po + cp + sl ?		0.07	1.29	2.84		20.04	x
109.20-109.60	0.40	Tynn impr. vesentl. po i gø.sk, <u>tr-kl</u>		0.12	0.09	0.03		5.29	x
109.60-110.80	1.20	God impr. og til dels massiv malm po + cp + sl i gø.sk,talk klorittisk		0.07	1.94	0.11		17.84	x
110.80-111.65	0.85	Massiv amf. Stykkevis steril noen med cp + po på spr.		0,-	0.08	0.05		2.91	x
111.65-113.20	1.55	Ujevn men til dels meget bra impr. i gø.sk po + cp		0.05	0.20	0.04		4.41	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 28.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde : $\approx$ 900 moh

Lengde : 150 m

Borehull: Bh-6-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove- Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
113.20-114.20	1.00	Meget dårlig minr. i massiv gø.		0.07	0.05	0.05		4.07	x
114.20-116.00	1.80	Ujevn ^I stedvis pen impr. po + cp i gø-gø. sk.		0, -	0.28	0.03		10.13	x
116.00-117.50	1.50	Ujevn impr. i gø/gø. sk. m/kv/klyser på 5-10 cm. (116.20-116.30, v/116.75-v/117.15), po + cp.		0.05	0.16	0, -		4.07	x
117.50-119.00	1.50	Tynn impr. i massiv $\rightarrow$ sk. gø po + cp		0.05	0.07	0.03		3.50	x
119.00-121.45	2.45	Så godt som steril gø-amf-kv rik.							
121.45-122.00	0.55	Pen po + cp minr. i kvrik gø. sk.		0.07	1.09	0.05		4.96	x
122.00-122.55	0.55	Steril gø.amf, massiv							
122.55-123.00	0.45	Pen impr. minr. po + cp i kv. rik gø. sk.		0.05	0.83	0.09		3.96	x
123.00-126.20	3.20	Så godt som steril gø. v/124.30 en klyse m/po + cp og en cp-po spr. fylling							
126.20-128.00	1.80	Stykkevis pen minr. po + cp i klorittisk gø. sk.		0.07	0.24	0.04		3.68	x
128.00-129.40	1.40	Talk-kl. - gø. sk noen få po korn							
129.40-130.00	1.60	Talk. kl. sk. m/noen tynne po-band vesentlig.							
130.00-131.70	1.70	Gø. sk. talkig kl. rittisk. nær steril.							
131.70-132.25	0.55	Po + cp i gø. sk - talkig & klorittisk (Splittet sm. v/feiltagelse-regnes nær steril 132.25-133.35.)		0.07	0.06	0.55		3.85	x
132.25-133.35	1.10	Nær steril gø/gø. sk et par mm tykke bånd m/po + sl.							x

Borehull: Bh-6-70

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

φ

60°

600 moh

150 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Resultat Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
133.35-134.30	0.95	Ujevn men stedvis pene klyser m/sl + cp + po.		0.09	0.36	1.72		6.12	x
134.30-135.10	0.80	Steril grovk. amf.							
135.10-135.40	0.30	— " — gφ. sk.							
135.40-136.70	1.30	Po + cp + sl i flekker og tynne lag i gφ. sk		0.09	0.05	0.25		4.52	x
136.70-138.15	1.45	Gφ og gφ. sk foldet							
138.15-139.05	0.90	Gφ-gφ. sk iblandet gl. sk.							
139.05-140.50	1.45	Ujevn po impr. m/sl + cp i gφ-gφ. sk., foldet		0.09	0.03	0.18		4.63	x
140.50-142.30	0.80	Grovk. amf. - nær steril men noen få po flekker - uregelmessig							
142.30-142.40	0.10	To stk. $\frac{1}{2}$ cm po bånd i massiv amf.							
142.40-143.15	0.75	Grovk. massiv amf.- steril.							
143.15-143.65	0.50	En del impr. i gφ. sk vesentlig po + cp + sl.							x
143.65-144.30	0.65	Gφ. sk litt impr. dypest nede - po		0.09	0.05	0.37		5.07	x
144.30-144.50	0.20	Impr. - po + cp i gφ. sk							
144.50-147.20	2.70	Rel. massiv gφ. (amf) → gφ. sk. Stedvis svak impr. og tynne sulfid lag - po							
147.20-148.03	0.83	En del minr. i tynne lag og som impr. po + sl + cp.		0.05	0.07	0.72		5.95	x
148.03-150.00	1.97	Gφ-gφ. sk m/tynne $\frac{1}{2}$ cm spredte po-band- bare po.							

Lokalitet: Rieppe

Dato

8.7.70 IL

Borehull: RP-1-70

Koordinater :

Retning :

φ

Helling/stigning:

60°

Høyde :

N 950 moh

Lengde :

50 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Element Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00-6.70	6.70	Gø. skifer . Ved 0.75 et 5 cm bånd med gr.amf.							
6.70-6.75	0.05	Et bånd med impr. av sulfider po + py							
6.75-8.75	2.00	Gø-skifrig delvis. Noen steder sulfid-pkt. vesentlig po men også py.							
8.75-10.00	1.25	Gø.sk først mest po impr. så går dette mer over til py mot 10.00 m		0.04	0.06	0.23	2.53	4.42	x
10.00-13.00	3.00	Jevn <u>py</u> impr. sans. ikke noe særlig <u>cp</u> men anal. likevel, gø.			0.08	0.16	4.78	5.56	x
13.00-15.65	2.65	Impr. i gø-gø.sk - po+py+cp.			0.18	0.51	3.80	5.71	x
15.00-15.65	0.65	Gø.sk → kl.talk.sk.							
15.65-15.95	0.30	Kjernetap sans. er det at mest av dette er "massiv" malm med lignende gehalt som neste lengde (15.95-16.60)							
15.95-16.60	0.65	"Massiv" malm (50% sulfider N 50 % gråberg) <u>Po</u> + cp + sl. Foldet talk.kl.sk.			1.42	7.23	20.17	25.79	x
16.60-17.50	0.90	Impr. i lys talk.kl.sk. foldet . Jevn 16.30-16.50. Sterk impr. <u>po</u> +cp+sl			0.30	1.33	7.85	11.71	x
17.50-18.80	1.30	Nær steril amf- middelkornig massiv. Ved 18.50 noe <u>po</u> + cp tynt bånd.			0.11	0.11	2.37	4.27	x
18.80-20.00	1.20	Impr. i talk.kl.sk -foldet <u>po</u> + cp			0.46	1.03	4.09	10.28	x

Borehull: RP-1-70

USB/1650/47B

Koordinater :
 Retning : Ø
 Helling/stigning: 60°
 Høyde : N 950 moh
 Lengde : 50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.00-30.00	10.00	Liste over kjernetap: 20-21 20 cm 21-23 0 cm 23-24 60 cm 24-25 10 cm 25-25 10 cm 26-27 35 cm 27-28 20 cm 28-29 0 cm 29-30 10 cm NB! Kjernetap tatt med i Begynnelsen av hver meter.							
20.00-21.70	1.70	Impr. po + cp i foldet talk kl. sk.			0.25	0.89	2.77	5.36	x
21.70-22.50	0.80	Nær steril massiv amf-gø.		0.07	0.25	0.34	3.00	5.06	x
22.30-22.40	0.10	Meget god impr. i lys fsp rik b. a.							
22.40-24.70	2.30	(Mye kjernetap)Svak impr. i talk. kl. sk. Alt vesentlig po.			0.08	0.25	0.96	2.78	x
24.70-25.50	0.80	Ujevn men stedvis meget god impr. - delvis bånd med massiv-malm po + sl + cp.		0.02	0.36	3.75	9.37	14.98	x
25.50-28.00	2.50	Talk kl. sk. stedvis med noe cp og sl + po.		0.07	0.25	0.61	1.77	3.17	x
25.50-25.90	0.40	Nær steril massiv gø. amf.							
28.00-28.90	0.90	Massiv gø. amf - nær steril			0.07	0.03	1.15	2.28	x
28.90-30.00	1.10	Rel. svak impr. po + cp i talk kl. sk.			0.13	0.26	1.46	3.87	x
30.00-40.00	10.00	Kjernetap : 30-31 : 0 cm 31-32 : 10 cm 32-33 : 10 cm 33-34 : 10 cm 34-35 : 40 cm 35-40 : nær 0 cm NB! Kjernetap regnes først på hver m.							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 8.7.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60° Høyde : $\approx$ 950 moh

Lengde : 50 m

Borehull: RP-1-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.00-32.00	2.00	Gø-talk. kl. sk m/impr. jevn, po. Rel. bra med cp. stedvis.			0.19	0.34	2.16	10.16	x
32.00-34.00	2.00	Gø-talk. kl. sk. Rel dårlig impr. po+cp			0.08	0.11	0.98	8.51	x
34.00-35.80	1.80	Ujevn stedvis meget fin impr. av po-cp-sl Talk-kl-gø. sk.			1.32	1.29	4.86	6.81	x
35.80-38.10	2.30	Noe ujevn men god impr. i talk. kl. gø. sk. po + cp + sl			1.80	4.18	13.98	1.98	x
38.10-40.00	1.90	Talk. kl. sk. - Mye talk. ganske lite sulfid impr.							x
40.00-49.10	9.10	<u>Kjernetap:</u> 40-41 m - 60 m 41-49.10 $\approx$ 0 m							
40.00-41.00	1.00	Talk. kl. sk., steril.							
41.00-43.70	2.70	Meget svak impr. i gø. sk - tak sk. sl + po + cp.			0.10	0.29	1.89	3.67	x
43.70-44.70	1.00	Grovk. amf (gø) noen po korn (cp også mikr. pkt).							
44.70-46.60	1.90	Rel. mass. gø.							
46.60-50.00	3.40	Grovk. amf. m/noen po. pkt.							

Lokallitet: Rieppe

Dato : 8.7.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60°

Høyde : 950 moh

Lengde : 50 m

Borehull: RP-2-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00-05.00	5.00	Amfibolittiske gø. Dagfjell med 20-30 % kjernetap.							
5.00-9.50	4.50	Amf.massiv → skifrig.							
9.50-9.75	0.25	Kjernetap							
9.75-10.10	0.35	Gø. skifrig Noen po pkt.							
10.10-11.60	1.50	Mørk amf.- gø massiv → skifrig.							
11.60-13.30	1.70	Gø. sk, ubetydelig po på lagplan							
13.30-16.00	2.70	Jevn impr. av vesentlig py også noe po-gø. sk foldet		0.09	0.07	0.11	2.99	4.12	x
16.00-18.00	2.00	Gø. sk delvis talkig. Impr. av <u>po-py-sl</u> -cp			0.19	0.31	3.77	5.71	x
18.00-20.00	2.00	Talk -kl. sk.m/impr. <u>po</u> - cp. sl			0.12	0.60	4.09	7.82	x
18.20-18.45	0.25	Kjernetap							
19.15-19.50	0.35	Kjernetap							
20.00-22.25	2.25	Talk kl. med delvis god impr. <u>po</u> cp <u>sl</u> -Foldet.			0.43	1.62	6.07	9.74	x
21.75-22.00	0.25	Kjernetap (sans samme minr. som anal)							
22.25-23.10	0.80	Dårlig impr. i massiv amf-gø.			0.07	0.12	1.60	3.57	x
23.10-24.60	1.50	Talk kl. sk. po + cp + sl			0.13	0.27	2.41	6.25	x
23.85-24.00	0.15	Kjernetap							
24.60-25.20	0.60	"Massiv" malm <u>po</u> + sl + cp- Talk kl. sk.filler			1.68	8.97	28.73	37.65	x
25.20-26.30	1.10	Talk kl. sk med en del impr. <u>po</u> + <u>sl</u> + cp.		0.02	0.23	1.04	3.71	6.55	x
26.30-28.25	1.95	Dårlig impr. til dels steril b.a.			0.06	0.20	0.53	2.14	x
26.30-27.10	0.80	Talk. kl. sk.							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 8.7.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde : n) 950 moh

Lengde : n) 50 m

Borehull: RP-2-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.10-28.25	1.15	Amf-gø rel.massiv og mørk							
28.25-30.00	1.75	En del bra impr. i talk. kl. sk → gø. sk. Rel. ujevnt impr.			0.09	0.48	2.44	3.43	x
28.70-28.80	0.10	Kjernetap							
29.00-30.00	1.00	25 cm kjernetap (uvisst hvor)							
30.00-30.50	0.50	Kjernetap							
30.50-32.00	1.50	Talk. kl. sk foldet, med po, cp, sl.		0.05	0.15	0.86	3.79	6.67	x
32.00-33.50	1.50	" " " " Rel. bra impr. po+ sl + cp.		0.22	0.25	1.08	4.81	8.25	x
33.50-33.75	0.25	Kjernetap							
33.75-35.00	1.25	Talk kl. sk med impr. ujevn-stykkevis rel. bra.		0.05	0.28	1.01	3.60	5.88	x
35.00-37.00	2.00	Noe impr. i talk kl. sk po+cp+sl Kjernetap : 35-36 m : 50 cm kjernetap 36-37 m : 25 cm "		0.02	0.12	0.59	1.92	5.49	x
37.00-38.50	1.50	Talk. kl. sk med ujevn rel. bra impr. po + cp + sl.		0.-	0.29	0.61	3.88	6.88	x
38.50-40.10	1.60	Rel. massiv amf, steril-							
40.10-43.10	3.00	Svak impr. i rel. massiv gø-amf.		0.06	0.07	0.57	0.89	2.49	x
43.10-46.50	3.40	Talk kl. sk m en del impr. <u>po</u> + <u>sl</u> cp.		0.-	0.08	0.28	0.73	2.74	x
46.50-50.00	3.50	Gø. sk. Ubet. impr. po (cp).							

Leilighet: Rieppe

Dato: 22.7.70 IL

Borehull: RP-3-70

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Ø

70°

900 moh

50 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.30	0.30	Kjernetap							
0.30-7.40	7.10	Gø, delvis amfibolittisk, stedvis opptil 2 cm fsp/kv. bånd med impr. av po + py + cp.							
7.40-7.70	0.30	Lys, skifrig gø (lys pga.fsp.lag på opptil 1/2 cm).							
7.70-8.80	1.10	Amf.gø.							
8.80-10.00	1.20	Jevn impr. i gø. po+py+cp.		0, -	0.03	0.04	1.88	2.84	x
10.00-13.00	3.00	Noe impr. i gø(sk) Enkelte py-flekke på 1 cm ² størrelse.(Ganske lys b.a., sans m/stort fsp innhold fra 10.00-19.00).		0, -	0.03	0.06	3.71	4.51	x
13.00-16.00	3.00	" " " " "		0, -	0.03	0.11	2.71	3.47	x
16.00-19.00	3.00	" " " " "		0.06	0.08	0.07	3.95	5.29	x
19.00-19.90	0.90	Dårligere impr. i mørkere gø.		0, -	0.13	0.30	2.79	4.27	x
19.90-21.30	1.40	Gø.sk m/opptil 15 cm massiv malmbånd + impr. Massiv malm 19.90-20.00, 20.80-20.95, 21.20-21.25 po malm + sl + cp.		0, -	0.46	4.44	11.08	14.12	x
21.30-22.50	1.20	Gø. nær steril på visse deler- så rel. god impr.		0, -	0.08	0.11	1.29	2.16	x
22.50-26.60	4.10	Uholdig gø, massiv,		0.05	0.11	0.09		2.23	x
26.60-27.30	0.70	Massiv malm fra 26.60-26.80 og 27.10-27.30 po+sl+cp. Mellom dette massiv gø.		0, -	0.36	6.19		25.49	x
27.30-28.40	1.10	Rel. dårlig impr. i gø.		0, -	0.10	0.18		3.63	x
28.40-28.65	0.25	God malm po, cp, sl.		0.18	0.89	3.82		2.65	x

Borehull: RP-3-70

USB/1650

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 70° Høyde : ~ 900 moh

Lengde : 50 m

Dybde	L	Bergart	G	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.65-30.70	2.05	29.80 spr. fyll. ($\frac{1}{2}$ cm) m/ <u>po</u> + cp; massiv uholdig mørk gø.		0,-	0.07	0.05		2.14	x
30.70-33.10	2.40	En del impr. i lys gø. <u>sk</u> , kl og delvis talkholdig <u>po</u> + cp.		0,-	0.26	0.68		7.33	x
33.10-33.40	0.30	Kjernetap							
33.40-34.40	1.00	Gø-gø. sk uten impr.							
34.40-34.60	0.20	Melkøkv. og noe fsp.							
34.60-35.40	0.80	Gø. sk							
35.40-37.00	1.60	Talk.-kl. sk uholdig . Ved 35.90 et $\frac{1}{2}$ cm tykt bånd med impr. av po-cp-sl.							
37.00-38.40	1.40	Gø. sk.- klorittisk							
38.40-40.00	1.60	<u>Talk</u> -kl. sk. opp mot 40.00 en meget ren talk. sk.							
40.00-46.50	6.50	Gø. sk Delvis svakt klorittisk (talkig)							
46.50-46.70	0.20	En del bra impr. po + cp		0.09	1.96	1.85		7.02	x
46.70-48.00	1.30	Massiv rel. grovk. gø.							
48.00-48.50	0.50	Mørk fink. gø.							
48.50-50.00	1.50	Gø. rel. grovk. og massiv.							

Lokalt: Kieppe

Borehull: RP-4-70

USB/1650/47B

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove-analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0-3.70	3.70	Amfibolittisk gø-gø. sk 10% kjernetap							
3.70-7.00	3.30	Gø-Gø. sk med noe impr. po-py-cp-sl		0.10	0.18	0.16		4.91	x
7.00-8.10	1.10	En del bra impr. po + cp i gø. sk foldet		0.09	0.40	0.29		7.56	x
7.65-8.00		Kjernetap							
8.10-9.75	1.65	Massiv malm og meget god impr. Po + sl + cp. B.a er foldet gø. sk - delvis også b.a. fragmenter.		0.03	1.26	9.63		31.23	x
9.75-12.90	3.15	Dårlig impr. i fink. mørk amfibolittisk gø		0.17	0.09	0.46		3.51	x
12.90-14.00	1.10	Mest massiv malm + b.a. bånd på opptil 10 cm. Dette er da gø. sk-klorittisk Po - sl+ cp		0, -	0.09	6.51		26.32	x
14.00-14.25	0.25	Kjernetap- sans. <u>malm</u> massiv. Dette har en på begge ender.							
14.25-15.05	0.80	Meget god malm. po+sl+cp. En del b.a. soner . Gø. sk → mørk massiv gø.		0.09	0.09	9.20		30.18	x
15.05-15.45	0.40	Gø. sk m/svak impr.		0, -	0.21	0.32		7.68	x
15.45-16.50	1.05	Nær massiv malm po+sl+cp m/foldede kl. sk/(talk) sk.fragmenter.		0.10	2.13	12.93		38.24	x
16.50-17.50	1.00	" " " "		0.06	1.42	8.77		35.44	x

Lokantet: Rieppo

Dato: 27.10.1971

Borehull: RP-4-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 50 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.50-18.80	1.30	Rel. dårlig impr. i fink. mørk massiv gø		0,-	0.08	0.13		3.37	x
18.80-19.15	0.35	Rel. god malm m/sk. fragmenter . <u>Po</u> +sl+cp.		0,-	0.09	7.55		31.93	x
19.15-19.45	0.30	Fink. mørk massiv gø		0,-	0.09	0.15		4.26	x
19.45-20.20	0.75	God nær massiv malm m/sk. fragm. foldet (talk-kl-sk) (fra 19.20 m er det 20 cm kjernetap som sans er i malmen fra 19.45 -20.00).		0,-	1.31	8.51		24.21	x
20.20-21.60	1.40	God impr. i talk. kl-gø. sk, po+sl+cp		0,-	0.25	0.54		7.03	x
21.60-22.00	0.40	Kjernetap.							
22.00-22.60	0.60	God impr. i talk. kl-gø. sk po-sl, cp		0,-	0.12	1.11		8.26	x
22.60-22.95	0.35	Kjernetap							
22.95-25.30	2.35	Jevn impr. i Gø. sk → talk. kl. sk. <u>po</u> + sl + cp		0,-	0.19	0.72		12.46	x
25.30-25.60	0.30	Kjernetap							
25.60-27.50	1.90	Noe ujevn men stedvis pen impr. po-sl- cp i gø. sk - talk kl. sk-foldet.		0,-	0.73	1.79		12.46	x
27.50-27.70	0.20	Kjernetap							

Lokalt: Rieppe

Dato: 22.7.70 1L

Borehull: RP-4-70

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

φ

60°

~ 900 moh

50 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prosent Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.70-29.80	2.10	Rel. god impr. i gø. sk -talk kl. sk po + sl + cp		0, -	0.33	1.89		14.73	x
29.80-30.00	0.20	Kjernetap							
30.00-30.95	0.95	Dårlig impr. i gø og gø. sk		0, -	0.22	0.11		4.38	x
30.95-31.30	0.35	Impr. i gø. sk po+sl+cp		0, -	1.07	0.22		11.56	x
31.30-32.00	0.70	Rel. dårlig impr. i gø. sk po + cp		0.09	0.28	0.07		4.65	x
32.00-33.35	1.35	Jevn stedvis po + cp + sl		0, -	0.97	0.65		9.14	x
33.35-33.55	0.20	Kjernetap							
33.55-36.20	2.65	Dårlig impr. i rel. massiv gø		0, -	0.49	0.03		1.96	x
36.20-36.70	0.50	En del impr. i gø. sk		0, -	0.27	0.97		6.07	x
36.70-38.25	1.55	Gø → gø. sk ubetydelig med sulfider							
38.25-38.75	0.50	Kjernetap							
38.75-41.35	2.60	Gø. sk							
41.35-41.75	0.40	Kjernetap							
41.75-45.25	2.50	Gø og gø sk, v/43.50 et 5 cm impr. bånd m/po + sl.							
45.25-46.85	1.60	Rel. svak impr. i gø-gø. sk. Vesentlig po men også sl og cp. Litt talk-kl. sk også.		0, -	0.08	0.51		4.82	x
46.85-50.00	3.15	Massiv rel. grovk. gø. m/spredte flekker av po (meget spredt).							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 27.7.70 IL

Koordinator :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60° Høyde : ~ 900 moh

Lengde : 49.40 m

Borehull: RP-5-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.60	0.60	Kjernetap							
0.60-1.00	0.40	Gø m/noen xx av py							
1.00-2.10	1.10	Gø - dagfjell - rusten på sprekker							
2.10-3.80	1.70	Gø. sk klorittisk og t.d. talkig. En del impr. i skiferen <u>po</u> - cp		0, -	0.14	0.08		4.66	x
3.80-5.00	1.20	Gø. rel. massiv							
5.00-5.20	0.20	En del impr. i gø. sk. <u>po</u> + cp.							
5.20-5.90	0.70	Massiv gø.							
5.90-6.30	0.40	Gø. sk - talk-kl.type m/impr. po+cp- Rel dårlig impr.		0.07	0.12	0.03		7.87	x
6.30-7.10	0.80	Massiv gø.							
7.10-9.00	1.90	Vekslende massiv $\rightarrow$ skifrig gø. gø. sk også klorittisk og talkig po + cp		0.05	0.10	0.07		3.76	x
9.00-10.00		<u>Kjernetap</u> : 8-9 m - 10 cm 9-10m - 20 cm							
9.00-11.00	2.00	En del rel. ujevn impr. i talk. kl. gø. sk <u>po</u> -cp-sl		0.21	0.23	0.76		6.08	x
11.00-14.10	3.10	Vekslende massiv gø og gø. sk. (klorittisk) Noe ujevn impr. spes. i kl. gø. sk po+sl+cp		0.13	0.10	0.38		3.42	x
14.10-14.40	0.30	Kjernetap							
14.40-14.90	0.50	Kl. sk delvis talkig m/impr. av po. cp-sl		0.05	0.18	1.06		7.34	x
14.90-15.75	0.85	Bra impr. og til dels massiv malm. (15-16 m - 10 cm kjernetap). po+cp+sl. B.a. er kl. sk med stedvis ren talk.		0.02	0.77	5.23		19.01	x
15.75-16.50	0.75	Gø m/meget dårlig sulfidinnhold. (16-17 m -10 cm kjernetap. Ved 16.25 et 10 cm bånd m/fsp.-kv. utsvetn + po+cp		0.02	0.12	0.05		3.23	x

Borehull: RP-5-70

USB/1650/47B

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Ø

60°

900 moh

49.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.50-17.05	0.55	En del impr. i kl. sk delvis talkig <u>po</u> +cp + sl		0. -	0.75	4.04		12.55	x
17.05-18.50	1.45	Massiv gø m./meget lite sulfider.		0. -	0.06	0.01		1.69	x
18.50-19.30	0.80	Til dels massiv malm i sterkt foldet <u>talk</u> -kl. sk <u>po</u> - <u>sl</u> - <u>cp</u> . Talken er til dels helt ren og hvit		0. -	1.05	6.41		23.19	x
19.30-19.55	0.25	Talk kl. sk litt impr.		0.04	0.05	0.11		3.61	x
19.55-19.80	0.25	Til dels massiv malm po-cp-sl i <u>talk</u> kl. sk.		0.05	0.71	4.39		20.34	x
19.80-20.50	0.70	<u>Talk</u> sk. lys også klorittisk . Noe impr.		0.05	0.06	0.17		2.51	x
20.50-21.30	0.80	En del god impr. i talk kl. sk po-cp-sl		0.02	0.29	5.03		9.14	x
21.30-23.00	1.70	Talk. kl. sk m. jevn ikke særlig god impr.		0.05	0.12	0.20		4.75	x
23.00-25.00	2.00	Kl. talk. sk " " " " "		0.05	0.07	0.18		3.74	x
25.00-27.00	2.00	Kl. sk delvis talkig nær steril		0.07	0.13	0.28		5.63	x
26.20-26.70	0.50	Kjernetap							
27.00-28.05	1.05	Kl. talk sk. m/noe impr. <u>po</u> ,cp		0. -	0.07	0.08		6.48	x
28.05-29.10	1.05	" " " m/noe bedre impr.		0.18	0.12	0.36		8.25	x
29.10-30.00	0.90	Delvis rel. bra impr. og t.d. tynne soner av massiv malm (2-3 cm) <u>po</u> - <u>sl</u> - <u>cp</u>		0.23	0.19	1.04		8.95	x
30.00-40.00	10.00	Kjernetap : 30 - 31 - 30 cm 31 - 32 - 30 cm 32 - 33 - 15 cm 33 - 34 - 30 cm 34 - 35 - 25 cm umerket, 30 cm merket 35 - 36 - 30 cm 36 - 37 - 15 cm 37 - 38 - 15 cm 38 - 39 - 10 cm 39 - 40 - 10 cm							

Lokalitet: Rieppe

Dato : 27.7.70 DS

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60° Høyde : ≈ 900 moh

Lengde : 49.40 m

Borehull: RP-5-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.00-31.00	1.00	Talk kl. sk m/rel.bra impr. po cp sl		0.05	0.26	0.95		7.34	x
31.00-32.00	1.00	" " " " "		0.02	1.23	2.86		10.08	x
32.00-33.00	1.00	" " " " " , mye sl.		0.34	1.15	4.19		9.69	x
33.00-34.00	1.00	En del impr. i gø. sk		0,-	0.45	0.75		7.81	x
34.00-35.00	1.00	Dårlig impr. i gø		0,-	0.13	0.05		3.61	x
35.00-37.25	2.25	Dårlig impr. i rel. massiv gø.		0.02	0.24	0.06		6.08	x
37.25-38.25	1.00	Nær steril gø		0.07	0.16	0.08		3.08	x
38.25-39.00	0.75	Til dels pene 2 cm tykke bånd med po- cp i gø. sk delvis klorittisk		0,-	0.61	1.27		7.53	x
39.00-40.10	1.10	Kl. sk- talkig m/ svak impr. po-cp -sl.		0,-	0.19	0.09		2.74	x
40.10-41.30	1.20	Massiv gø steril							
41.30-42.40	1.10	Talkig kl. sk. Noen få prikker cp. Ved 42.10 et 5 cm impr. med sl.							
42.40-42.55	0.15	Kjernetap							
42.55-42.90	0.35	Gø. sk. Litt po							
42.90-43.00	0.10	Melkekvarts							
43.00-44.01	1.01	Klorittisk gø. sk							
44.01-44.02	0.01	Et cm-bånd med po-sl i gø. sk							
44.02-45.00	1.98	Gø. sk delvis klorittisk - delvis en gø. noe po.							
45.00-49.40	4.40	Grovk. amf. Kjernetap : 45 - 46 - 20 cm 46 - 47 - 20 cm 47 - 48 - 20 cm							

Lokallitet: Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Borehull: RP-6-70

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Ø

60°

900 moh

49.90 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Revisjon Analyser
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.25	3.25	Gø.-amf.							
3.25-3.60	0.35	Kjernetap							
3.60-4.30	0.70	Gø (amf)							
4.30-4.65	0.35	Kjernetap							
4.65-5.40	0.75	Gø - amf							
5.40-5.55	0.15	Kjernetap							
5.55-6.00	0.45	Gø.-amf							
6.00-6.50	0.50	Kjernetap							
6.50-8.50	2.00	Gø-amf-fra 7.00-8.00 m-25 cm kjernetap							
8.50-8.85	0.35	En del impr. i gø. sk <u>po</u> + cp		0.08	0.38	0.06		6.02	x
8.85-9.10	0.25	Gø-amf.							
9.10-9.50	0.40	Rel.grovk. amf.							
9.50-10.00	0.50	Gø - gø. sk Meget tynn impr. po + cp							
10.00-10.20	0.20	Kjernetap							
10.20-10.90	0.70	Gø - gø. sk svakt amfibolittisk							
10.90-12.00	1.10	(10.97-11.00 - kjernetap) Gø-gø, sk- en del impr. <u>po</u> + cp		0.08	0.06	0.02		3.23	x
12.00-14.50	2.50	Svak impr. jevn po+cp i gø-gø. sk. 12.95-13.00 , 13.88-14.00-Kj.tap.		0, -	0.06	0.03		2.91	x
14.50-15.40	0.90	Noe impr. po + cp i foldet kl. sk		0, -	0.05	0.23		4.04	x
15.40-16.15	0.45	Rel. massiv amf.- nær steril		0.12	0.04	0.07		1.47	x
15.95-16.00	0.05	Kj.tap.							x

Lokantet: Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Kjernetapene her er
sans. ikke riktig plassert

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 49.90 m

Borehull: RP - 6 - 70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.15-16.35	0.20	Gø. sk - kl. sk.							x
16.35-16.50	0.15	Kj. tap							
16.50-18.10	1.60	Lys gø. sk m/jevn impr. po+cp. Kj. tap 17.90-18.00		0, -	0.13	0.12		4.68	x
18.10-20.00	1.90	En del impr. i gø. sk - kl. sk delvis foldet po + cp. Kj. tap : 18.55-18.70 19.85-20.00		0, -	0.09	0.24		6.59	x
20.00-22.00	2.00	Impr. i talk - kl. sk - gø. sk (kj. tap 20.90-21.00, 21.85-22.00) po-cp-sl 20.50-20.60 - steril gø. amf.		0, -	0.23	0.35		10.68	x
22.00-23.00	1.00	Impr. i talk-kl. sk - gø. sk - foldet		0, -	0.66	1.98		8.30	x
23.00-24.15	1.15	Nær steril massiv amf. gø		0, -	0.09	1.30		2.06	x
23.85-24.00	0.15	Kjernetap							
24.15-24.60	0.45	En del bra impr. + 10 cm massiv malm po+ cp - talk kl. sk		0, -	0.35	0.54		17.23	x
24.60-25.00	0.40	Talk. kl. sk. uten impr.		0, -	0.02	0.20		2.91	x
25.00-25.30	0.30	Noe impr. gø-gø. sk po + cp		0, -	0.06	1.51		4.15	x
25.30-26.00	0.70	Kj. tap.							
26.00-26.40	0.40	Massiv amf. nær steril		0, -	0.06	0.06		2.85	x
26.40-28.85	2.45	Talk kl. sk - gø. sk med en del bra impr. po + cp		0, -	0.22	0.83		6.55	x
26.70-27.00	0.70	Kj. tap 27.00-28.00 - 0.15 cm kj. tap.							
28.85-29.00	0.15	Kj. tap.							

Lokamet: Rieppe

Dato : 3.8.70 IL

Borehull: RP-6-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde : 900 moh

Lengde : 49.90 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.00-31.00	2.00	Svak impr. <u>po</u> + cp i gø.sk - talk kl.sk		0, -	0.10	0.19		3.94	x
31.00-31.30	0.30	Kj.tap.							
31.30-32.90	1.60	Noe impr. i talk kl.-gø.sk po+cp		0, -	0.31	1.30		5.15	x
32.90-33.70	0.80	<u>God</u> malm po-cp + sl i sterkt tektonisert talk kl.sk		0, -	0.89	8.65		24.89	x
33.70-34.60	0.90	Ujevn impr. i gø.sk.		0.02	0.13	0.82		8.32	x
34.60-36.00	1.40	Ujevn impr. i gø.sk.svak amfibolittisk		0, -	0.08	0.07		4.19	x
36.00-38.15	2.15	Gø-gø.sk 37-38 m:20cm kj.tap.							
38.15-38.45	0.40	Kj.tap							
38.45-38.70	0.25	Melkekvarts							
38.70-39.95	2.25	Gø-gø.sk							
39.95-40.00	0.05	Kj.tap							
40.00-46.00	6.00	Vekslede Gø-amf-gø.sk. Også melkekv. bånd på opptil 5 cm.							
		Kj.tap : 40.65-40.80							
		43.10-43.40							
		43.95-44.00							
		44.95-45.00							
		44.95-46.00							
46.00-48.65	2.65	Gø.sk - kl.sk - delvis talkig.							
46.75-47.00	0.25	Kjernetap							
47.95-48.00	0.05	"							
48.65-49.10	0.45	"							
49.10-49.90	0.80	Gø.amf.							

Lokallitet: Rieppe

Dato: 20.8.70 IL

Borehull: RP-7-70

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60°

Høyde :

Lengde : 42.40 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve nr Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.60	0.60	Kj.tap							
0.60-3.20	2.60	Gø-amf til dels m/fsp xx							
3.20-3.85	0.65	Kjernetap							
3.85-5.90	2.05	Amf-gø og gø.sk som er til dels sterkt foldet.							
5.90-6.00	0.10	Kj.tap							
6.00-7.20	1.20	Amf-gø.							
6.40-6.50	0.10	Kjernetap							
7.20-8.60	1.40	Ujevn impr. - rel. dårlig i gø.sk,po+cp		0.05	0.06	0.05		3.49	x
7.85-8.00	0.15	Kj.tap							
8.60-9.30	0.70	Massiv amf.gø - fink. noen po.korn		0.07	0.17	0.03		3.22	x
8.90-9.00	0.10	Kj.tap							
9.30-10.00	0.70	Bra impr. stedvis , men ujevn po + cp i gø.sk. - foldet		0,-	0.08	0.11		4.33	x
10.00-12.10	2.10	Noen få flekker po også litt py i gø- stedvis meget massiv.		0,-	0.06	0.03		3.49	x
12.10-12.85	0.75	Ujevn impr. po + cp i gø-gø.sk		0.02	0.11	0.02		3.38	x
12.85-13.80	0.95	Ujevn rel. bra impr. po + cp +(sl) i gø.sk.		0,-	0.15	0.04		4.71	x

Lokaltet: Rieppe

Dato : 20.8.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ Helling/stigning: 60°

Høyde :

Lengde : 42.40 m

Borehull: RP-7-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.80-14.00	0.20	Kj.tap							
14.00-15.15	1.15	Ujevn men noe meget bra impr. i g ϕ . sk- kl. sk også delvis talkig po + cp.		0.02	0.15	0.80		7.62	x
15.15-15.40	0.25	Kj.tap							
15.40-15.85	0.45	Nær uholdig. g ϕ m/årer av CaCO_3		0.02	0.15	0.11		4.93	x
15.85-16.00	0.15	God impr. i g ϕ . sk		0.-	0.25	3.42		13.55	x
16.00-16.50	0.50	Kjernetape							
16.50-17.10	0.60	Tynn impr. i g ϕ . sk		0.-	0.23	0.69		7.78	x
17.10-18.05	0.95	(Meget) god malm nær massiv <u>po</u> + <u>cp</u> + <u>sl</u> .		0.07	0.24	6.85		17.55	x
18.05-18.80	0.75	Massiv g ϕ - uholdig		0.-	0.49	1.17		3.67	x
18.25-18.40	0.15	Kj.tap							
18.80-19.80	1.00	En del sulfider helst i flekker po+cp+sl Sl. forekommer stedvis i store xx		0.09	0.12	2.93		9.11	x
19.80-20.00	0.20	Steril g ϕ .							
20.00-20.15	0.15	Kj.tap							
20.15-22.80	2.05	G ϕ -g ϕ . sk m/ujevn impr. og tynne opptil 1 cm bånd m/sulfider po+cp+sl.		0.05	0.21	0.44		3.93	x
21.00-21.15	0.15	Kj.tap							
21.95-22.00	0.05	Kj.tap							
22.80-23.20	0.40	Kj.tap							
23.20-30.00	6.80	Veksl. g ϕ . også noe få steder skifrig b.a.							
24.15-24.35	0.20	Kj.tap							

Lokalitet: Rieppe

Borehull: RP-7-70

USB/1650 /47B

Dato: 2010.70
 Koordinator :
 Retning : ϕ
 Helling/stigning: 60°
 Høyde :
 Lengde : 42.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.85-25.00	0.15	Kj. tap							
27.65-27.75	0.10	Kj. tap							
28.55-28.65	0.10	Kj. tap							
28.50-28.55	0.05	Melkekv.							
30.00-30.70	0.70	Gø-gø. sk							
30.70-31.30	0.60	Kj. tap							
31.30-31.40	0.10	Gø. sk m/ 2 stk 2 mm tykke cp bånd.							
31.40-36.00	4.60	Gø. sk - v/35.70 noen små sl. flekker							
32.80-32.90	0.10	Kj. tap.							
34.15-34.60	0.45	Kj. tap							
36.00-38.20	2.20	Amf. gø. sk							
37.40-37.60	0.20	Kj. tap							
38.20-39.00	0.80	Ujevn impr. po + sl + cp i gø. sk		0.07	0.05	0.79		6.95	x
39.00-40.65	1.65	Gø. sk							
39.25-39.35	0.10	Kj. tap							
40.65-41.00	0.35	Kj. tap							
41.00-42.00	1.00	Gø. sk noen få prikker m/sulfider							
42.00-42.40	0.40	Amf.- gø. sk - rel. mørk Litt po.							

Lokallitet: Rieppe

Borehull: RP-8-70

USB/1650/47B

Dato : 21.7.70
 Koordinater :
 Retning : ϕ
 Helling/stigning: 70°
 Høyde :
 Lengde : 25.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.75	0.75	Kj. tap							
0.75-8.10	7.35	Amfibolittisk gø., rel. mørk. Kj. tap: 1.90-2.00 3.70-3.85 4.45-4.70 5.40-5.50 7.60-7.75							
8.10-9.20	1.10	Kj. tap 8.55-8.80 Talk. kl. sk m/svak impr. po + (cp)		0. -	0.18	0.15		6.11	x
9.20-9.35	0.15	Kj. tap							
9.35-10.50	0.15	Gø. sk, - nær steril							
10.50-11.40	0.90	Gø. sk, talk klorittisk m/po + cp		0. -	0.21	0.12		8.40	x
11.40-15.20	3.80	Gø. sk Gø. sk talk, klorittisk stedvis Kj. tap: 11.50-12.40 12.35-12.65 14.20-14.60							

Lokament: Rieppe

Dato: 19. 7. 1971

Borehull: RP-8-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 70°

Høyde :

Lengde : 25.10 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.20-15.80	0.60	En del ujevn og delvis meget pen impr. men en god del kj. tap her også. Talk kl. sk.foldet		0.14	0.96	2.85		20.89	x
15.80-17.00	1.20	En god del impr. po + cp - kv.fsp utsvetn. i gø.sk							
		Kj.tap 16.40-16.70		0.02	0.21	0.32		10.40	x
17.00-18.40	1.40	En del ujevn impr. po + cp i gø.sk		0.07	0.25	0.76		6.44	x
18.40-18.50	0.10	Kj.tap							
18.50-19.30	0.80	Svak ujevn impr. i gø.sk (en 3 cm kv. utsvetn).		0.09	0.11	0.31		5.71	x
19.30-19.60	0.30	Kj.tap							
19.60-25.10	5.50	Veksl. gø.sk.m/kv-fsp.utsvetn. Enkelte cm tykke po bånd med litt cp.							

Lokamet: Rieppe

Dato 22.4.70 IL

Borehull: RP-8B-70

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : 7 800 moh

Lengde : 34.80 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.0 - 0.35	0.35	Kj.tap							
0.35-6.00	5.65	Rel. massiv fink - middelk. amf. Et sted i en kv/fsp klyse, noe po - cp Kj.tap 1.45-1.85 2.80-3.00							
6.00-8.00	2.00	Amf. skifer (gø. sk) meget mørk og fink.							
8.00-10.00	2.00	Amf. rel. massiv v/8.75 et cm tykt kv/fsp bånd m/noen sulfider po(cp) Kj.tap 9.20-9.35							x
10.00-11.95	1.95	Gø-gø.sk.amfibolittisk. Stedvis klyser med po (cp)- helst i den mest sk. b. a.		0.05	0.05	0.03		4.67	x
11.95-12.50	0.55	Noe bedre impr. i gø.-gøsk. Po-cp-sl. Beste impr/minr. opp mot 12.50		0, -	0.61	0.54		7.95	x
12.50-13.20	0.70	Kjernetap- desverre							
13.20-14.00	0.80	En del impr. vesentlig po i gø. sk - talk kl. sk		0, -	0.13	0.07		4.67	x
14.00-14.70	0.70	Gø. sk - talk kl. sk - meget nær steril							
14.70-15.15	0.45	Kj.tap.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 2.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 34.70 m

Borehull : RP-4-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.20 - 24.70	0.50	Kj.tap.							
25.60 - 26.20	0.60	Massiv gø. m/spr. fyll. og uregelmessig minr. vesentl. po.		0.-	0.190	0.208		5.08	x
25.80 - 26.00	0.20	Kj.tap.							
26.20 - 26.50	0.30	Kj.tap.							
26.50 - 28.00	1.50	Jevn tynn impr. i gø.sk. - talk. kl.sk.		0.-	0.134	0.399		4.29	x
26.90 - 27.20	0.30	Kj.tap.							
27.76 - 27.75	0.10	---"---							
28.00 - 29.00	1.00	Kj.tap.							
29.00 - 29.55	0.55	God minr. i t.kl.sk. po+ <u>sl</u> + <u>cp</u>		0.-	0.868	3.269		14.68	x
29.55 - 31.05	1.50	Delvis bra minr. po+cp i gø.sk.		0.-	0.228	0.085		9.52	x
31.05 - 31.80	0.75	Tynn impr. i gø.sk.		0.009	0.148	0.065		4.09	x
31.80 - 32.00	0.20	Kj.tap.							
32.00 - 33.20	1.20	Gø. - gø.sk.							
33.20 - 33.40	0.20	Noe impr. i gø.-gø.sk. foldet m/kv. fsp.utsvetn. po+cp		0.019	0.658	0.845		12.62	x
33.40 - 34.70	1.30	Gø. - gø.sk.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 2.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 34.70 m

Borehull : RP-4-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Antal
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.75 - 18.25	2.50	Ujevn <u>tynn</u> minr. i rel. massiv gø. - gø.sk.		0.-	0.049	0.022		3.60	x
18.25 - 19.30	1.05	En del bra minr. po+ <u>cp</u> + <u>sl</u> . i gø.sk. foldet.		0,-	0.304	1.041		8.09	x
19.30 - 20.10	0.80	Nær hele strekn. massiv malm av vanl. type, Zn og en del Cu-holdig.		0.028	1.553	9.588		29.76	x
20.10 - 21.10	1.00	Po+sl+(cp) minr. i gø.sk. delvis talkig klorittisk.		0.009	0.203	0.833		6.43	x
20.40 - 20.60	0.20	Kj.tap							
20.85 - 21.00	0.15	---"---							
21.10 - 21.20	0.10	---"---							
21.20 - 21.80	0.60	En del bra minr. i gø.sk. <u>t+kl</u> , po+ <u>sl</u> .		0.009	0.375	1.768		8.65	x
21.80 - 23.40	1.60	Rel. massiv gø. - Tynn impr. også fsp+kv.utsvetn.		0,-	0.104	0.208		3.79	x
22.80 - 23.20	0.40	Kj.tap.							
23.40 - 23.90	0.50	En del impr. vesentl. talk kl. impr. i gø.sk. kl.sk.		0.-	0.146	1.041		5.63	x
23.90 - 24.00	0.10	Kj.tap.							
24.00 - 25.60	1.60	Massiv gø. nær steril		0.-	0.077	0.138		2.18	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 2.9.71 I.L.

Borehull : RP-4-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 34.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.70	0.70	Kj.tap.							
0.70 - 7.95	7.25	Veksl. gø.sk. massiv fink. - delvis porfyrittisk.							
v 3.65		Prøve 5 cm rel. massiv gø.							
2.80 - 3.00	0.20	Kj.tap							
3.80 - 4.00	0.20	---"---							
4.50 - 4.70	0.30	---"---							
6.90 - 7.00	0.10	---"---							
7.95 - 8.00	0.05	---"---							
8.00 - 10.20	2.00	En god del kj.tap i gø.sk.		0,-	0.049	0.012		4.31	x
10.20 - 10.60	0.40	Kj.tap.							
10.60 - 12.00	1.40	Jevn tynn impr. i gø.sk.		0,-	0.126	0.051		5.63	x
11.00 - 11.30	0.30	Kj.tap.							
12.00 - 14.00	2.00	Tynn impr. i foldet gø.sk., kloritisk, po vesentl.		0,-	0.116	0.085		4.84	x
14.00 - 14.20	0.20	Kj.tap.							
14.20 - 15.50	1.30	Homogen - nær steril gø. - rel. massiv		0,-	0.102	0.048		3.21	x
15.50 - 15.75	0.25	Rel. bedre minr. i bånd på lagplan.		0,-	0.358	0.092		13.25	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 2.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 15.00 m

Borehull : RP-3-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.40	0.40	Kj.tap.							
0.40 - 4.35	3.95	Gø. og gø.sk. delvis m/gr. og et par mm. tykke lagplan-fyllinger m/po (cp)							
4.35 - 5.00	0.65	Noen steder tynne bånd m/po-minr. vesentlig (noe cp og også sl.) Mye steril gø. b.a. delvis m/gr.		0,-	0.285	0.475		6.59	x
5.00 - 7.00	2.00	Noen korn po-impr. hele vegen.		0,-	0.099	0.046		2.70	x
7.00 - 7.50	0.50	Noe impr. i tynne lag. Zn-rik, i gø.sk. (svakt klorittisk).		0,-	0.335	0.941		3.75	x
7.50 - 8.50	1.00	Noen få po og sl "plater" på lagplan i gø.-kl.sk.		0,-	0.045	0.435		1.79	x
8.50 - 9.00	0.50	Grovk. gø. b.a. - metagabbro, sill.							
9.00 - 12.50	3.50	Gø. og gø.sk. klorittisk til massiv.							
12.50 - 15.00	2.50	Grovk. gø. b.a. - metagabbro.							

Lokalitet : RIEPPE

Borehull : RP-2-71

Dato : 17.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 28.00 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		v/15.80. Kj.tap 15.05-15.20, 15.35-15.60, 16.00-16,20. Hele veien ellers meget ujevn minr. i klyser po, sl, cp.							
16.75 - 17.30	0.55	Steril mørk massiv gø.							
17.30 - 19.00	1.70	Svak impr. i talk.kl.sk.		0,-	0.058	0.263		3.83	x
19.00 - 20.00	1.00	30 cm kj.tap. - Talk. kl.sk.							
20.00 - 22.25	2.25	Grovk. massiv gø. b.a. m/store amf. fspxx							
22.25 - 23.50	1.25	Svak impr. i rel. massiv grovk. gø. b.a. - vesentlig po.		0,-	0.070	0.238		3.84	x
23.50 - 28.00	4.50	Gø.gø.sk. - til dels meget skifrig - 5 ører.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 17.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 28.00 m

Borehull : RP-2-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
6.90 - 7.50	0.60	Ujevn delvis bra minr. i gø.sk. - talk - kl.sk.		0.027	0.551	1.661		10.14	x
7.50 - 9.60	2.10	Gø.sk. og talkig kl.sk. med svak, noe ujevn impr.		0.009	0.149	0.312		6.09	x
9.60 - 9.90	0.30	Talk.kl. - gø.sk.							
9.90 - 10.00	0.10	Kj.tap.							
10.00 - 11.15	1.15	Gø.gø.sk. m/noen få gr. i tynne bånd - 2-3 cm kv.klyser med noen sulfidkorn.							
11.15 - 11.30	0.15	Kj.tap.							
11.30 - 12.00	0.70	Gø. - gø.sk. v/11.50 en 5 cm kv. klyse.							
12.00 - 12.15	0.15	Kj.tap.							
12.15 - 13.10	0.95	Gø.gø.sk.							
13.10 - 14.40	1.30	Ujevnt sulfidklyser i gø.gø.sk. m/hyppige melkekv.utsvetn. po+cp+ <u>sl</u> i store flekker.		0,-	0.146	0.984		7.03	x
14.40 - 14.50	0.10	Kj.tap.							
14.50 - 16.75	2.25	Melkekv.utsvetn. 14.50-14.90, %		0.027	0.208	0.383		8.11	x.

Borehull : RP-2-71

USB/1650/47B

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 28.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.70	1.70	Veksl. gø.-gø.sk. stedvis m/noen gr.							
1.70 - 2.30	0.60	Gø.sk. - klorittisk m/noen få gr. og tynne sulfidbånd (1 mm) po.							
2.30 - 3.80	1.50	Massiv gø. m/noen få spredte små sulfidkorn.							
3.80 - 4.10	0.30	Ujevn rel. bra impr.		0,-	0.395	0.506		6.81	x
4.10 - 4.50	0.40	Til dels meget massiv malm i kv.rik b.a., gø.-b.a.		0.055	1.914	1.917		25.22	x
4.50 - 5.00	0.50	Noen få sulfidkorn i kv.klyser og gø.-gø.sk. - et par gr.		0,-	0.841	6.711		28.29	x
5.00 - 5.25	0.25	Kj.tap.							
5.25 - 5.55	0.30	Gø.sk. - gø. delvis kv.fsp. rik i bånd.							
5.55 - 5.85	0.30	Kj.tap							
5.85 - 6.30	0.45	Gø.sk.							
6.00 - 6.20	0.20	Kj.tap.							
6.30 - 6.90	0.60	Talk.kl.sk. - breksjert med semi-massiv malm.		0,-	0.909	1.891		19.56	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 17.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 33.40 m

Borehull : RP-1-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.75 - 29.80	1.05	Rel. bra impr. og spr. fyll. i gø. -gø.sk. også kv.-fsp.utsvetn. (v/28.80) med store flekker av cp- sl.		0,-	0.675	0.115		5.51	x
29.80 - 30.15	0.35	Kj.tap.							
30.15 - 30.65	0.50	Gø.sk. - delvis kl.-talkig - noen gr. i cm. tykt bånd							
30.65 - 31.00	0.35	Kv.klyser i gø. m/flekker av po - og cp noen gr.							
31.00 - 31.20	0.20	Kj.tap.							
31.20 - 31.70	0.50	Gø.sk. - skifrig kl. - talkig							
31.70 - 33.40	1.70	Gø.sk. m/rike gr. kloritt-bånd.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 17.7.71 I.L.

Borehull : RP-1-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 33.40 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		v/16.60 en 10 cm kv.bånd + klorittmasse m/amf.nåler + litt po. Noen få sulfidkorn - generelt.							
18.70 - 20.10	1.40	En del bra minr. i tynne bånd, men deler med massiv steril gø.amf. Bra v/19.25 og 19.70 (10-15 cm bånd)		0,-	0.198	0.291		4.64	x
20.10 - 21.50	1.40	Til dels bra jevn po-cp impr. i t.-kl.sk. også 10-20 cm bånd med semi-massiv breksjemalm.		0,-	0.450	1.002		11.23	x
21.50 - 22.85	1.35	En del rel. svak impr. i talk - kl.sk. vesentl. po.		0,-	0.140	0.299		4.42	x
22.85 - 24.05	1.20	Meget god henimot helt massiv malm, med kloritt-talk-sk.filler.		0,-	2.011	5.699		33.69	x
24.05 - 25.30	1.25	Talk kl.skifer med rel. jevn svak impr.		0,-	0.163	0.569		4.99	x
25.30 - 26.75	1.45	Rel. massiv mørk gø. m/noe sulfid impr. po+cp		0.009	0.127	0.350		3.01	x
26.75 - 28.75	2.00	Ujevn stedvis bra impr. i gø.sk.-kl.sk.-talk kl.-sk. po+cp.		0.009	0.296	0.095		3.79	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 17.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 33.40 m

Borehull : RP-1-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 6.00	6.00	Veksl.gø.-gø.sk. b.a. - stedvis noen få gr. i tynne bånd. Gjerne i forb. med dette noen sulfidflekker. Impr. av po-cp 0.60, 2.50, 3.40							
6.00 - 6.80	0.80	Kj.tap.							
6.80 - 8.30	1.50	Gø. - gø.sk.							
8.30 - 9.75	1.45	Ujevn - meget med 2-3 cm sulfidbånd innimellom og ellers svak impr. i gø. og gø.sk. Et sted (9.40) i forb. med rikt sulfidbånd og impr., noen gr. Også mest sterile partier.		0,-	0.135	0.026		2.23	x
9.75 - 12.75	3.00	Gø.-gø.sk. temmelig homogen, men noen få tynne kv.bånd og kv.utsvetninger. Steril nær.							
12.75 - 13.65	0.90	Grovk.gø. b.a. m/kv.utsvetn. og i disse noe po+cp, også ellers noen kornsulfider. Fsp xx tydelig.							
13.65 - 18.70	5.05	Gørgø.sk. I tynne bånd klorittisk og til dels talkige. Her gjerne en del po. i tynne bånd og impregnert.							

Lokallitet: KLEPPE

Dato: 10.10.71 I.L.

Borehull: Bh-5A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 65°

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
179.50 - 180.70	1.20	Gø.sk., tynn minr., men mm-tykke cp-bånd.		0,-	0.345	0.028		3.75	x
180.70 - 189.00	8.30	Gø.sk. stedvis foldet, noen steder noen po-flekker, alt vesentlig po.							
189.00 - 190.30	1.30	Gø.sk. klorittisk m/noen sulfider vesentl. po.		0,-	0.058	0.378		4.20	x
190.30 - 191.20	0.90	Foldet gø.sk. m/noen sulfider po(+cp).		0.009	0.054	0.451		3.43	x
191.20 - 193.00	1.80	Gø. → gø.sk.							
193.00 - 193.90	0.90	Grovk. metagabbro - amf.							
193.90 - 196.50	2.60	Gø. → gø.sk. rel. massiv. Et po-bånd v/196.10.							
196.50 - 200.00	3.50	Rel. massiv gø. - grovk. metagabbro. Prøve v/196.75 og 199.50 m, metagabbro.							

Lokalitet: RIEPPE

Dato 10.10.71 I.L.

Borehull: Bh-5A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 65°

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
157.65 - 162.40	4.75	Massiv porfyrittisk gø., massiv. Tett med porfyrer.							
162.40 - 170.50	8.10	Massiv porfyrittisk gø. vekslende med massiv gø. opptil middelk. v/160.50 Prøve av porfyrittisk gø.							
168.75 - 169.65	0.90	Kj.tåp. v/166.95 Prøve av porfyrittisk gø. m/mange porfyrer.							
170.50 - 172.60	2.10	Gø. og tynne soner m/gø.sk. Noen po-flekke og spr. fyll.							
172.60 - 173.50	0.90	Gø. og gø.sk. m/sulfid impr. po+cp Ujevn minr.		0,-	0.146	0,-		3.45	x
173.50 - 174.75	1.25	Gø.sk. foldet m/sulfid impr.		0,-	0.258	0.194		6.17	x
174.75 - 175.75	1.00	Gø.sk. - talk - klorittisk - foldet.		0,-	0.438	0.339		7.76	x
175.75 - 176.50	0.75	Gø. → gø.sk. foldet m/noe minr. po+cp.		0.018	0.527	0.498		9.67	x
176.50 - 177.35	0.85	Gø. med ujevn tynn minr. det meste sterilt.		0,-	0.420	0.013		3.15	x
177.35 - 179.50	2.15	Gø.sk. m/mye kv.fsp i konk. bånd. Ujevn, endel bra minr. po+cp.		0,-	0.418	0.015		5.47	x

Lokallitet: RIEPPE

Dato 10.10.71 I.L.

Borehull: Bh-5A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 65°

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
140.00 - 146.85	6.85	Veksl. gø. b.a. - Stedvis massiv porfyrittisk m/spredte porfyrrer. Også soner med gø.sk. klorittisk. I sk.soner noen kv.fsp.bånd og litt po.							
146.85 - 147.25	0.40	Bra minr. impr. i gø.sk. po+cp.		0.010	0.468	0.013		6.62	x
147.25 - 148.50	1.25	Ujevn impr. i gø.sk.		0,-	0.277	0.025		3.43	x
148.50 - 148.65	0.15	Gode spr.fyll av cp+po i gø.		0,-	1.727	0.015		4.07	x
148.65 - 150.30	1.65	Gø. rel. massiv, noen få steder fsp. porfyrrer spredt.							
150.30 - 153.20	2.90	Gø. - vesentlig porfyrittisk - massiv. Noen uregelmessige kv.fsp utsvetn.							
153.20 - 154.20	1.00	Gø. → gø.sk.							
154.20 - 154.60	0.40	Porfyrittisk gø. - spredte porfyrrer.							
154.60 - 154.70	0.10	Gø.sk. m/noe sulfider po+cp.							
154.70 - 155.10	0.40	Gø. → gø.sk.							
155.10 - 155.50	0.40	Porfyrittisk gø. m/kv.fsp, utsvetn. - hyppig.							
155.50 - 157.65	2.15	Rel. massiv gø. opptil middelk.							

Lokallitet: RIEPPE

Dato 10.10.71 I.L.

Borehull: Bh-5A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 65°

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
123.30 - 124.90	1.60	Grovk. amf. → metagabbro - Ptygmatiske årer av kv.fsp. karb. i denne like over 124 m.							
124.90 - 126.00	1.10	Gø. → gø.sk. v/125.50 et par flekker med cp.							
126.00 - 126.90	0.90	Massiv middelk. gø.amf.							
126.90 - 128.20	1.30	Gø. → gø.sk.							
128.20 - 128.60	0.40	Hydrotermal kv.							
128.60 - 131.90	3.30	Veksl. gø. - massiv → gø.sk. m/kv. fsp. bånd og klyseutsvetn. type små.							
131.90 - 132.50	0.60	Noe pen cp.minr., men de øverste 20 cm er det vesentligste po i gø. Ellers gø. b.a. m/en klyse kv.fsp.		0,-	0.438	0.013		9.48	x
132.50 - 133.00	0.50	Veksl. rel. massiv gø.							
133.00 - 137.50	4.50	Vesentlig porfyrittisk massiv gø.							
137.50 - 137.90	0.40	Veksl. middelk. → fink. massiv amf.							
137.90 - 138.15	0.25	Gø.sk. m/noe po (cp).							
138.15 - 140.00	1.85	Veksl. gø. m/noen utsvetn. av kv. fsp.							

Lokallitet: RIEPPE

Dato: 30.1.1971

Borehull: Bh-5A-71

Koordinater :

Retning : Ø O

Helling/stigning: 65

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
94.10 - 94.40	0.30	Massiv komogen gø.							
94.40 - 95.60	1.20	En del sulfider jevnt fordelt i gø.sk. po+cp.		0.009	0.069	0.045		3.88	x
95.60 - 103.20	7.60	Veksl. gø. Delvis porfyrittisk.							
103.20 - 103.50	0.30	Gø. → gø.sk. m/gr. og noen sulfidkorn, spes. i kv.fsp-rike deler.							
103.50 - 104.30	0.80	Homogen gø.							
104.30 - 104.45	0.15	Cp-rik mineralisering i kv.fsp-rik gø.		0,-	5.048	0.106		8.52	x
104.45 - 110.00	5.55	Gø. b.a. vekslende. Noen tynne bånd m/gø.sk. som kan ha litt po. Noen få kv.fsp.utsvetn.							
110.00 - 114.30	4.30	Vekslende gø. - gø.sk. Delvis porfyrittisk.							
114.30 - 115.70	1.40	Massiv metagabbro - grovk. med jevne overganger.							
115.70 - 123.30	7.30	Veksl. gø. Noen steder noen sulfidflekker po+cp og kv.fsp.utsvetninger.							

Lokalitet: KIEPPE

Dato

4.10.71/10.10.71

Borehull: Bh-5A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 65°

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
85.40 - 85.65	0.25	bånd, mm-tykke po+cp i gø. - gø.sk. Noen få rel. store gr.							
85.65 - 86.00	0.35	Steril gø. massiv. Gø.sk. m/tynne sulfidlag på lag- plan. Også kv.fsp.utsvetning. Noen få store gr.		0,-	0.145	0.007		5.66	x
86.00 - 86.70	0.70	Rel.massiv gø. Like over 86.00 - porfyrittisk.							
86.70 - 87.60	0.90	Sterkt vekslende gø. b.a. - sleppe- soner. Utsvetn. av kv. m/noen korn av <u>po-cp</u> .							
87.60 - 89.60	.200	Rel. homogen gø. - gø.sk.							
89.60 - 89.80	0.20	En del bra minr. <u>po+cp</u> .		0.036	0.073	0.007		4.07	x
89.80 - 92.20	2.40	Rel. homogen gø.							
92.20 - 92.25	0.05	Bra minr. i gø.sk.							
92.25 - 93.60	1.35	Veksl. gø. tynne porfyrittiske bånd (10 cm). Noen flekker av kv.fsp.utsvetninger. En større utsvetn. v/93 m m/noen po-korn.							
93.60 - 94.10	0.50	Porfyrittisk gø.							

Lokalitet: RIEPPE

Dato: 4.10.71 I.L.

Borehull: Bh-5A-71

Koordinator :

Retning : Ø

Helling/stigning: 65°

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
73.05 - 73.50	0.45	Ujevn minr., best like etter 73.05, her gr. og kv.fsp.utsvetninger po+cp.		0,-	0.148	0.008		4.07	x
73.50 - 75.50	2.00	Steril gø. → svakt skifrig.							
75.50 - 76.00	0.50	Pen minr. stykkevis i gø.sk. m/gr. og en større fsp-cc utsvetn. po+cp.		0,-	2.017	0.025		12.72	x
76.00 - 76.70	0.70	Svak impr. i gø.sk. - po+cp i tynne bånd i gø.sk.		0.036	0.098	0.013		2.74	x
76.70 - 78.70	2.00	Gø.sk. - gø. - Litt po i en kv.fsp. utsvetn.							
78.70 - 79.40	0.70	Noen tynne bånd m/po og litt cp i gø.sk.		0,-	0.080	0,-		3.88	x
79.40 - 81.80	2.40	Gø. → gø.sk. - litt po i forb. m/kv.fsp.utsvetn.							
81.80 - 82.30	0.50	v/81.80 et 5 cm tykt pent minr. bånd ellers gø.sk., men med ujevn og dårlig sulfidimpr. po+cp.		0,-	0.199	0,-		2.47	x
82.30 - 84.30	2.00	Gø. → gø.sk. rel. homogen. v/83.40, noe utsvetn. av fsp-karb. og litt po.							
84.30 - 85.40	1.10	Noen steder impr. og sulfider i %		0,-	0.119	0.007		3.56	x

Lokallitet: KLEPP

4. 71 .L

Borehull: Bh-5A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 65°

Høyde :

Lengde : 200 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.50 - 39.70	2.20	Gø.sk. m/kv.fsp.utsvetn., på skifer- plan litt po og også i kv.fsp. utsvetn. noen sulfidflekke.							
39.70 - 41.00	1.30	Porfyrittisk gø. - massiv.							
41.00 - 45.50	4.50	Massiv gø. - tynne soner m/por- fyrittisk massiv gø.							
45.50 - 54.90	9.40	Massiv porfyrittisk gø., matrix er stedvis middelk.							
54.90 - 56.40	1.50	Porfyrittisk gø.skifer i tynne bånd - ellers gø.sk.							
56.40 - 67.30	10.90	Gø.sk. - Tynne (< 2-3 cm) bånd m/kv.fsp.utsvetninger 30 cm mekt. rundt 62.40 har en foldet gø.sk. m/minr. av po - svakt. Noen få cp flekker. v/67.30 noen gr. i gø. → gø.sk.							
67.30 - 69.20	1.90	Massiv gø. til dels middelkornig.							
69.20 - 72.80	3.60	Porfyrittisk gø. → gø.sk. varierende fspxx-mengde.							
72.80 - 73.05	0.25	Fink. gø.							

Lokalitet: RIEPPE

Borehull: Bh-5A-71

USB/1650/47B

Dato: 1.10.71
Koordinater:
Retning: Ø
Helling/stigning: 65°
Høyde:
Lengde: 200 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.20	3.20	Jordboring							
3.20 - 17.00	13.80	Veksl. gø. gø.sk. I tynne soner gø. svakt porfyrittisk. v/7.60 en kv.fsp.klyse m/po+cp. v/12.50 en mer grovk. gø.-sone - amfibolit- tisk.							
17.00 - 19.40	2.40	Kj.tap.							
19.40 - 27.00	7.60	Gø. og gø.sk. som er stykkevis splittet i tynne skiver. Flere steder kv.fsp.utsvetn., i de største av disse noen få sulfidkorn.							
27.00 - 28.70	1.70	Gø.sk. - talk.klorittisk - en meget tynn sulfidimpr. <u>po</u> det aller vesentligste, men også litt cp.							
28.70 - 34.20	5.50	Gø. -gø.sk. m/uregelmessige kv.fsp. utsvetn. - noen sulfidkorn <u>po</u> +(cp).							
34.20 - 36.80	2.60	Gø.sk. og vanligere rel. massiv gø. - den massive gø. porfyrittisk m/ mer el. færre fspxx.							
36.80 - 37.50	0.70	Kj.tap.							

Lokalitet: RIEPPE

Borehull: Bh-4B-71

Dato: 10.9.71 1.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 80°

Høyde :

Lengde : 146.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
125.40 - 126.20	0.80	Tynn minr. i gø.sk. m/spredte gr.		0,-	0.111	0.042		4.45	x
126.20 - 127.65	1.45	Til dels pen minr. po+cp+sl i gø. sk. delvis kv.sittisk massiv gø.		0,-	0.624	0.054		7.35	x
127.65 - 130.00	2.35	Tynn minr. i gø. → gø.sk. foldet + spr.fyll. i massiv gø.		0,-	0.222	0.061		3.56	x
130.00 - 131.35	1.35	Gø.sk. - kv.sittisk m/noen pene bånd av po-cp.		0.008	0.358	0.064		2.93	x
131.35 - 133.00	1.65	Ujevn minr. i talk-kloritt sk.		0.008	0.131	0.139		3.03	x
133.00 - 133.90	0.90	Talk-kloritt m/noen korn po+cp+sl.		0,-	0.166	1.248		3.54	x
133.90 - 135.00	1.10	Tynn dårligere impr. i talk-kloritt sk. enn den forrige splittede del.							
135.00 - 136.25	1.25	Bedre impr. i talk-kloritt sk.-gø.		0,-	0.112	0.514		4.57	x
136.25 - 138.25	2.00	Talk-kloritt sk. og gø.sk. m/noen po-korn.							
138.25 - 140.60	2.35	Middelk. massiv metagabbro → amf.							
140.60 - 141.80	1.20	Talk-kloritt sk. foldet og grovk. amf. → metagabbro noen større <u>po</u> flekker, men bare det.							
141.80 - 146.50	4.70	Grøvk. amf. → metagabbro.							
146.50 - 146.70	0.20	Gø. → fink. massiv.							

Lokalt: RIEPPE

Dato 10.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø⁰Helling/stigning: 80⁰

Høyde :

Lengde : 146.70 m

Borehull: Bh-4B-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
99.80 - 100.75	0.90	Massiv gø.		0,-	0.143	0.475		3.61	x
100.75 - 100.85	0.10	Utsvetn. i gø.sk. m/po+py+sl.							
100.85 - 110.90	10.05	Mørk gø. → gø.sk. vekslende og en del foldet.							
110.90 - 112.40	1.50	Impr. og tynne sulfidbånd i gø.sk.		0,-	0.159	0.208		5.41	x
112.40 - 113.30	0.90	Rel. steril massiv gø.		0,-	0.057	0.049		1.13	x
113.30 - 115.35	2.15	Jevn impr. i talk-kloritt gø.sk. po+cp.		0,-	0.149	0.023		5.09	x
115.35 - 116.70	1.25	Delvis massiv Rieppe-malm og talk. kl.sk. breksje delvis cp- og sl-rik.		0.042	0.936	4.478		19.01	x
116.70 - 117.60	0.90	Tynn impr. i talk-kloritt gø.sk.		0,-	0.269	0.073		6.06	x
117.60 - 121.30	4.70	Steril gø. og gø.sk. talk-kloritt foldet - noen få flekker po.							
121.30 - 122.70	1.40	Ujevn, men til dels cp-rik impr. og flekker i gø. → talk-kloritt gø.sk.		0,-	0.368	0.042		7.22	x
122.70 - 123.80	1.10	Dårlig minr. i gø. små flekker kv. fsp.utsvetn.		0,-	0.113	0.042		3.54	x
123.80 - 125.40	1.60	Flekkvis minr. til dels pene cp flekker foldet gø.sk. og gø.		0,-	0.676	0.044		6.57	x

Borehull: Bh-4B-71

Koordinator :

Retning : Ø

Helling/stigning: 80°

Høyde :

Lengde : 146.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		v/51.30 et 10 cm bånd og v/60.65 en 2 cm tykk spr.fyll.							
69.50 - 70.00	0.50	Porfyrittisk gø.							
70.00 - 78.25	8.25	Veksl. gø.-gø.sk. Største delen massiv fink. v/71.40 et 10 cm bånd m/kv.fsp.							
78.25 - 78.40	0.15	Bra cp impr. i gø.sk.							x
78.40 - 79.30	0.90	Gø. → gø.sk.							
79.30 - 79.70	0.40	En del impr. i gø.sk. po+cp.		0,-	0.521	0.184		6.70	x
79.70 - 80.65	0.95	Gø. → gø.sk.							
80.65 - 80.80	0.15	Kv.fsp utsvetn. i gø.sk. - noe cp+po+sl.							x
80.80 - 86.40	5.60	Gø. → gø.sk. veksl.							
86.40 - 93.00	6.60	Porfyrittisk gø. → gø.sk. - spredte porfyrer.							
93.00 - 94.70	1.70	Gø. → gø.sk.							
94.70 - 95.60	0.90	Massiv porfyrittisk gø. tett m/fspxx.							
95.60 - 98.00	2.40	Fink. middelk. amf.-gø.							
98.00 - 99.80	1.80	Massiv gø. m/spr. fyll av py+po+sl.	(sammenslått anal. neste side)						x

Lokalitet: RIEPPE

Dato

10.11.71

I.L.

Borehull: Bh-4B-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 80°

Høyde :

Lengde : 146.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.90 - 39.75	1.85	Gø. og gø.sk. - et tynt (20 cm) bånd m/porfyrittisk gø., et par flekker m/kv.fsp. utsvetn.							
39.75 - 39.90	0.15	Noe impr. po+cp i gø.sk.							x
39.90 - 40.30	0.40	Gø.							
40.30 - 40.50	0.20	Noe impr. i gø.sk. po+cp.		0,-	0.780	0.049		3.47	x
40.50 - 40.90	0.40	Massiv gø. opptil middelk.							
40.90 - 41.00	0.10	Cp-flekke i massiv gø.							x
41.00 - 42.10	1.10	Gø.sk. første 10-20 cm så en grovk. massiv amf. - metagabbro.							
42.10 - 44.40	2.30	Gø. gø.sk. m/svak impr. av po (cp).							
44.40 - 47.40	3.00	Massiv gø. fink. stedvis pegmatittisk amf. m/fsp.flekke.							
47.40 - 48.10	0.70	Svak flekk minr. og impr. i gø.sk. po+cp.		0.017	0.209	0.027		4.57	x
48.10 - 49.55	1.45	Sterkt veksl. amf. grovk. → gø.sk.							
49.55 - 49.80	0.25	Flekke av po+cp i gø., foldet gø.sk.							x
49.80 - 69.50	19.70	Gø. - vekslende fink. → middelk. i tynne bånd. Impr. av po+cp %							

Lokalitet: RIEPPE

Dato : 10.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 80°

Høyde :

Lengde : 146.70 m

Borehull: Bh-4B-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.20	3.20	Kj.tap.							
3.20 - 11.00	7.80	Dagb.a. gø - gø.sk. v/6.50 og 7.50 litt impr. i skiferen.							
11.00 - 15.00	4.00	Gø. → gø.sk. Noen po-flekker.							
15.00 - 26.00	11.00	Gø. og tynne bånd m/gø.sk.							
26.00 - 26.35	0.35	Noe impr. po - i gø.sk.							x
26.35 - 26.85	0.50	Gø. → gø.sk.							
26.85 - 26.95	0.10	Bra po impr. noe cp i gø.sk.							x
26.95 - 27.40	0.45	Gø. → gø.sk.							
27.40 - 28.00	0.60	Rel. grovk. massiv amf. - metagabbro.		0.017	0.202	0.355		5.86	
28.00 - 29.00	1.00	Gø.							
29.00 - 29.40	0.40	Noe cp spr. i gø. rel. massiv.							x
29.40 - 30.30	0.90	Gø. → gø.sk.							
30.30 - 32.05	1.75	En del bra cp+po flekker i gø.sk. foldet klorittisk.		0.025	0.317	0.012		3.61	x
32.05 - 33.15	1.10	Gø. normal fink.							
33.15 - 37.90	4.75	Veksl. massiv metagabbro til mer fink. gø. m/noe fsp?xx Prøve av gø. m/små fspxx.							
<u>v/35.50</u>									

Lokallitet:

KLEPPE

Dato

15.9.71

IVL

Borehull: Bh-4A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 50°

Høyde :

Lengde : 124.25 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	Bi ppm	% Fe	
112.80 - 114.00	1.20	Ujevn tynn minr. i massiv gø. —→ talk-kloritt sk.		0,-	0.089	0.005	0,-	1.83	x
114.00 - 114.55	0.55	Til dels meget Cu-rik minr. semi- massiv i talk-kloritt sk.		0,-	1.908	0.129	0,-	23.27	x
114.55 - 115.00	0.45	Noen cp-po-striper i talk-kloritt sk.		0,-	0.203	0.047	0,-	3.23	x
115.00 - 116.65	1.65	Temmelig steril talk-kloritt gø.sk. <u>po</u> -bånd.		0,-	0.074	0.016	0,-	3.77	x
116.65 - 119.50	2.85	Ujevn minr. m/pene flekker med cp i jevnt fordelte striper gø.sk. talk-kloritt sk.		0,-	0.403	0.117	0,-	7.47	x
119.50 - 120.15	0.65	Kj.tap.							
120.15 - 124.25	4.10	Gø.sk. m/noen kv. fsp utsvetn. Rundt 122.35 noen po striper i gø.sk. talk-kloritt (<u>cp</u>).							

Lokallitet: RIEPPE

Dato

1983.9

Borehull: Bh-4A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 50°

Høyde :

Lengde : 124.25 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	Bi ppm	% Fe	
102.05 - 102.35	0.30	Noen rike bånd i talk-kloritt gø.sk.		0,-	0.729	1.712	0,-	10.92	x
102.35 - 103.30	0.95	Massiv Rieppe-malm m/py.		0.019	1.599	11.778	0,-	38.07	x
<u>v/102.40</u>		Prøve							
103.30 - 103.75	0.45	Bra minr. i talk-kloritt sk. + gø.sk.		0.058	0.673	2.879	0,-	15.23	x
103.75 - 104.60	0.85	Brukt minr. i talk-kloritt sk. + gø.sk.		0.019	0.295	1.738	0,-	8.98	x
104.60 - 105.50	0.90	Steril massiv gø.		0,-	0.059	0.078	0,-	1.98	x
105.50 - 108.00	2.50	En del sulfider i talk-kloritt gø.sk. ujevn minr. cp+po.		0,-	0.194	0.371	0,-	5.82	x
108.00 - 109.70	1.70	En del sulfider i talk-kloritt gø.sk. ujevn minr. cp+po.		0.009	0.274	0.109	0,-	5.82	x
109.70 - 110.65	0.95	Noen få flekker po i massiv fink. gø. og talk-kloritt sk. b.a.		0.019	0.070	0.013	0,-	2.75	x
110.65 - 110.75	0.10	Nær massiv Rieppe-malm.		0,-	2.019	0.117	0,-	36.63	x
110.75 - 111.75	1.00	Nær steril gø.sk. talk-kloritt + homogen gø.		0,-	0.307	0.075	0,-	7.83	x
111.75 - 112.20	0.45	En del po minr. (+cp+sl) i talk- kloritt sk.		0,-	0.309	0.039	0,-	7.83	x
112.20 - 112.80	0.60	Meget <u>Cu</u> -rik Rieppe malm - nær massiv.		0.019	2.272	0.039	0,-	38.79	x

Lokallitet: RIEPPE

Dato: 3.9.71 I.L.

Borehull: Bh-4A-71

Koordinater:

Retning: Ø

Helling/stigning: 50°

Høyde:

Lengde: 124.25 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	Bi ppm	% Fe	
85.70 - 89.40	3.70	Homogen gø. opptil middelk. gradvis veksl. i kornstr.							
89.40 - 92.50	3.60	Gø.-gø.sk. - foldet m/kv.fsp. utsvetn. og i forbindelse med disse gjerne litt <u>po+py</u> - noen fsp. porfyrer.							
92.50 - 95.00	2.50	Spredt <u>py-po</u> minr. i gø. b.a. - massiv.		0,-	0.025	0.016	0,-	2.87	x
95.00 - 96.60	1.60	Hyppigere py-po minr. i noe lysere gø. b.a.		0,-	0.060	0.122	0,-	4.74	x
96.60 - 98.25	1.65	Massiv fink. gø. grovk. amf. metagabbro.							
98.25 - 98.85	0.60	Massiv fink. gø. m/noe po+cp - tynt.		0,-	0.072	0.008	0,-	3.16	x
98.85 - 99.70	0.85	Tynn ujevn minr. i gø.sk. talk-kloritt <u>po</u> vesentl.		0,-	0.161	0.127	0,-	4.38	x
99.70 - 100.70 <u>v/99.80</u> <u>v/100.60</u>	1.00	Meget <u>sl</u> -rik massiv Rieppe-malm. Prøve stedvis noe py-xx Prøve		0.584	1.964	14.579	0,-	32.61	x
100.70 - 101.65	0.90	Nær steril massiv gø. foruten en spr. fylling.		0,-	0.202	0.379	0,-	3.74	x
101.65 - 102.05	0.40	Massiv Rieppe-malm cp+sl-rik		2.143	2.384	10.896	1.15	30.89	x.

Lokaltet: RIEPPE

Dato: 5.9.71 I.L.

Borehull: Bh-4A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 50°

Høyde :

Lengde : 124.25 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	Bi ppm	% Fe	
		m/gradvis overganger. Noen flekker med po - meget spredte.							
60.30 - 60.60	0.30	Gø. gø.sk. v/60.35 en gr.gø.							
66.60 - 60.75	0.15	En del bra impr. i en tynn sone (elem.ford.).		0,-	0.135	0.905	0,-	2.44	x
60.75 - 66.30	5.55	Gø. m/spredte fspxx porfyrer.							
66.30 - 68.30	2.00	Rel. grovk. matrix - grønsten mellom fspxx porfyrittisk.							
68.30 - 69.50	1.20	Fink. gø m/spredte fspxx porfyrer.							
69.50 - 74.30	4.80	Rel. grovk. porfyrisk gø. - spredte porfyrer hyppig større fsp.kv.utsvetn. rundt 72.60 (½ m mekt.).							
74.30 - 76.00	1.70	Gø. porfyrisk i tynne bånd.							
76.00 - 84.90	8.90	Rel. homogen gø. noen fsp.striper og tynne bånd.							
84.90 - 85.20	0.30	Noen pene cp-striper + cp minr. (elem.ford.).		0.019	0.453	0.013	0,-	4.59	x
85.20 - 85.70 v/85.50	0.50	Homogen porfyrittisk gø. Prøve							

Lokallitet: RIEPPE

Dato : 5.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 50°

Høyde :

Lengde : 124.25 m

Borehull: Bh-4A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	Bi ppm	% Fe	
0 - 2.80	2.80	Jordboring							
2.80 - 8.00	5.20	Mørk fink. amf. - dag-forvitret. ca. 20% kj.tap.							
8.00 - 25.30	17.30	Rel. homogen fink. massiv og i tynne soner skifrig gø. (amfibolit- tisk). Noen flekker m/fsp. (rel. sjelden) og noen sulfider <u>po</u> i tynne bånd.							
25.30 - 26.50	1.20	Middelk. til fink. massiv amf. - metadiabas b.a. Gradvis overgang i kornstr.							
26.50 - 29.85	3.35	Gø. med noen <u>fsp.</u> kv.klyser spredt 2-3 cm store.							
29.85 - 29.95	0.10	Rel. massiv po-malm.							x
29.95 - 31.70	1.75	Gø. → gø.sk. Gø.sk. 30-31 m er sterkt foldet m/fsp, klyser.		0,-	0.331	0.005	0,-	10.77	x
31.70 - 32.30	0.60	Temmelig cp-rik minr. i gø.sk.							
32.30 - 60.30	28.00	Rel. homogen gø. tynne soner (40 cm max.) er porfyrittiske, men dette er underordnet. Konstr. kan være middelk (opptil) i tynne soner %							

Lokallitet: RIEPPE

Dato: 5.9.71 I.H.

Borehull: Bh-3B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 128.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
124.80 - 128.70 <u>v/124.90</u>	3.90	Kv.sitt. sk. Noen sulfidkorn er anal. mekt. Prøve							

Borehull: Bh-3B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 128.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
102.90 - 103.20	0.30	po-cp minr. i kv.sitt./gø.		0,-	0.218	0.027		4.76	x
102.00 - 109.00	7.00	Kv.sittisk gø. b.a.							
<u>v/104.30</u>		Prøve							
		Noen steder tynne (mm) lagbånd av sulfider - <u>po</u> .							
109.00 - 112.80	3.80	Skifrig b.a. talk.gø.sk. → glimmerførende. v/109.50 noen granater.							
112.80 - 113.10	0.30	Flekker av sl. og po i talk-kloritt gø.sk.		0.018	0.222	3.671		5.29	x
113.10 - 114.20	1.10	Talk-kloritt sk. - gø.sk. kv.holdig?							
<u>v/113.70</u>		Prøve							
114.20 - 114.80	0.60	Glimmerførende kv.sittisk sk.							
<u>v/114.30</u>		Prøve							
114.80 - 115.60	0.80	Gø. gø.sk. noen flekker sl.							
		v/114.90 - nederste del rel. grovk.							
115.60 - 119.50	3.90	Grovk. amf. - metagabbro.							
119.50 - 122.00	2.50	Bløt sk. gø. b.a. m/noen få sulfidkorn.							
122.00 - 123.20	1.20	Kv.sitt. sk. - noen sulfidkorn.							
123.20 - 124.80	1.60	Noen sulfider <u>po+sl</u> +cp i kv.sitt. sk. (beste kval.).		0.018	0.106	0.507		4.09	x

Lokamet: RIEPPE

Dato 9.9.71

Borehull: Bh-3B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 128.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
89.70 - 91.10	1.40	Rel. bra malm - sans. i Rieppesonen som her er temmelig tynn når det gjelder virkelig massiv malm. Det meste er en talk-kloritt breksje.		0,-	0.663	2.006		13.40	x
91.10 - 91.85	0.75	Talk-kloritt gø.sk. et sted et pent. po:sl:cp. bånd på 2 cm.		0.009	0.828	3.084		21.71	x
91.85 - 92.30	0.45	Steril talk-kloritt gø.sk.							
92.30 - 94.10	1.80	Gø. - massiv og gø.sk. også talk-klorittisk - steril.							
94.10 - 94.60	0.50	En del bra cp.flekker og po i gø.sk., kv.fsp rike bånd i denne.		0,-	0.425	0.113		3.44	x
94.60 - 95.15	0.55	Nær steril bånd fink. gø.sk.		0,-	0.127	0.076		1.82	x
95.15 - 97.00	1.85	Ujevn til dels spr. minr. i gø. b.a. massiv→skifrig po+cp.		0,-	0.134	0.044		3.04	x
97.00 - 98.50	1.50	Po+cp på spr. i massiv gø, også m/kv.utsvetn. - kv.sittisk gø.		0,-	0.127	0.042		4.42	x
98.50 -101.85	3.35	Kv.sittisk gø. b.a., noen sulfid-korn.							
<u>v/100.00</u>		Prøve							
101.85 -102.00	0.15	po-cp minr. i kv.sitt. gø.		(sammenslått anal. neste side)					x

Borehull: Bh-3B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 128.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
74.85 - 77.20	2.35	Gø.sk. foldet - også gø.							
77.20 - 79.60	2.40	Homogen fink. → middelk. gø. b.a. → middelk. amf.							
79.60 - 80.00	0.40	Gø.sk. - (talk-kloritt).							
80.00 - 80.80	0.80	Svak impr. i talk-kloritt gø.sk. po+cp.		0,-	0.145	0.154		5.43	x
80.80 - 82.60	1.80	Homogen massiv gø. Steril utenom noen spr. fyll v/81.50.							
82.60 - 83.10	0.50	Svak impr. po (cp) i gø. - gø.sk. talk-kloritt.		0,-	0.069	0.071		2.88	x
83.10 - 84.00	0.90	Noe bedre minr. i talk-kloritt-gø.sk. po+cp.		0.009	0.094	0.064		4.09	x
84.00 - 85.25	1.25	Nær steril gø., noen po-korn.		0,-	0.023	0.027		1.32	x
85.25 - 85.35	0.10	Massiv po-malm - cp.		0,-	0.109	7.342		25.47	x
85.35 - 87.10	1.85	Tynn minr. i gø. → gø.sk. (talk- kloritt) po+cp.		0,-	0.106	0.139		3.67	x
87.10 - 89.20	2.10	Blandet - tynn minr. i foldet gø.sk. (88 → 89 m har 35 cm kj.tap).		0.053	0.199	0.345		5.96	x
89.20 - 89.70	0.50	En del impr. i talk-kloritt gø.sk. po+sl+cp.		0,-	0.162	0.232		5.63	x

Lokalitet: RIEPPE

Dato 5.9.71 I.L.

Borehull: Bh-3B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 128.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		med dette fspxx <u>po+cp</u> . - ikke verd anal!							
57.10 - 58.90	1.80	Gø.sk. delvis talk-kloritt - sterkt foldet.							
58.90 - 62.50	3.60	Rel. homogen gø. med noen få fsp porfyrer og fsp. bånd/flekke.							
62.50 - 68.75	6.25	Rel. homogen gø. Jevnt tynn spredn. av fsp. porfyrer. Stedvis større fspxx og uregelmessige bånd.							
68.75 - 72.40	3.65	Rel. massiv homogen gø. - tynne bånd m/gø.sk.							
72.40 - 72.50	0.10	Innh. 2 tynne (cm) lagfylte sulfidbånd po m/cp.							x
72.50 - 73.25	0.75	Massiv steril gø.							
73.25 - 73.60	0.35	Minr. vesentl. po i talk-kloritt gø.sk.		0,-	0.315	0.119		6.84	x
73.60 - 74.10	0.50	Massiv steril gø.							
74.10 - 74.30	0.20	<u>po+cp</u> i foldet talk-kloritt - gø.sk.							x
74.30 - 74.65	0.35	Massiv gø.							
74.65 - 74.85	0.20	Minr. i foldet gø.sk.							x

Lokalitet: KIEPPE

Dato: 5.9.71 I.L.

Borehull: Bh-3B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 128.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.85 - 37.70	2.85	Sterkt foldet gø.sk. - pene detalj- folder.							
37.70 - 40.50	2.80	Massiv middelk. gø. b.a. (nærmer seg metagabbro - middelk.).							
40.50 - 41.35	0.85	Gø. - gø.sk.							
41.35 - 41.95	0.60	Til dels bra cp. - po minr. i gø.sk. (talk-kloritt).		0,-	0.155	0.056		2.85	x
41.95 - 45.25	3.30	Rel. mørk gø. b.a. massiv → skifrig. Et par mindre fsp.utsvetn. gjerne m/noen korn cp.							
45.25 - 46.00	0.75	Noen få flekker med sulfider po+cp i rel. homogen, massiv gø. b.a.		0.027	0.233	0.049		4.29	x
46.00 - 46.25	0.25	Steril massiv gø.							
46.25 - 46.50	0.25	Tekt. fylling av sulfider po+cp.							x
46.50 - 47.30	0.80	Massiv steril gø.		0,-	0.326	0.034		4.29	x
47.30 - 47.55	0.25	Noen tynne cp-bånd i gø.sk.							
47.55 - 57.10	9.55	Rel. massiv gø. opptil max. middelk. uregelmessige fsp.-striper. 54.10-54.60- Noen sulfider på spr.- fyll. i gø. og foldet gø.sk. sammen							

Lokallitet: RIEPPE

Dato

1993. 9

Borehull: Bh-3B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 128.70 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.30	3.30	Jordboring							
3.30 - 4.05	0.75	Amfibolittisk gø.							
4.05 - 7.20	3.15	Grovk. amf. - metagabbro.							
<u>v/ 5.50</u>		Prøve							
7.20 - 10.40	3.20	Massiv amfibolittisk gø.							
10.40 - 10.50	0.10	Noen sulfider i bånd <u>po+cp.</u>							x
10.50 - 13.00	2.50	Massiv opptil kornstr. middelk. gø.		0,-	1.684	0.152		10.19	
13.00 - 13.50	0.50	Bra. cp+po minr. i kv.fsp. båndet gø. b.a.							
13.50 - 17.80	4.30	Massiv gø. b.a. opptil middelk., men vanligst porfyrittisk massiv gø.							
17.80 - 21.00	3.20	Massiv gø. ofte med mindre kv.fsp. klyse utsvetn.							
21.00 - 31.20	10.20	Rel. homogen massiv gø. m/noen gø. sk. - lag. I gø. noen spredte fspxx.							
31.20 - 33.30	2.10	Grovk. amf. - metagabbro.							
33.30 - 34.85	1.55	Homogen massiv gø.							

Borehull: Bh-3A-71

Retning :

Helling/stigning: 52°

Høyde :

Lengde : 92.30 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
75.65 - 76.10	0.45	Tynn impr. i gø.sk.		0.010	0.311	0.785		9.53	x
76.10 - 78.10	2.00	Tynn impr. i gø. - gø.sk.		0,-	0.135	0,-		3.95	x
78.10 - 79.50	1.40	Noen 2-3 m (opptil cm) tykke sulfidbånd i gø. gø.sk. po+cp.		0,-	0.220	0.039		5.79	x
79.50 - 80.30	0.80	Dårlig minr. i gø. - gø.sk.		0,-	0.215	0.191		3.77	x
80.30 - 81.30	1.00	Noen bra bånd av minr. i gø.-gø.sk.		0,-	0.304	0.036		9.15	x
81.30 - 84.10 <u>v/81.90</u>	2.80	Lys flekket sk. gø. b.a. Prøve På enkelte sk.plan v/brudd litt po+cp - v/84.10 et 2 cm tykt gr. holdig bånd.							
84.10 - 85.05	0.95	Massiv gø. m/spr. fyll/utsvetn. av kv.fspxx. Her noen pene po (cp) flekker - ikke verd anal.							
85.05 - 89.00	3.95	Sterkt veksl. gø. b.a. fra grovk. metagabbro til fink. skifrig. Hyppig kv.fsp. utsvetn. på opptil 10-20 cm.							
89.00 - 92.30	3.30	Rel. massiv gø., men også skifrig, stedvis middelkornig.							

Lokantet: RIEPPE

Dato: 5.9.71 T.L.

Borehull: Bh-3A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 52°

Høyde :

Lengde : 92.30 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.00 - 67.80	2.80	Gø.-gø.sk. - hovedsakl. massiv b.a.							
67.80 - 69.00	1.20	Ujevn minr. i tekt. gø. - opprekn. po+cp.		0,-	0.119	0.069		3.38	x
69.00 - 69.70	0.70	STERIL massiv gø. - middelk.							
69.70 - 71.30	1.60	Massiv gø. m/noen spr. fyll av sulfider po+cp.		0,-	0.102	0.085		3.15	x
71.30 - 71.60	0.30	Tekt. gø.sk. m/noen sulf. i impr. po+cp+sl.		0,-	0.267	1.468		6.02	x
71.60 - 72.20	0.60	Tekt. gø.sk. opptil 10 cm massiv sulfidbånd <u>po+sl+cp.</u>		0,-	0.262	5.202		23.85	x
72.20 - 73.10	0.90	Tekt. gø.sk. med rike bånd av sl+cp i po.		0,-	0.319	2.755		11.96	x
73.10 - 74.00	0.90	Det meste massiv malm med sl+cp. Noen tynne bånd og vanlige breksjebiter m/talk-kloritt skifer.		0.072	1.180	8.987		36.20	x
74.00 - 74.60	0.60	Veksl. massive sulfider og talk-kloritt gø.sk.		0.021	0.995	4.094		19.59	x
74.60 - 75.45	0.85	Svak impr. po i talk-kloritt sk.		0.021	0.149	0.273		5.26	x
75.45 - 75.65	0.20	God impr. og massiv malm i talk-kloritt gø.sk.		0.010	3.140	7.184		23.63	x

Lokallitet:

MIEP

Stato

5.1

L.

Borehull: Bh-3A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 52°

Høyde :

Lengde : 92.30 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.20 - 37.70	10.50	Veksl. gø.gø.sk. stedvis ½ cm tynne lagbånd m/kv.fsp.							
37.70 - 39.20	1.50	Vesentl. porfyrittisk massiv gø.							
39.20 - 40.30	1.10	Gø. - gø.sk.							
40.30 - 40.45	0.15	Ujevn spr.fyll. - impr. i gø. b.a.							x
40.45 - 43.70	3.25	Gø.-gø.sk.		0,-	1.009	0.067		6.02	
43.70 - 44.30	0.60	Ujevn spr.fyll impr. i foldet (sterkt) gø. b.a. po+cp.							x
44.30 - 44.60	0.30	Grovk. amf./metagabbro.							
44.60 - 45.40	0.80	Gø. - gø.sk.							
45.40 - 57.30	11.90	Vesentl. porfyrittisk gø. - m/middelk. →fink. matrix, noen få bånd m/gø. - gø.sk., men < ½ m.							
57.30 - 58.90	1.60	Gø.-gø.sk.							
68.90 - 60.50	1.60	Vesentl. porfyrittisk gø.							
60.50 - 62.60	2.10	Gø. og gø.sk. v/60.65, 61.35 og 61.85 ca. 10 cm bånd med tynne lagstriper av po.							
62.60 - 65.00	2.40	Vesentl. middelk. massiv gø.							.

Lokallitet: RIEPPE

Dato

1971

11.11.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning: 52°

Høyde :

Lengde : 92.30 m

Borehull: Bh-3A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.65	4.65	Jordboring							
4.65 - 9.20	4.55	Mørk amfibolittisk gø.sk., delvis porfyrittisk m/kv.fsp. klyseutsvetn. Oppsprukket dagfjell.							
9.20 - 9.33	0.13	Et bånd gø.sk. m/sulfid impr. po+cp.							x
9.33 - 10.50	1.17	Vesentl. porfyrittisk massiv gø.							
10.50 - 15.90	5.40	Veksl. gø. - massiv opp til max middelk. v/12.10 et par cp-korn.		0,-	0.768	0.067		9.68	
15.90 - 16.00	0.10	En del cp i amf. b.a. m/lange amf. nåler og kv.fsp. - Utsvetn.							x
16.00 - 21.50	5.50	Vesentl. massiv gø., men også bånd gø.sk., også i bånd porfyrittisk gø.							
21.50 - 22.00	0.50	Metagabbro - grovk. amf.							
22.00 - 22.40	0.40	Gø.sk.							
22.40 - 23.00	0.60	Gø. massiv opptil middelk.							
23.00 - 24.30	1.30	Grovk. amf. - metagabbro. v/24.10 en kv.fsp. pegm. utsvetn.							
24.30 - 27.20	2.80	Sterkt foldet gø.sk.							

Lokalt: 15EPFL

ato 4 1 L.

Borehull: Bh-2B-71

Koordinater :
Retning :
Helling/stigning: Lodd
Høyde :
Lengde : 142.30 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
<u>v/135.60</u>		Prøve							
138.00 - 138.50	0.50	Gø. -gø.sk.							
138.50 - 140.70	2.20	Po klyser i homogen gø. - hyppig.		0,-	0.046	0.095		4.58	x
140.70 - 142.30	1.60	Gø. -gø.sk.							

Borehull: Bh-2B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 142.30 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
118.00 - 119.60	1.60	Svak impr. po+cp i talk-kloritt-gø.sk.		0,-	0.038	0.262		2.43	x
119.60 - 122.00	2.40	Meget få sulfid (po) korn i talk-kloritt gø.sk.							
122.00 - 123.30	1.30	Gø.							
123.30 - 123.60	0.30	Ujevn minr. po i tynne (cm) bånd po+cp og noe sl.		0,-	0.065	4.207		9.04	x
123.60 - 124.60	1.00	Gø.sk. talk-klorittisk m/tynne impr. striper konk. av po+cp.		0,-	0.085	0.291		4.16	x
124.60 - 125.40	0.80	Grovk. metagabbro steril.							
125.40 - 127.60	2.20	Svak impr. i lys kv.sittisk talk-kloritt b.a. ? po+py (cp).		0,-	0.056	0.267		2.53	x
127.60 - 128.20	0.60	Massiv gø.							
128.20 - 130.20	2.20	Veksl. gø. -gø.sk. noen korn sulfider po+py.							
130.20 - 133.20	3.00	Kv.sittisk sk. noe po+py impr. -svak.							
<u>v/131.90</u>		Prøve							
133.20 - 133.60	0.40	Gø.massiv.							
133.60 - 138.00	4.40	Talk-kloritt gø.sk. m/noen sulfidkorn.							

Borehull: Bh-2B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 142.30 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		benker i blanding. Gø. er oftest massiv og fra fink. → middelkornig.							
98.60 - 99.50	0.90	Massiv grovk. amf. - metagabbro.							
99.50 - 105.30	5.80	Veksl. gø. normal og porfyrittisk, stedvis fink. massiv.							
105.30 - 108.00	2.70	Vesentlig porfyrittisk gø.							
108.00 - 109.20	1.20	Gø.-gø.sk.							
109.20 - 109.80	0.60	Sulfider i tynne bånd i gø (sk).		0,-	0.090	0.021		2.65	x
109.80 - 110.20	0.40	En del sulfider i gø.sk.		0,-	0.247	0.052		6.87	x
110.20 - 110.70	0.50	Svak impr. i svak skifrig gø.		0.018	0.061	0.024		2.95	x
111.00 - 112.00	1.00	Kj.tap.							
110.70 - 112.50	1.80	Meget fink. hard (for boring) gø.							
<u>v/112.00</u>		Prøve							
112.50 - 113.00	0.50	Po+cp minr. i gø. -gø.sk.		0,-	0.545	0.017		3.98	x
113.00 - 114.10	1.10	Nær steril homogen gø.							
114.10 - 116.00	1.90	Svak impr. po+cp i talk-kloritt gø.sk.		0,-	0.082	0.087		2.55	x
116.00 - 118.00	2.00	Svak impr. po+cp i talk-kloritt gø.sk.		0,-	0.047	0.106		2.02	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 4.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : Lodd

Høyde :

Lengde : 142.30 m

Borehull : Bh-2B-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
46.20 - 46.85	0.65	Po.cp. impr. på lagplan i gø.sk.		0,-	0.207	0,-		3.86	x
46.85 - 47.75	0.90	Svakt impr. i gø. <u>gø.sk.</u> <u>po</u> +cp.		0.009	0.091	0.007		1.67	x
47.75 - 52.75	5.00	Rel. homogen gø.							
52.75 - 52.95	0.20	Impr. på lagplan av po. i gø.sk. + noen.cp-korn og cp på spr. mot mer massiv gø.		0,-	0.071	0.139		4.58	x
52.95 - 70.50	17.55	Gø. rel. homogen. - Tynne bånd (< 20 cm) med porfyrittisk gø. Også noen tynne soner med fink. → middelk. massiv gø. b.a.							
70.50 - 73.30	2.80	Massiv rel. homogen middelk. → fink. gø. b.a. metadiabas.							
73.30 - 85.70	12.40	Veksl. gø. <u>gø.sk.</u> , i soner på opptil ½ cm har en fink.-middelk. el. grovk.soner av metadiabas. Også utsvetn. av kv.fsp, klyser. - Noen steder er gø.sk. sterkt foldet.							
85.70 - 90.00	4.30	Gø. pepret med fspxx, porfyrittisk.							
<u>v/86.70</u>		Prøve.							
90.00 - 98.60	8.60	Homogen gø. og porfyrittisk gø. %							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 4.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : Lodd

Høyde :

Lengde : 142.30 m

Borehull : Bh-2B-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.85	4.85	Jordboring.							
4.85 - 13.00	8.15	Mørk amfibolittisk gø. -gø.sk. delvis m/kv.fsp.klyser. Noen flek- ker med po.							
13.00 - 15.00	2.00	Porfyrittisk-amfibolittisk-rel. massiv gø.							
15.00 - 19.00	4.00	Veksl. amf. gø. -gø.sk.							
19.00 - 21.00	2.00	Rel. homogen gø. porfyrittisk v/19.80.							
21.00 - 32.80	11.80	Vekslende skifrig gø.sk. - amfi- bolittisk.							
v/30.35		en pen spr. fylling med po/cp i massiv gø.							
32.80 - 33.80	1.00	Porfyrittisk gø. massiv.							
33.80 - 40.20	6.40	Veksl. amfibolittisk gø. → gø. → gø.sk.							
30.15 - 30.40	0.25	cp.po. partier i gø. b.a. } Element-							} x x
37.55 - 37.55	0.10	-----"----- } ford. anal.							
40.20 - 40.60	0.40	Kv.linse.							
40.60 - 46.20	5.60	Veksl. gø.sk.							

0,- 0.964 0.064 7.35

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 4.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 125.20 m

Borehull : Bh-2A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
105.00 - 106.00	1.00	Gø.sk. m/noen sulfider po+cp, også kv.fsp.flekker.		0,-	0.256	0.040		3.85	x
106.00 - 113.10	7.10	Gø.sk. båndet av kv.fsp.bånd og vanlig kv.fsp. utsvetn. i 1 cm - 2 cm tykke soner. Noen spredte sulfidkorn.							
113.10 - 120.50	7.40	Skifrig grovk. tekt. metagabbro - grovk.amf. - Få sulfidkorn - po flere steder utsvetn. av kv. og fsp. i opptil 10 cm bånd.							
<u>v/116.50</u>		Prøve							
120.50 - 124.20	3.70	Gø.sk., talk-kloritt foldet tektonisert, noen få korn po.							
124.20 - 125.00	0.80	Po spr. fyll. og uregelmessig minr. i gø. -gø.sk. litt gl.		0,-	0.122	0.431		4.50	x
125.00 - 125.20	0.20	Gø.sk.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 4.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 125.20 m

Borehull : Bh-2A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
95.30 - 96.00	0.70	Gø.sk. m/tynne impr. av vesentlig po, noen granater.		0,-	0.113	0.046		4.31	x
96.00 - 96.20	0.20	Bra cp-rik impr. i kv.sittrik gø.sk.		0,-	1.101	0.048		10.57	x
96.20 - 96.75	0.55	Vesentl. po impr. i gø.sk. - gø.		0.009	0.097	0.021		2.64	x
96.75 - 97.70	0.95	Nær steril gø. rel. homogen.		0,-	0.041	0.098		1.74	x
97.70 - 99.10	1.40	Vesentl. po impr. i talk.kl.sk., til dels sterkt foldet.		0.017	0.136	0.043		3.29	x
99.10 -100.00	0.90	Steril gø. - gø.sk.							
100.00 -100.25	0.25	Gø.sk. - talkig klorittisk m/noen sulfidkorn po+cp.							
100.25 -101.60	1.35	Rel. massiv gø. - gø.sk.							
101.60 -101.85	0.25	Gø.sk. talk-kloritt m/litt po.							
101.85 -102.40	0.55	Grovk. amf. → metagabbro.							
102.40 -103.00	0.60	Stedvis tynn po-cp minr. i båndet gø.sk. Bånding består av fsp-rike lag.		0.008	0.144	0.062		3.00	x
103.00 -104.25	1.25	Gø.sk., talk-kloritt noe po (cp).		0,-	0.101	0.099		2.84	x
104.25 -105.00	0.75	Gø.sk., talk-kloritt po+pene cp-flekker også litt sl.		0,-	0.297	0.036		5.48	x

Borehull : Bh-2A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.60 - 57.70	1.10	Massiv fink. → middelk. gø.							
57.70 - 58.50	0.80	Sill? <u>før</u> benevnt <u>grovk. amf.</u> - dette det samme som en metagabbro?							
58.50 - 61.70	3.20	Rel. homogen gø.							
61.70 - 63.70	2.00	Gø.sk. Delvis sterkt tektonisert m/kv.fsp utsvetn. og sterkt detaljfoldet - isoklinal, henimot.							
63.70 - 73.70	10.00	Veksl. gø. -gø.sk. - noen steder ½ m mekt. "benker" med fink. → middelk. gø.amf.							
73.70 - 82.60	8.90	Gø. -gø.sk. vekslende gjennomgående spredte fspxx - porfyrer.							
82.60 - 83.60	1.00	Fink. → middelk. massiv gø.							
83.60 - 85.20	1.60	Massiv grovk. amf. event. - meta-diabas - sill - metagabbro.							
<u>v/83.90</u>		Prøve							
85.20 - 95.30	10.10	Veksl. typer gø. vesentlig massiv, men også skifrig i tynne soner. Tynne soner som er porfyrrike forek. Noen kv.fsp utsvetn., v/92.20 en 10 cm tykk også m/karbonat.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 4.9.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde : 125.20 m

Borehull : Bh-2A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.00 - 24.40	0.40	En kv.fsp.klyse m/noe sulfid.							
24.40 - 34.80	10.40	Gø.-gø.sk. gjerne porfyrittisk - få xx. I opptil 5 cm bånd kan b.a. være kv.fsp.laminert.							
34.80 - 36.70	1.90	Mekt. av gø. som er meget porfyrittisk - porfyrrik. Denne b.a. har jevne overganger til mer massiv gø.-gø.sk.							
<u>v/35.40</u>		Prøve							
36.70 - 37.15	0.45	Gø.							
37.15 - 37.65	0.50	Kv.fsp båndet gø.-gø.skifer m/po impr.+cp.		0.052	0.068	0.017		1.45	x
37.65 - 39.75	2.10	Veksl. gø. gø.sk.							
39.75 - 45.50	5.75	Vesentlig rel. massiv porfyrittisk gø.							
45.50 - 46.30	0.80	Massiv fink. middelk. gø. v/45.90 en cm-tykk spr.fyll. med po+cp.							
46.30 - 50.60	4.30	Halvt om halvt - porfyrittisk og normal gø.							
50.60 - 56.60	6.00	Gø. massiv til skifrig - under-ordnet porfyrittisk type.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 4.9.71 I.L.

Borehull : Bh-2A-71

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 70°

Høyde :

Lengde 125.20 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 6.00	6.00	Jordboring							
6.00 - 15.00	9.00	Amfibolittisk gø. m/kv.fsp utsvetn. rel. hyppig, b.a. synes å være preget av dagnære forhold. Stedvis porfyrittisk (underordnet). - Viser også foldestrukturer.							
15.00 - 18.00	3.00	Vesentlig normal gø., men også amfibolittisk mørkere type.							
18.00 - 21.30	3.30	Gø.-gø.sk.							
21.30 - 21.40	0.10	Tekt. pegm. sone m/po+cp							x
21.40 - 22.90	1.50	Gø.-gø.sk.							
22.90 - 23.00	0.10	Minr. i forb. m/kv.fsp utsvetn.		0.034	0.537	0.017		4.96	x
23.00 - 23.25	0.25	Gø.-gø.sk.							
23.25 - 23.60	0.35	Impr. og minr.bånd av cp+po i gø.sk.							x
23.60 - 26.30	2.70	Gø.-gø.sk., vanligst av porfyrittisk type.							
23.30 - 23.60	0.30	Kv.fsp.båndet gø.sk. m/noen gr. (50% kv+fsp). Noen korn po+cp.							
23.60 - 24.00	0.40	Gø.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 23.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : Lodd

Høyde :

Lengde : 94.20 m

Borehull : Bh-1B-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
91.30 - 91.70	0.30	En del po-cp-lag i gø.skiferen.		0,-	0.079	0.374		3.94	X
91.70 - 94.20	2.50	Rel.mørk gø.sk. m/kv.fsp rike partier og bånd.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 23.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : Lodd

Høyde :

Lengde : 94.20 m

Borehull : Bh-1B-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
69.20 - 70.20	1.00	Rik-Cu-Zn-malm av vanl. type m/ breksjefiller osv.		0,-	1.802	4.568		22.16	x
70.20 - 71.45	1.25	Steril gø. normal.		0,-	0.012	0.017		0.69	x
71.45 - 71.80	0.35	Cu-rik po malm vanl. breksjefille- malm.+sl.		0,-	1.113	4.909		22.59	x
71.80 - 72.25	0.45	Til dels bra semimassiv malm i kl.- talkig sk.filler og normal gø.		0,-	0.530	0.831		7.43	x
72.25 - 74.75	2.50	Svak impr. i talk. kl.sk.-gø.sk. po+cp. Siste 25 cm noen små gr.		0,-	0.517	0.238		4.08	x
74.75 - 78.20	3.45	Talkig og klorittisk gø.sk. m/små granater.							
78.20 - 79.00	0.80	Mørk fink. gø. (amf.).							
79.00 - 87.30	8.30	Talkig-klorittisk gø.sk. Noen tynne (30 cm) bånd med vanl. gø. Noen korn po på lag/skiferplan.							
87.30 - 89.00	1.70	Gø.sk. og klorittisk gø.sk.							
89.00 - 90.00	1.00	Markert båndet gø.sk. som inneh. tynne (mm) fsp-bånd og gl.lag.							
90.00 - 91.30	1.30	Talkig kl.gø.sk. med en sone 90.20- 90.60 med massiv gø.+po flekker.							

Lokaltet : RIEPPE

Dato : 23.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : Lodd

Høyde :

Lengde : 94.20 m

Borehull : Bh-1B-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
54.50 - 56.40	1.90	Vesentl. porfyrittisk gø. v/54.70 et 5 cm impr. bånd sammen med kv.fsp.konk. utsvetn.							
56.40 - 61.50	5.10	Veksl. gø. Små fsp.klyser. Noen steder virkelig gø.massiv. Også porfyrittiske bånd.							
61.50 - 65.90	4.40	Gø.veksl. skifrig og mer massiv, uregelmessige kv.fsp. utsvetninger. Den skifrige gø. er oftest meget sterkt foldet, småfoldet i angulære skarpe folder, og av mer rundet plastisk type.							
65.90 - 66.40	0.50	Noe impr. og minr. sk.plan i gø.sk.		0.069	0.375	0.260		6.27	x
66.40 - 66.60	0.20	Zn-Cu-rik magnetkismalm i gø.sk. filler.		0,-	1.590	6.853		26.24	x
66.60 - 68.30	1.70	Noen tynne rike sulfidbånd ellers steril gø. -gø.sk. v/68.30 et nydelig eks. på minerallinj. nær <u>1</u> på angulære småfolder. amf.nålene er parallelle.		0,-	0.046	0.170		5.54	x
68.30 - 69.20	0.90	Nær steril rel. massiv gø. - middel- kornig m/fspxx.		0,-	0.30	0.070		1.11	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 23.7.71 I.L.

Borehull : Bh-1B-71

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : Lodd

Høyde :

Lengde : 94.20 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.50	4.50	Casing							
4.50 - 5.10	0.60	Middelk. amf.-gø.							
5.10 - 13.50	8.40	Veksl.gø. - amfibolitt. Noen striper grovk. andre igjen gø. m/fsp porfyrer. v/7.60 et 5 cm kv.fsp. rikt bånd med <u>po</u> +cp. I foldet klyse v/8.40 litt po.							
13.50 - 15.75	2.25	Rel. grovk. gø./amf. massiv.							
15.75 - 40.50	24.75	Veksl.gø.sk. - i bånd porfyrisk, andre steder rel. homogen og middel- kornig svakt amfibolittisk. Sted- vis tynne bånd m/kv.fsp utsvetn., og klyser. Noen steder her litt <u>po</u> .							
40.50 - 52.30	11.80	Veksl. gø. for det meste porfyrit- tisk - fspxx. Også uregelmessige kv.fsp utsvetn. - v/48.30 en 20 cm tykk sone av dette.							
52.30 - 54.50	2.20	Grovk.-middelk. massiv amfibolittisk gø.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 20.7.71 I.L.

Koordinater :

Borehull : Bh-1A-71

Retning : Ø

Helling/stigning : 50°

Høyde :

Lengde : 81.00 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
69.00 - 70.40	1.40	- ditto.		0,-	0.138	0.079		3.59	x
70.40 - 73.25	2.85	Gø. og talkig kl. gø.sk. noen få sulfidkorn.							
73.25 - 77.30	4.05	Grovk. gø. gø.sk. talkig klorittisk.							
77.30 - 78.15	0.85	Gø. .							
78.15 - 79.50	1.35	Gø.+talkig klorittisk gø.sk.							
79.50 - 81.00	1.50	Gø.sk. - delvis klorittisk.							

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 20.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 50°

Høyde :

Lengde : 81.00 m

Borehull : Bh-1A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.80 - 59.10	1.30	Nær steril gø.		0,-	0.049	0.018		1.38	x
59.10 - 60.00	0.90	Semimassiv malm-breksje-malm - talkig og klorittisk skifer, filler <u>po+cp+sl</u> .		0,-	1.337	5.413		29.45	x
60.00 - 61.55	1.55	Semimassiv breksje malm - vanl. type. En god del <u>cp+sl</u> sammen med po.		0,-	1.365	4.387		33.22	x
61.55 - 62.60	1.05	Noen tynne sulfidbånd i talkig klorittisk gø.sk.		0,-	0.088	0.079		2.95	x
62.60 - 62.90	0.30	Noe bedre minr. i gø.sk. b.a. med kv. fsp utsvetninger.		0,-	1.601	0.018		6.23	x
62.90 - 64.60	1.70	Ujevn svak impr. i gø.sk. talkig m/kv. fsp utsvetn. <u>po+cp</u> .		0.029	0.248	0.038		5.89	x
64.60 - 65.80	1.90	Gø.sk. kv.fsp.rik. Også bånd m/gr. i denne b.a.							
65.80 - 66.20	0.40	Nær steril utenom i små flekker og tynne bånd. <u>po+cp</u> .		0,-	1.142	0.059		6.64	x
66.20 - 66.50	0.30	Ujevn impr. av <u>po+cp</u> i gø.sk.							
66.50 - 67.00	0.50	Homogen fink. gø.-gø.sk.							
67.00 - 69.00	2.00	Svak impr. i tynne bånd med <u>po+cp</u> i kv.fsp rik gø.sk.		0,-	0.121	0.038		3.15	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 20.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 50°

Høyde :

Lengde : 81.00 m

Borehull : Bh-1A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
49.25 - 50.90	1.65	Gø.-delvis skifrig, delvis porfyrittisk.							
50.90 - 51.10	0.20	Gø.kv.skifer med noe impr. - po+cp.							
51.10 - 51.40	0.30	Porfyrittisk gø.							
51.40 - 51.50	0.10	Gr.førende gø.sk. m/noe sulfider po+cp.							
51.50 - 51.75	0.25	Foldet gø.sk. og gø.							
51.75 - 52.30	0.55	Foldet gø. b.a. m/sulfid-bånd og impr. po+cp. Noen få gr. og kv.fsp. klyser/bånd.		0,-	0.092	0.018		2.55	x
52.30 - 53.90	1.60	Gø.sk. og massiv gø. Steril utenom v/52.85 hvor en har en flekk po.							
53.90 - 54.60	0.70	Talkig-klorittisk gø.sk.							
54.60 - 55.25	0.65	Talkig-klorittisk gø.sk. og gø.sk. vekslende.							
55.25 - 56.50	1.25	Grovk. til dels porfyrittisk gø. - amf.							
56.50 - 57.60	1.10	Gø. - amf.sk.							
57.60 - 57.80	0.20	Tål dels massiv Zn-rik minr. i gø.sk. talkig klorittisk.		0,-	0.008	0.015		0.35	x

Lokalitet : RIEPPE

Dato : 20.7.71 I.L.

Koordinater :

Retning : Ø

Helling/stigning : 50°

Høyde :

Lengde : 81.00 m

Borehull : Bh-1A-71

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Anal.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.80	4.80	Jordboring.							
4.80 - 8.60	3.80	Mørk rel. fink., men noe varierende amf.gø.							
8.60 - 9.80	1.20	Rel. grovk. gø.amf., massiv.							
9.80 - 13.00	3.20	Middelk.-fink.-skifrig amf. -gø. Noen kv.fsp.klyser - utsvetn.							
13.00 - 34.75	21.75	Gø.sk. stedvis svakt amf. I mekt. fra 10 cm - til 1 m har en benker (?) med gø. med fsp.porfyrer. Også tynne (1 m max.) mektigheter med opp mot grovk. amf. gø.							
34.75 - 40.25	5.50	Alt vesentl. en porfyrittisk gø. m/fsp. porfyrer.							
40.25 - 42.10	1.85	Middelk. → grovk. - massiv amf.							
42.10 - 47.60	5.50	Veksl. mass. - til skifrig amf. gø. i tynne soner fsp. porfyrittisk.							
47.60 - 49.25	1.65	Vesentlig porfyrittisk gø. gø.sk.							
49.25		v/dette pkt. et tynn klorittrik sk. lag (2 cm) med noe po + cp.							

BILAG 5 Borkjernelog med analyser fra boringene i
Rieppe 1971.
Alle hullene er plottet på Tegn. 2.

Lokalitet: Rieppe

Dato

22. 7. 70

Koordinater :

Retning :

Ø

Helling/stigning:

60°

Høyde :

Lengde :

26.40 m

Borehull: RP-11 -70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove-analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.60-16.80	0.70	Kj.tap							
16.80-18.65	1.85	Ujevn impr. til dels også steril massiv amf. Dessuten gø og gø. sk, po + cp		0.02	0.06	0.05		2.66	x
18.65-18.75	0.10	Kj.tap							
18.75-20.25	1.50	Mest steril amf b.a. - + gø (svakt sk enkeltê steder) Impr. bånd v/19.50 med en god del cp po + cp.							
		Kj.tap: 19.75-20.00		0, -	0.18	0.01		2.28	x
20.25-21.00	0.75	Massiv malm på nær (sulf.-silik:50-50) Po matrix m/sk. fill. + cp + sl.		0.05	1.33	3.08		26.58	x
21.00-21.85	0.85	" " " "		0, -	1.07	4.66		27.58	x
21.85-22.40	0.55	En del impr. po + cp i gø- gø. sk		0, -	0.24	0.82		4.83	x
22.40-25.00	2.60	En del ujevn impr. i bånd - gø + go. sk po + cp Kj.tap: 23.02-23.15 23.60-23.85		0, -	0.18	0.36		7.13	x
25.00-25.10	0.10	Kj.tap							
25.10-26.40	1.40	Noe ujevn impr i gø - gø. sk po + cp		0, -	0.17	0.10		3.45	x

Lokament: Rieppe

Dato : 22.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 60°

Høyde :

Lengde : 26.40 m

Borehull: RP-11-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00-5.00	5.00	Veksl.amf.med kv/fsp klyser. Noen få små sulfidprikker . B.a. rel.mørk. Kj.tap: 1.80-2.20 3.90-4.00							
5.00-7.70	2.70	Middelk → fink. amf.rel massiv. Kj.tap: 5.60-5.80.							
7.70-8.30	0.60	Cp impr. (svak) i amf sk. - svak		0.07	0.44	spor		4.83	x
8.30-12.65	4.35	Amf.og amf. sk.b.a. rel.mørk Kj.tap: 8.90-9.00 10.50-10.75							
12.65-13.60	0.95	Svak impr. i gø. sk - talkig og klorittisk po + cp		0, -	0.05	0.04		3.20	x
13.60-13.90	0.30	Kj.tap							
13.90-14.70	0.80	Gø - noen få prikker po - massiv b.a.		0.02	0.03	0.03		2.95	x
14.70-16.60	1.90	Ujevn impr. i gø og gø. sk (talkig og kl) Vesentl. po Kj.tap: 15.75-15.90		0, -	0.06	0.01		2.80	x

Lokaltet: Kieppe

Dato : 22.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 75°

Høyde :

Lengde : 29.70 m

Borehull: RP-10-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Proven Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.90-20.25	0.35	Kj.tap							
20.25-22.20	1.95	Svak ujevn impr. i gø-gø.sk. Noen kv. klyser - po +cp.							
		Kj.tap 20.90-21.20		0,-	0.47	0.08		4.38	x
22.20-23.90	1.70	Meget svak impr. i gø og gø.sk, po + cp		0,-	0.13	0.06		4.78	x
23.90-25.60	1.70	2-3 stk. 2-3 m tykke sulfidband (po+cp) og dessuten svak impr. i gø - gø.sk		0.05	0.27	0.08		3.44	x
25.60-29.70	4.10	Gø og gø.sk svakt amfibolittisk ? Et par steder mm tykke bånd med sulfider vesentlig po. Kj.tap. 26.90-27.00 28.90-29.00							

Lokator:

Rieppe

Dato

22.9.70 IL

Koordinater

Retning

Ø

Helling/stigning

75°

Høyde

Lengde

29.70 m

Borehull: RP-10-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
10.60-10.70	0.10	"Massiv malm" po+cp+sl	30°	0.02	1.81	2.12		37.78	x
10.70-11.00	0.30	Gø. sk → kl. talk. sk. m/noen po prikker.		0.05	0.13	0.18		7.29	x
11.00-12.10	1.10	"Massiv malm" m/talk kl. sk filler-po + cp + sl.		0.02	1.81	2.12		37.78	x
12.10-13.20	1.10	" " " "		0.05	1.39	1.85		34.89	x
13.20-14.70	1.50	Talk. kl. sk - noe po og cp-spredt		0.02	0.11	0.10		8.40	x
14.80-15.25		" " " "							x
14.70-14.80	0.10	Massiv malm m sk filler <u>po+cp+sl</u>		0. -	0.80	3.64		30.44	x
15.25-15.90	0.65	" " " "							x
15.90-16.45	0.55	Massiv gø amf - nær steril		0.07	0.06	0.07		3.44	x
16.45-18.00	1.55	Rel. svak impr. i gø. sk & talk. kl. sk							
		Kj. tap 16.90-17.00							
		15.35-15.70		0. -	0.13	1.36		6.29	x
18.00-19.25	1.25	God impr. i soner - ujevn - gø. sk talk kl. sk,							
		Kj. tap. 18.90-19.00		0. -	0.36	3.34		8.62	x
19.25-19.90	0.65	Noe po i tynne lag gø. sk talk kl. sk		0.07	0.10	0.14		6.04	x

Lokallitet:

Rieppe

Dato

22.9.70

Koordinater

Retning

Ø

Helling/stigning:

75°

Høyde

Lengde

29.70 m

Borehull: RP-10,-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Resultat Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00-0.10	0.10	Kj.tap							
0.10-5.00	4.90	Amf - gø. sk og gø, vekslende. Noen steder noen få sulfidflekke po, cp. Dagfjell. Kj.tap 0.55-0.75 2.55-2.65 4.30-4.60							
5.00-5.70	0.70	Jevnt små sulfidflekke - klyser po + cp i gø → gø. sk Kj.tap. 5.40-5.50		0.-	0.05	0.03		4.93	x
5.70-7.00	1.30	Amf.- middelk. → fink. v/6.60 et 5 cm tykt impr. bånd i gø. sk							
7.00-9.10	2.10	Amf.gø.og amf - steril - Kj.tap 8.80-9.00.							
9.10-9.40	0.30	En god del impr. i foldet gø. sk til gø-po + po		0.-	0.12	0.01		7.39	x x
9.40-10.60	1.20	Litt sulfider i gø. sk - po. Kj.tap 9.90-10.00		0.02	0.06	0.10		3.93	x

Lokalitet: Rieppe

Borehull: RP-9-70

USB/1650 /47B

Dato : 22.9.70 IL
 Koordinator :
 Retning : ϕ
 Helling/stigning: 70°
 Høyde :
 Lengde : 25 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Proven Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.70-18.90	1.20	Svak impr. i gø-gø.sk po vesentl. Kj.tap 18.00-18.10		0.07	0.17	0.14		4.33	x
18.90-19.40	0.50	En del rel. bra minr i tynne lag-bånd po + cp		0.02	0.92	0.13		4.93	x
19.40-21.30	1.90	Gø $\rightarrow$ gø.sk helt ubetydelige sulfid- flekker							
21.30-22.50	1.20	Fink. amfibolittisk gø.							
22.50-25.00	2.50	Veksl. gø $\rightarrow$ gø.sk. Enkelte små kv. klyser. v/23.10 et cm/tykt sulfidbånd- vesentlig po.							

Lokamet: Rieppe

Dato 22.9.70 IL

Borehull: RP-9-70

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 70°

Høyde :

Lengde : 25 m

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Resultat Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
10.00-10.50	0.50	G ϕ -amfibolittisk + g ϕ . sk . Litt po + (cp) v/10.05.							
10.50-10.75	0.25	Kj. tap							
10.75-11.50	0.75	G ϕ -g ϕ . sk - amfibolittisk							
11.50-12.00	0.50	Kj. tap							
12.00-13.15	1.15	En del ujevn men stykkevis bra impr. po. cp + sl i g ϕ -g ϕ . sk.							
		Kj. tap 13.00-13.10		0. -	0.35	0.07		6.04	x
13.15-14.15	1.00	Svak ujevn impr. i g ϕ . sk - talk kl. sk, po + cp							
		Kj. tap 14.00-14.05		0.09	0.10	0.03		5.60	x
14.15-14.60	0.45	"Massiv malm" - breksje type m/sk. filler (talk kl. sk) Po + cp + sl.		0.07	1.44	4.41		33.78	x
14.60-16.00	1.40	En del impr. i g ϕ . sk - talk kl. sk - vesentl. po							
		Kj. tap. 15.00-15.05		0.07	0.37	0.47		9.11	x
16.00-16.70	0.70	Rel. dårlig impr. i g ϕ . - g ϕ sk.		0.05	0.12	0.06		4.38	x
16.70-17.70	1.00	Rel. bra minr. i tynne bånd ($\frac{1}{2}$ cm) - po cp. sl/g ϕ $\rightarrow$ g ϕ . sk. Kv. klyse m/sulfider							
		16.90-17.00		0.07	0.17	0.14		4.33	x

Lokalitet: Rieppe

Dato : 22.9.70 IL

Koordinater :

Retning : ϕ

Helling/stigning: 70°

Høyde :

Lengde : 25 m

Borehull: RP-9-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.0 - 2.45	2.45	Kjernetap							
2.45-4.95	2.50	Mørk amf.sk. meget oppsprukket - dagfjell							
4.95-5.40	0.45	En del po + cp impr. i amf.- gø.sk- foldet		0.05	0.19	0.03		5.04	x
5.40-7.15	1.75	Amf.- (gø) - rel. massiv - steril Kj.tap 6.20-6.40							
7.15-7.40	0.25	Gø - gø.sk							
7.40-7.75	0.35	Kj.tap							
7.75-8.00	0.25	En del impr. i gø → amf.sk. po-cp-sl		0.05	0.19	0.03		5.04	x
8.00-8.70	0.70	Amf - rel. massiv							
8.70-9.00	0.30	Kj.tap							
9.00-9.90	0.90	Amf.og amf.sk.svakt gø.aktig. Impr. (svak) 9.10-9.20 og 9.85-9.90							
9.90-10.00	0.10	Kj.tap							

Borehull: RP-8B-70

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : 800 moh

Lengde : 34.80 m

USB/1650 /47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.70-30.25	2.55	Gø - rel. massiv - + gø. sk							
30.25-30.50	0.25	Kv.-fsp.utsvetn.+ noe gø litt po i dette							
30.50-34.80	4.30	Gø og gø. sk							
		Kj.tap: 31.65-31.75							
		32.90-33.00							
		33.90-34.10							
		Kv.klyser:							
		32.60-32.70							
		32.75-32.90							
		33.00-33.25							
		31.55-31.65 litt impr. av po i kv fsp							
		rik gø.							

Lokaltet: Rieppe

Dato : 22.9.70 PL

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : $\sqrt{}$ 800 moh

Lengde : 34.80 m

Borehull: RP-8B-70

USB/1650/47B

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Resultat Analyse
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.15-16.95	1.80	Gø-gø. sk-talk. kl. sk .Stedvis en svak impr. Kj.tap 15.90-16.25							x
16.95-17.00	0.05	Kj.tap							
17.00-17.90	0.90	Massiv malm med sk. filler - vesentlig po, men en god del cp og litt sl.		0.05	0.84	4.62		31.55	x
17.90-19.25	1.35	Svak ujevn mineralisering po + cp		0.02	0.09	0.11		4.82	x
19.25-19.90	0.65	Nær "massiv malm" po + litt cp		0.02	0.79	0.22		19.78	x
19.90-20.20	0.30	Rel.svak impr. i gø-gø. sk		0.05	0.26	0.13		5.27	x
20.20-22.30	2.10	Ujevn men en del pen impr. i gø-gø. sk En god del kv.fsp.utsvetn. Med pen impr. po + cp + litt sl. Kj.tap 21.85-22.00		0.07	0.52	0.26		8.55	x
22.30-23.35	1.05	Svak impr. (meget svak) i gø-gø. sk		0, -	0.07	0.08		3.99	x
23.35-25.60	2.25	Ujevn impr. men bra der en har den gø. gø. sk, po + cp Kj.tap 23.85-24.00		0, -	0.13	0.09		5.49	x
25.60-28.60	3.00	Gø-gø. sk uten minr. v/26.70 et 5 cm bånd m/gr. amf. Kj.tap 27.70-27.80							
28.60-28.70	0.10	Kv/fsp utsvetn med mye pen <u>sl</u> po-cp							

RIEPESJAVRE
631 m.o.h.

Barakke

TEGNFORKLARING

- xxx Utgående
- Skjerp, stoll
- Transportveg

USB 1978 RIEPPE BORFELT Grunnlag: Landmåleres høydeobservasjoner og innmåling av borhull.	MÅLESTOKK 1 : 2000	OBS. I.L.	
		TEGN. I.L.	
		TRAC. I.L.	
		KFR. I.L.	
NORGES GEOLOGISKE UNDERSÖKELSE TRONDHEIM	1650/47B-02	1734 III	

