




Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

BÆRBAR MASKIN HJEMME Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7106	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv NGU	Ekstern rapport nr BA 3812	Oversendt fra Vestlandske	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Tungspat i Norge				
Forfatter Hysingjord Jens		Dato År 11.01 1965	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) A/S Stordø Kisgruber	
Kommune	Fylke	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Forekomstbeskrivelse		Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Tråg Heskestad Vinoren Berggård skjerp Skrattås grube	
Råstoffgruppe Industrimineral	Råstofftype BaSo4			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse På forespørsel fra A/S Stordø Kisgruber gjøres en vurdering av forkomster av tungspat i Norge. En oversikt opptredener er gjort. Det bemekes at det ikke er regulær drift noe sted på mineralet, forekomstene er relativt små og av tvilsom økonomisk verdi. Enkelte av disse beskrives kort, se forekomster ovenfor.				



Herr Per C. Sandberg,
A/S Stordø Kvikgruber.
Lilla a.

PS/317

29.12.64

Jfr. 194/637
JH/GA

11. januar 1967.

Tungspat i Norge.

Det er, såvidt vi vet, ingen regulær drift på tungspat her i landet.

De forekomster vi kjenner til er relativt små og av tvilsom økonomisk verdi. Noen systematisk undersøkelse av norske tungspatforekomster er ikke gjort. Jeg skal her gi en oversikt over hvor tungspat er funnet her i landet.

Thorolf Vogt (1) nevner i sin mineralogisk avhandling "Schwerspat aus Norwegischen Vorkommen", en rekke tungspatforekomster:

1. Styggeadalsgangen, Traag. l. a. l. a.
2. Aasegang og Strandbakk gruber, Fed. Ulefoss.
3. Høkestad, Lista.
4. Neskilen og Langsev jerngruber, Arendal.
5. Kongsberg sølvverk.
6. Raipas gruber, Alta.
7. Berggård skjerp, Ringerike.
8. Svenningdalen, Vefsn.

I tillegg til de her nevnte forekomster, nevner rapport fra Bergarkivet nr. 249, følgende forekomster:

9. Vinoren grubefelt, bl. a. Svartås gruber.
10. Hofjellot gruber.
11. Sulitjelma gruber.
12. Skrattås grube, Egge, Nord-Trøndelag.

Styggedalsgangen, Trøg, 1911

J.N.L.Vogt (1907), "Über die Brzgangs zu Træng in Berlin inengen".
Gangmøktigheten oppgis å variere fra 25 cm til 2,5 m. Det kan være gangen
er ifølge kartskissen ut til å være ca. 1,5 km, men det er for lite
om den er tungspattforende over hele lengden. I tillegg til de avvikende
skal de kjente tungspattganger i Den fyllte og Den fyllte som for
til å være økonomisk nyttbare.

Hovedstad tungspålforsøget på at få en kopi af den
bergarkivrapport nr. 163, 624, 626, 628, 629, 630 og 631.
at det er denne forekomst som er udsædelt af 1/8 af den
Hvis De skulle sitte inne med noen flere rapport over hovedstaden,
ville vi gjerne ha en kopi.

Ifølge bergmester Ross er lantholdningen i Langvinger og Vinøren for små til at have nogen betydning. Ifølge direktør Bjerlykke skal malmen ved Langvinger og Vinøren holde ca 5 % tungspat.

Berggård skjerp, er beliggende i - 3 km nord for østlig
grube, Ringerike. Ifølge Vogt (1908) skal tings, stene og andre
halvparten av gangbredden. Av erstatninger skal til
blyglass og koppekis.

Ifølge direktør Bjørnsen skal det være _____ år
 være tatt ut en del tungspat som _____ for _____.

I Skratås grube, ligg i den förslutna dalen och i den
statsgeolog Farden Finnes litt tungspat.

Literatur:

Vogt, J.H.L.: "Über die Erzgänge zu Tross in Bamberg, Bayern".
Zeitschr. f. prakt. Geol., 15, 210, 1863.

Vogt, Thorolf, : "Schwerspat aus norwegischen Vorkommen".
geologisk tidsskrift, Bind 1, nr. 2, 1900.

Geologisk afdeling

Jens Ayslingjord
statistolog
o.s.