



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7394	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra arkiv Nordlandske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Nordlandske	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Lunkanfjord

Forfatter

Johns, John

Dato

År

19.09 1918

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Kommune

Hadsel

Fylke

Nordland

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

12314

1: 250 000 kartblad

Svolvær

Fagområde

Forekomstbeskrivelse

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Lonkan

Grundviken

Svardalen

Rinnervassdalen

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Cu, Mo

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Stollpáhugg i Grundviken men magnetkis med litt kopper og spor av molybden. Ikke kompakt malm.

I Svartdalen finnes en imregnasjon over 2 meter magnetkis.

Rinnervassdalen viser små linser med magnetkis og spor av cpy.

Forekomstene har ingen verdi.

Lurkampfad.

19/3. 1918.

1) Gründviken

Stollpassering like i strandkanten. Juddrift
ca 3 m.

Gangren, som består av magnetkis og
litt kobberkis med spor av molybdänfärs,
ströket O-W med fall 50° til S.

Gangrens mæktighet varierer fra $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ meter.
Malnföringen er fattig og der findes ikke
"kampakt" malen i nærværende grad.

2) Gravdalen.

Fackkomsten ligger i en skiel (hangved)
fjeldvæg i en höjde over havet av 485 meter.
Ströket er O-W med fall 70° til S. Malmen
fackkommer som impregnation av mæktighet
ca 2 m. Der er indtaget en øststret gang
ca 2 m. længde. Malmen består av magnetkis.
Adkomsten er meget vanskelig.

3) Rinnerwassdalen.

Her er fundet smaa luser av magnetkis
med spor av kobberkis. Ströket er NO-SW og
falder til NW. Stundet ligger 475 m. o. h.
Der er påbegyndt inddrift av en øst.

Paa de to sidste steder er der betydelig
utbredelse av jern, hvilket har fanget

skjarpere opmærksomhet. Røstdækket er meget
lydt. I røstdækket findes der tydelige grønne
striper avsat av forvitret kobberkis.

Den svenske Bergingeniör Mörzill har
avgit en glimrende rapport over forekomstene.
Omidlertid er forekomstene uten nogenomhelst
værdi.

p. t. Svalber 19/9. 1918.
John John.

Avskrift.

Lunkanfjord.

1. Grundviken.

Stolpånug like i strandkanten . Inddrift ca. 3 m.

Gangen, som består av magnetkis og lidt kobberkis med spor av molybdenglans, stryker O-W med fald 50° til S.

Gangens mægtighet varierer fra $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ meter. Malmføringen er fattig og der findes ikke "kompakt" malm i nævneværdig grad.

2. Svartdalen.

Forekomsten ligger i en steil (hængende) fjeldvæg i en højde over havet av 485 meter. Strøket er O-W med fald 70° til S. Malmen forekommer som impregnation av mægtighet ca. 2 m.. Der er inddrevet en ortstul på ca. 2 m. længde. Malmen består av magnetkis.

Adkomsten er meget vanskelig.

3. Rinnervassdalen.

Her er fundet små linser av magnetkis med spor av kobberkis. Strøket er NO-SW og faldet til NW. Fundet ligger 475 m.o.h.. Der er påbegyndt inddrift av en ort.

På de to sidste steder er der betydelig utbredelse av rust, hvilket har fanget skjærperes opmærksomhet. Rustdækket er meget tyndt. I rustdækket findes der tydelige grønne striper avsat av forvitret kobberkis.

Den svenske bergingeniør Mørtzell har avgit en glimrende rapport over forekomstene, Imidlertid er forekomstene uten nogensomhelst værdi.

P.t. Svolvær 19/9 1918.

John Johns(s)

Rett avskrift:

Nordlandske Bergmestereambete

H. L. Bockman