

To-gl. gn. alminnelig type
To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl. gn. biotit dominert type
} TO-GLIMMERGNEIS (lyse, fink, ofte homogene gneiser)

AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): »omdannet disthengneis«
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/÷ pyrit impr.
»KVARTSIT« (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl. gn.)/ biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)

dårlig (impregnasjons-) malm	< 2 % Zn
middels (stripet) malm	2-3 % Zn
god (stripet) malm	3-4 % Zn
meget god (»homogen«) malm	> 4 % Zn

MOFJELLET GRUBER
RAUDVATN
PROFIL CA 312,5 Ö

M = 1	TEGN.	2.81. A.K.
	TRAC.	"
500	KFR.	A.KRUSE
	REV.	
KART NR.	DW 193 (2027 IV)	
ARKIV NR.	1805 Å	

1805 Å